

# GACETA OFICIAL

AÑO XCIX

PANAMÁ, R. DE PANAMÁ VIERNES 2 DE MAYO DE 2003

Nº 24,792

## **CONTENIDO**

### **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

#### **DECRETO EJECUTIVO Nº 107**

(De 9 de abril de 2003)

"POR MEDIO DEL CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL DECRETO EJECUTIVO Nº 229 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2001, POR EL CUAL SE DESIGNA AL COMISIONADO PRESIDENCIAL ADJUNTO PARA EL PLAN PUEBLA-PANAMA EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SE NOMBRA UN NUEVO COMISIONADO PRESIDENCIAL ADJUNTO." ..... PAG. 1

### **MINISTERIO DE SALUD**

#### **RESOLUCION Nº 090-A**

(De 12 de marzo de 2002)

"QUE CREA EL PRIMER FORMULARIO HOMOLOGADO DE MEDICAMENTOS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE SALUD DE LA REPUBLICA DE PANAMA." ..... PAG. 3

### **CONSEJO DE GABINETE**

#### **DECRETO DE GABINETE Nº 16**

(De 23 de abril de 2003)

"POR EL CUAL SE MODIFICAN FRACCIONES AL ARANCEL NACIONAL DE IMPORTACION." ..... PAG. 138

AVISOS Y EDICTOS ..... PAG. 140

### **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

#### **DECRETO EJECUTIVO Nº 107**

(De 9 de abril de 2003)

Por medio del cual se deja sin efecto el Decreto Ejecutivo No.229 de 14 de noviembre de 2001, por el cual se designa al Comisionado Presidencial Adjunto para el Plan Puebla-Panamá en el Ministerio de Relaciones Exteriores y se nombra un nuevo Comisionado Presidencial Adjunto

### **LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA**

en uso de sus facultades legales,

## **CONSIDERANDO**

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 229 de 14 de noviembre de 2001, se designó al Embajador FRANCISCO J. ÁLVAREZ DE SOTO, como COMISIONADO PRESIDENCIAL ADJUNTO PARA EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ,

# GACETA OFICIAL

## ORGANO DEL ESTADO

Fundada por el Decreto de Gabinete N° 10 del 11 de noviembre de 1903

**LICDO. JORGE SANIDAS A.**  
**DIRECTOR GENERAL**

**LICDA. YEXENIA RUIZ**  
**SUBDIRECTORA**

### OFICINA

Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral  
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Panamá,

Teléfono: 227-9833 - Fax: 227-9830

Apartado Postal 2189

Panamá, República de Panamá

LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS

PUBLICACIONES

PRECIO: B/.4.50

### IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES

Mínimo 6 Meses en la República: B/. 18.00

Un año en la República B/.36.00

En el exterior 6 meses B/. 18.00, más porte aéreo

Un año en el exterior, B/.36.00, más porte aéreo

Todo pago adelantado.

Impreso en los talleres de Editora Dominical, S.A.

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo No. 229 de 14 de noviembre de 2001, mediante el cual se designa al Embajador **FRANCISCO J. ÁLVAREZ DE SOTO**, Comisionado Presidencial Adjunto para el Plan Puebla-Panamá.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Se designa ad honorem al Doctor **AURELIO MEJÍA RODRÍGUEZ**, Director de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, como **COMISIONADO PRESIDENCIAL ADJUNTO PARA EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ**, para efectos de apoyar las labores de la Oficina del Comisionado Presidencial para el Plan Puebla-Panamá, Embajador **VIRGILIO E. SOSA G.**, ejerciendo aquellas funciones y/o representación que, por delegación de éste le sean asignadas.

**ARTÍCULO TERCERO:** Este Decreto entrará a regir a partir de su promulgación.

### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Panamá, a los 9 días del mes de abril de dos mil tres (2003).

**MIREYA MOSCOSO**  
Presidenta de la República

**HARMODIO ARIAS CERJACK**  
Ministro de Relaciones Exteriores

**MINISTERIO DE SALUD  
RESOLUCION N° 090-A  
(De 12 de marzo de 2002)**

**Que crea el Primer Formulario Homologado de Medicamentos de las Instituciones Públicas de Salud de la República de Panamá”.**

**EL MINISTRO DE SALUD,  
en uso de sus facultades legales**

**CONSIDERANDO:**

Que la Constitución Política establece en su artículo 107 el deber del Estado de desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la población del país.

Que el artículo 111 de nuestra Carta Magna ordena la integración orgánica y funcional de los sectores gubernamentales de salud, incluyendo sus instituciones autónomas y semiautónomas.

Que el artículo 10 del Decreto 75 de 27 de febrero de 1969 señala como función general del Ministerio de Salud propender a la integración progresiva de las acciones de salud en el sector salud a fin de alcanzar un rendimiento más alto de los recursos.

Que se considera necesaria la armonización u homologación de los criterios establecidos en las listas, formularios o cuadros básicos existentes de medicamentos e insumos de salud en las distintas instalaciones sanitarias públicas, para establecer armónicamente los criterios técnicos en las compras de medicamentos e insumos de salud, facilitando a su vez la docencia al personal médico y sanitario, al igual que la investigación científica.

Que tomando en cuenta el reto de la globalización urge la necesidad que las instituciones sanitarias públicas de cada país aúnen esfuerzos para obtener medicamentos de calidad, eficacia y seguridad comprobada a costos razonables, de forma tal que se puedan tratar la mayoría de las patologías existentes en la población, mediante el uso racional de los mismos.

Que con la finalidad de asumir el reto de la globalización se hace imprescindible que los actores involucrados en el manejo de los medicamentos e insumos de salud, desde la selección hasta la utilización, se comuniquen bajo un mismo idioma o términos a nivel nacional e internacional.

Que en base a las consideraciones anteriores se creó la Comisión Nacional de Homologación para la confección del Formulario Nacional de Medicamentos e Insumos de Salud, mediante Resolución No.106 de 29 de marzo de 2000.

Que debido a la participación del Ministerio de Salud en la sesiones de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa que dieron como resultado la promulgación de la Ley 1 de 10 de enero de 2001, Sobre Medicamentos y otros Productos para la Salud Humana, se iniciaron formalmente las reuniones de la precitada Comisión Nacional de Homologación el 19 de diciembre de 2000.

Que la Ley 1 de 10 de enero de 2001 establece la existencia de nuevos Comités y Comisiones que relevan tácitamente a la Comisión Nacional de Homologación de finalizar en su totalidad las tareas y funciones atribuidas.

Que en consecuencia la Ley 1 de 10 de enero de 2001 desvirtúa la continuidad de la Comisión Nacional de Homologación, por lo que de forma responsable la Comisión finaliza y hace entrega de la parte correspondiente a la homologación de medicamentos, el 12 de marzo de 2002, para que sirva como base a los nuevos Comités o Comisiones establecidos, en calidad de apoyo a la labor encomendada mediante la Ley 1 de 10 de enero de 2001.

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** Adoptar el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Homologación, mediante el cual se crea el Primer Formulario Homologado de Medicamentos de las Instituciones Públicas de Salud de la República de Panamá, el cual mantiene la reserva de cada institución, excluyendo criterios de selección, por carecer del carácter vinculante; el cual transcribimos a continuación:

#### **PRIMER FORMULARIO HOMOLOGADO DE MEDICAMENTOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**

##### **INTRODUCCIÓN**

La piedra angular de un sistema eficiente de suministro de productos farmacéuticos es la selección de los medicamentos, situación que involucra la elaboración de un formulario de medicamentos, mediante la selección racional de fármacos para el tratamiento de morbilidades prevalentes, a fin de llegar a lograr mayor eficiencia administrativa y una mejor terapia medicamentosa.

La elaboración de un primer Formulario Homologado de Medicamentos de las Instituciones Públicas de Salud de la República de Panamá intenta como recurso técnico – científico y administrativo la consecución del objetivo principal, de orientar la prescripción de medicamentos según pautas o protocolos de atención, utilizando el fármaco más apropiado, seguro y eficaz para cada enfermedad; así como la de ser utilizado como herramienta por parte del personal de salud y del personal administrativo, permitiendo a éstos últimos hacer uso racional del gasto financiero en estos productos, evitando la adquisición de fármacos que no son necesarios o que no presentan ventajas significativas en relación con los existentes en dicho formulario de medicamentos.

Basados en esta necesidad se emitió la Resolución Ministerial No. 106 de 29 de marzo de 2000, creando la Comisión Nacional de Homologación para la confección del Formulario Nacional de Medicamentos e Insumos de Salud, cuyo propósito es la conjugación de éstos criterios técnicos – científicos y administrativos que se encuentran inmersos en las listas o formularios de medicamentos existentes en las diferentes instalaciones públicas de salud, con el objetivo primordial de aunar esfuerzos entre los actores involucrados en el manejo de medicamentos, teniendo como meta la obtención de productos y medicamentos de calidad, eficacia y seguridad comprobada a costos razonables; de manera que se pueda brindar una real “atención integral de salud” a la mayoría de las patologías existentes en la población y disminuir los niveles de morbilidad, mortalidad y discapacidades que son secuelas de estas enfermedades en nuestro medio.

Para lograr estos objetivos es necesario complementar el presente Formulario, en el cual se han respetado las normas de selección establecidas en cada institución, con algunas otras acciones interinstitucionales conjuntas en materia de homologación tales como, la elaboración y revisión de los niveles, normas y pautas de atención integral de las patologías o morbilidades que se presentan en la población; la promoción permanente del uso racional y manejo adecuado de los medicamentos, a nivel público y privado; la dotación de los recursos humanos, financieros y logísticos mínimos que garanticen el

acceso racional de los medicamentos a la población en general; la actualización, revisión y homologación permanente del presente Formulario y de los protocolos de atención institucionales.

La elaboración de un Formulario de Medicamentos, es solo uno de los pasos iniciales para obtener la racionalidad en el uso de fármacos que se utilizan en las instalaciones públicas de salud, ya que para garantizar esto se requiere de una participación activa multidisciplinaria de los profesionales de la salud, como también de la población en general, aplicando medidas básicas que tienen como propósito promover una cultura de salud individual y colectiva en nuestro país, mediante el uso apropiado de los fármacos conforme a su prescripción, evitando la automedicación, mejoramiento de los estilos de vida y promoviendo el saneamiento del ambiente en toda su magnitud; lo cual persigue disminuir los factores de riesgo de múltiples patologías agudas o crónicas que padecemos en un momento determinado todos los seres humanos.

Concluimos entonces, que es imprescindible una continuidad con el concurso sinérgico de todas las instituciones públicas inspiradas en uno de los fines más altruistas: la promoción, prevención, conservación y restauración de la salud de toda la población de nuestro país, como ejemplo a igualar por la humanidad en todas las latitudes del orbe.

### INSTRUCTIVO

Se aprecian en el presente documento dos listas correspondientes a los renglones de medicamentos una según orden alfabético y otra de acuerdo a la Clasificación ATC; esta última incluye las indicaciones terapéuticas más aceptadas por la literatura internacional. Ambas listas incluyen principios activos, concentraciones, presentaciones, vías de administración y utilización correspondiente a cada entidad participante.

Los títulos empleados en la Lista correspondiente a la Clasificación ATC, deben entenderse como un concepto que agrupa moléculas con la misma indicación terapéutica, el cual tiene como finalidad promover la participación de un mayor número de oferentes en los procesos de adquisición.

### ABREVIATURAS

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| a.c.      | acción corta        |
| a.p.      | acción prolongada   |
| aq. dest. | agua destilada      |
| Amp.      | Ampolla             |
| a.c.      | antes de una comida |
| cap.      | cápsula             |
| cm.       | centímetro          |
| c.c.      | centímetro cúbico   |
| comp.     | compuesto           |
| compr.    | comprimido          |
| solv.     | disolver            |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| b.i.d.     | dos veces al día       |
| elix.      | elíxir                 |
| emuls.     | emulsión               |
| p.c        | después de las comidas |
| fco.       | Frasco                 |
| GI         | gastrointestinal       |
| Gtt, gtt   | gotas                  |
| g.         | gramo                  |
| IM         | Intramuscular          |
| inhal.     | inhalación             |
| inf.       | Infusión               |
| id.        | Intradémico            |
| IV         | intravenoso            |
| instill.   | instilación            |
| inj.       | inyección              |
| jbe., syr. | Jarabe                 |
| Kg         | kilogramo              |
| L.A.       | larga acción           |
| lb.        | Libra                  |
| lin.       | linimento              |
| liq.       | líquido; fluído        |
| l.         | litro                  |
| lot.       | loción                 |
| med.       | Medicamento            |
| mg         | miligramo              |
| mcg o ug   | microgramo             |
| Meq.       | mili equivalente       |
| ml         | mililitro              |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| O.D.        | ojo derecho            |
| O.I.        | ojo izquierdo          |
| oft.        | Oftálmico              |
| paren.      | parenteral             |
| ad us. ext. | para uso externo       |
| ped.        | pediátrico             |
| pulv.       | pólvo                  |
| p.o.        | por la boca o vía oral |
| plg.        | pulgadas               |
| s.c.        | subcutáneo             |
| sol.        | solución               |
| suppos.     | supositorio            |
| susp.       | suspensión             |
| top.        | tópicamente            |
| tab.        | Tableta                |
| t.i.d       | tres veces al día      |
| U.          | unidad                 |
| U.I.        | Unidad Internacional   |
| ung.        | ungüento               |
| vit.        | vitamina               |

### GLOSARIO

- **Denominación Común Internacional (DCI):** Corresponde a la denominación de los principios activos farmacéuticos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. La Denominación Común Internacional tiene la finalidad de lograr una buena identificación de cada fármaco en el ámbito internacional.
- **Eficacia Terapéutica:** Propiedad de un medicamento para producir los efectos propuestos evidenciada a través de estudios clínicos controlados desarrollados por expertos cualificados. La presentación de estas evidencias es exigible primordialmente a los productos innovadores.
- **Equivalente Terapéutico:** Es el equivalente farmacéutico que al ser administrado en la misma dosis producirá los mismos efectos clínicos, que el producto al que es equivalente de acuerdo con la determinación de los estudios apropiados que pueden ser estudios farmacodinámicos, estudios de bioequivalencia, estudios clínicos o estudios comparativos de perfiles de disolución dependiendo del medicamento en cuestión.

- **Esquemas terapéuticos:** Guías de tratamiento para una enfermedad determinada, normalmente desarrolladas por un grupo médico técnico, que se emplean para normar el manejo de dicha enfermedad, adicionalmente cumplen una labor docente en lo concierne a orientar y capacitar al personal médico.
- **Insumo médico-quirúrgico:** Es todo material o producto utilizado en los seres humanos con la finalidad de prevenir, curar o rehabilitar un proceso de salud-enfermedad determinado. Este concepto excluye a los productos medicamentosos.
- **Falla Farmacéutica:** Toda alteración física que se presente en un producto medicamentoso (cambio de color, consistencia, alteración física, presencia de cuerpos extraños o alteración en el envase primario del producto).
- **Falla Terapéutica:** Toda sospecha de que un producto no efectúe su actividad terapéuticamente comprobada.
- **Farmacovigilancia:** Conjunto de acciones orientadas a determinar la causalidad, frecuencia de aparición y gravedad de los efectos agudos o crónicos por el uso de productos farmacéuticos en su etapa de comercialización.
- **Formulario Homologado de Medicamentos:** Documento que compila los medicamentos y productos medicamentosos que han sido seleccionados, para ser utilizados en un sistema determinado de atención sanitaria. El mismo, incluye información farmacológica para promover el uso efectivo seguro y racional de los mismos en las instalaciones de salud. El objetivo de este formulario es servir de base a la administración para efectos de compra y, a los médicos y farmacéuticos como base para el uso racional y apropiado de los medicamentos.
- **Insumo médico-quirúrgico:** Es todo material o producto utilizado en los seres humanos con la finalidad de prevenir, curar o rehabilitar un proceso de salud-enfermedad determinado. Este concepto excluye a los productos medicamentosos.
- **Loción:** Preparado medicinal líquido para aplicación local o para limpiar alguna parte. Preparaciones líquidas con uno o más componentes activos en vehículo apropiado. Dependiendo de la naturaleza de los ingredientes, las lociones pueden ser preparadas en igual forma como suspensiones, emulsiones o soluciones.
- **Medicamento:** Producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico, o tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien fue administrado.
- **Medicamentos Esenciales:** Dícese de aquellos medicamentos que son básicos, de la mayor importancia, indispensables y necesarios para satisfacer las necesidades de atención de salud de la mayor parte de la población. El concepto de medicamentos esenciales fue propuesto por la OMS con el fin de optimizar los recursos financieros limitados de un sistema de salud y el conjunto de ellos fue denominado Lista de Medicamentos Esenciales. La inclusión de un medicamento en la lista mencionada refleja, por lo tanto, un orden de prioridades y la exclusión de uno de ellos no implica un rechazo general de su uso.
- **Medicamentos huérfanos:** Fármacos o productos biológicos utilizados para tratar enfermedades o condiciones raras que afectan a una pequeña población. Se refieren a principios activos potenciales en los cuales no existe un interés de parte de los laboratorios productores para su desarrollo comercial como medicamento, ya que dicho desarrollo no representa un incentivo económico, a pesar de que puedan satisfacer necesidades de salud.
- **Nombre Genérico:** El nombre aprobado o nombre no comercial de un fármaco. Se corresponde generalmente con la Denominación Común Internacional recomendada por la OMS.

- **Prescripción (Receta Médica):** Orden emitida por el médico para que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla de medicamentos en ella especificados sea dispensada a la persona determinada y que contiene las direcciones para su uso correcto. El médico prescribe la receta, el farmacéutico la suscribe.
- **Procesos Mórbidos:** Condición del progreso de una enfermedad.
- **Producto Medicamentoso:** Son todas aquellas formas farmacéuticas o de dosificación o dispositivos mecánicos que contengan un medicamento o combinación de ellos diseñados para la administración de éstos en los seres vivos. También se consideran productos medicamentosos los alimentos y cosméticos que contengan medicamentos.
- **Reacción Adversa:** (1) Reacción nociva o no intencionada que ocurre en dosis usuales empleadas en el hombre para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades o para modificar las funciones fisiológicas. (2) Evento clínico adverso atribuido al uso de un medicamento.

### FORMAS DE DOSIFICACIÓN

- **Aerosol Farmacéutico:** El término "aerosol" se refiere a la fina nebulización que resulta de la mayoría de los sistemas presurizados. Sin embargo, el término se ha divulgado aplicándolo a todos los productos presurizados independientes, algunos de los cuales descargan espuma o líquidos semisólidos. Son productos que se envasan a presión, y contienen principios activos terapéuticos en solución o suspensión en un gas propulsor licuado, y los cuales se liberan en el momento de activar un sistema valvular apropiado. Están destinados para la aplicación tópica en la piel, así como para la aplicación local en varios orificios corporales y para la inhalación local o sistémica en los pulmones. En la terapia inhalatoria el tamaño de las partículas de la medicación liberada debe ser inferior a 10 micras.
- **Atención farmacéutica (Asistencia farmacéutica):** Filosofía del ejercicio de la farmacia que se ha establecido en los últimos años y en la cual el paciente y la comunidad son considerados como los beneficiarios primarios de la acción del farmacéutico. Involucra no sólo el suministro de medicamentos y otros cuidados de la salud sino también los servicios necesarios para garantizar el mejor uso de ellos.
- **Candelilla:** Preparación farmacéutica cilíndrica que se introduce en la uretra, el recto o cualquier otro conducto.
- **Cápsula:** Forma farmacéutica sólida en la que el fármaco se introduce en una "cubierta" dura o blanda de una gelatina apropiada. Los tamaños de la cápsula de gelatina dura varían desde el número 5 (la más pequeña) al número 000 (la mayor). Las cápsulas blandas tienen envolturas más espesas que las duras y en general se les añaden agentes conservadores. Clásicamente, las cápsulas de gelatina blanda se han llenado con principios activos disueltos o suspendidos en unos vehículos oleosos como el aceite vegetal. Sin embargo, como resultado del reconocimiento de problemas de biodisponibilidad es más frecuente utilizar vehículos no acuosos pero miscibles en agua, tales como glicoles líquidos de polietileno portadores del fármaco. Los líquidos son medidos en el interior de la cubierta justo antes del sellado. Por la posibilidad de fuga del líquido contenido dentro, a veces es aconsejable envasar estas cápsulas en forma unitaria. Las cápsulas de gelatina blanda también pueden llenarse con polvo o gránulos. Están destinadas a la administración oral, pero también se dispone en esta presentación de preparaciones para otras aplicaciones como son las vaginales o rectales.
- **Comprimido:** Los comprimidos pueden definirse como formas farmacéuticas sólidas, que contienen drogas, con diluyentes adecuados o sin ellos, y que se preparan por métodos de compresión o de moldeado (Ver Anexo I).
- **Crema:** Líquido viscoso o emulsión semi sólida del tipo aceite-en-agua, o

agua-en-aceite. Habitualmente se utilizan por vía tópica. El término "crema" se aplica con más frecuencia a tipos de preparados suaves aceptados cosméticamente.

- **Dispositivo Medicado:** Es un instrumento diseñado con el propósito de liberar directamente en el órgano blanco en el cual se ha insertado, bajas dosis de un fármaco. Se formulan con el propósito de minimizar la absorción sistémica del medicamento. El ejemplo más común es el dispositivo intrauterino (DIU) cargado con progesterona el cual libera 65ug del fármaco por día durante un año.
- **Espuma:** No ofrecen ventajas probadas sobre los ungüentos. Tiene como desventajas la dificultad en establecer la cantidad de espuma que permanece en el área afectada y la relación con la concentración disponible del ingrediente activo y el tamaño de la burbuja de la espuma.
- **Gel:** Es un sistema semisólido que consiste bien en suspensiones formadas por pequeñas partículas inorgánicas o bien por grandes moléculas orgánicas interpenetradas por un líquido. Cuando la masa del gel consiste en una red de pequeñas partículas discretas, el gel se clasifica como un sistema de dos fases (Ej. gel de hidróxido de aluminio). En un sistema de dos fases, si el tamaño de las partículas de la fase dispersa es relativamente grande, la masa de gel se conoce a veces como magma (Ej. Magma de bentonita). Los geles se aplican a la piel o a ciertas mucosas para fines protectores, terapéuticos o profilácticos. La JALEA es una clase de gel en la cual la estructura de la matriz contiene una alta porción de líquido, usualmente agua.
- **Implante o Pellet:** Preparación sólida estéril, que contienen uno o más ingredientes activos altamente purificados, normalmente sin excipientes. Tienen un tamaño apropiado y forma ovoidea o arilla para la implantación parenteral, y liberan el ingrediente o los ingredientes activos en un periodo prolongado. Se presentan en recipientes separados.
- **Inhalante:** Corresponde a un fármaco o a una disolución de fármacos administrados por vía respiratoria, nasal u oral para conseguir efectos locales o sistémicos. (Otro grupo de productos, conocidos también como inhalaciones algunos se aplican a las vías respiratorias mediante el empleo directo al área a tratar o conectados a una mascarilla facial o a una tienda o a una máquina de respiración a presión positiva intermitente). Los nebulizadores solo son apropiados para la administración de las soluciones para inhalación si proporcionan gotitas lo suficientemente finas y uniformes en tamaño para que la nebulización pueda llegar a los bronquiolos.
- **Óvulo:** Sólido generalmente ovoide o cónico que contiene el o los principios activos disueltos o dispersos en una sustancia que se funde a la temperatura del cuerpo, destinados a uso vaginal.
- **Parche:** Soporte del papel, tela o plástico, que en una de sus caras contiene una masa adherida formada por el o los principios activos y aditivos.
- **Pasta:** Preparación homogénea y semisólida que contiene altas concentraciones de sustancias en polvo insolubles (habitualmente no menos del 20% dispersas en una base apropiada. Suele ser menos grasa, más absorbente y de consistencia más firme que el ungüento porque contiene una alta cantidad de ingredientes en polvos. Debe adherirse bien a la piel y en muchos casos forma una película protectora que impide la evaporación del agua.
- **Pastilla (Trocisco):** Sólido que contiene el o los principios activos mezclados con azúcar u otros aditivos saborizantes destinados a disolverse en la boca.
- **Patologías:** (a) Estudio de la naturaleza y causa de una enfermedad que incluye los cambios en la estructura y función. (b) Condición producida por una enfermedad.
- **Polvo:** Son mezclas íntimas de fármacos y/o productos químicos secos finamente divididos para uso interno y externo. Debido a su mayor área superficial específica, los polvos se dispersan y disuelven más fácilmente que

las formas de dosificación compactas. Los fármacos que son demasiados voluminosos para poder formar comprimidos o cápsulas del tamaño conveniente pueden administrarse en polvo. Los fármacos inestables en suspensiones o soluciones acuosas pueden prepararse en forma de gránulos o polvos.

- **Solución:** Preparación líquida que contiene una o más sustancias químicas solubles, normalmente disueltas en agua. El soluto normalmente no es volátil. Se emplean por el efecto terapéutico específico del soluto, ya sea interna o externamente. Varían ampliamente en cuanto a composición, método de preparación, resistencia, potencia, modo de administración, empleo y dosificación.
- **Supositorio:** Cuerpo sólido de peso y forma variable adaptados para la introducción por los orificios rectal, vaginal o uretral del cuerpo humano. Puede actuar como protector o paliativo para los tejidos locales en el lugar de introducción o como portador de agentes terapéuticos para lograr una acción sistémica o local.
- **Suscripción:** Instrucciones a quien despacha el fármaco sobre la forma de preparación de los mismos.
- **Suspensión:** Es un preparado de fármacos no disueltos finamente divididos y dispersos en vehículos líquidos. Es importante agitar bien la suspensión antes de cada uso para asegurar una distribución uniforme del sólido en el vehículo y, por tanto, una dosificación uniforme y apropiada.
- **Ungüento:** Es una preparación homogénea y semisólida destinada a la aplicación externa sobre la piel o las mucosas. Se utilizan como emolientes o para aplicar ingredientes activos en la piel con fines protectores, terapéuticos o profilácticos cuando se desea obtener cierto grado de oclusión.

### CLASIFICACIÓN ATC

#### Historia del Sistema ATC/DDD:

En 1969 durante el Simposio Internacional sobre el "Consumo de Fármacos", organizado por la industria farmacéutica europea y celebrado en Oslo, surgió la necesidad de desarrollar un sistema de clasificación que permitiera estudiar el consumo de los medicamentos; en este Simposio con el propósito mencionado, se crea el Grupo de Investigación de Utilización de Medicamentos (DURG por sus siglas en inglés, Drug Utilisation Research Group). Aprovechando el trabajo de clasificación de medicamentos elaborado por la European Pharmaceutical Market Research Association (EPHMA), el centro Norwegian Medicinal Depot (NMD) desarrolla el sistema conocido como Clasificación ATC (Anatomical Therapeutic Chemical.). En 1975 el Consejo Nórdico de Medicina (NLN) en colaboración el NMD desarrollan además de la Clasificación ATC, la unidad técnica de medición correspondiente conocida hoy como DDD y que corresponde a la dosis diaria promedio recomendada para adultos, por el laboratorio fabricante del producto medicamentoso. En 1981, la Oficina Regional Europea de la OMS recomienda el sistema ATC/DDD como instrumento metodológico en los estudios de la utilización de medicamentos. En 1996, la OMS reconoce la necesidad de fomentar el uso del sistema como un estándar internacional y se establece el Grupo de Trabajo Internacional para la Metodología Estadística de los Medicamentos de la OMS.

#### Propósitos del Sistema ATC/DDD:

- Servir como herramienta en la investigación relacionada con la utilización de los medicamentos, permitiendo cuantificar la calidad del consumo según su valor intrínseco potencial, en un área determinada.
- Permitir la comparación estadística entre diversas regiones.

**Estructura y Principios:**

- Los fármacos se agrupan de acuerdo a los órganos o sistemas sobre los cuales actúan y teniendo en cuenta sus propiedades químicas, farmacológicas y terapéuticas.
- Se establecen así, cinco (5) niveles diferentes.
- Se clasifican en 14 bloques del primer nivel.
- El primer nivel se subdivide en subgrupos terapéuticos/farmacológicos, conformando los segundos y terceros niveles.
- El cuarto nivel es un subgrupo terapéuticos/farmacológicos/químico.
- El quinto nivel corresponde a la sustancia química particular.

Los niveles segundo, tercero y cuarto se utilizan frecuentemente para identificar los subgrupos farmacológicos, si se consideran más apropiados, que los subgrupos terapéuticos o químicos.

*La clasificación de una sustancia en el sistema ATC/DDD no es una recomendación de su uso como medicamento, ni involucra consideraciones o juicios relacionados a la eficacia o eficacia relativa de un fármaco o grupo de fármacos.*

**Nomenclatura:**

En la denominación de los principios activos utiliza, con preferencia, los nombres genéricos internacionales (INN). Si en INN no se le ha asignado ningún nombre, se adopta el asignado por los Estados Unidos (USAN) o el aprobado por el Reino Unido (BAN).

- Para la denominación de los diferentes niveles de la Clasificación ATC, se utilizan los términos definidos por la Lista de Medicamentos de la OMS.

Ejemplo de clasificación completa de la glibenclamida que ilustra la estructura del código:

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| A       | Tracto Alimentario y Metabolismo.   |
| A01     | Fármacos utilizados en Diabetes.    |
| A10B    | Hipoglicemiantes orales.            |
| A10BB   | Sulfonamidas, derivados de la urea. |
| A10BB01 | Glibenclamida.                      |

### NORMAS DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

Actualmente las instituciones públicas de salud tienen sus propias normas de prescripción y dispensación de medicamentos, siendo las más conocidas e implementadas las emitidas por de la Caja de Seguro Social.

A raíz de la promulgación de la Ley 1 de 10 de enero de 2001 y del Decreto Ejecutivo No.178 de 12 de julio de 2001 que la reglamenta, es responsabilidad de cada institución de salud pública adecuar sus normativas de acuerdo a sus lineamientos.

## FARMACOLOGÍA CLÍNICA

### FARMACOTERAPIA EN LA TERCERA EDAD

La población mayor de 65 años presenta características que obligan al médico tratante a ser más rígido en el estudio integral de cada paciente. Este estudio integral debe hacer hincapié tanto en las consideraciones biológicas, psíquicas y sociales del enfermo,

como de las particularidades del fármaco o de los fármacos a utilizar. Adicionalmente el médico tiene responsabilidad formal en la clara, correcta y concreta instrucción que se dé al paciente o a su familiar en el uso y dosificación del medicamento o medicamentos prescritos. Esta responsabilidad debe entenderse compartida entre el médico, el paciente y su medio social. Sin este compromiso de manejo, los resultados no serán como se esperan.

Lo anterior tiene su fundamento en que la población de la tercera edad frecuentemente presenta:

- patología múltiple,
- sensibilidad aumentada en el sistema nervioso central a muchos fármacos,
- disminución en el metabolismo hepático,
- disminución en la cantidad de proteína plasmática,
- disminución en el porcentaje de agua corporal con aumento relativo de la grasa tisular, y disminución del flujo renal y de la depuración renal.

Esto trae como resultado neto que, frente a una dosis dada de un fármaco en el adulto mayor, se produzcan altas concentraciones plasmáticas o tisulares, con alargamiento considerable de la vida media de dicho medicamento. Si simultáneamente se prescriben varios fármacos, se aumenta el daño por la potenciación de las reacciones adversas y debido a la interacción de los medicamentos administrados.

En este grupo de pacientes es imprescindible limitar el número de medicamentos al mínimo; ajustando, en los que sean estrictamente necesarios, sus dosis en forma correcta y precisa. Adicionalmente, es imperativo que ante la concurrencia de episodios agudos tales como infarto del miocardio, infecciones, deshidratación, u otros problemas que puedan llevar a una reducción en el flujo y depuración renales, se diseñe un régimen de dosificación que evite una posible intoxicación.

La dosificación inicial en el adulto mayor puede ser un poco más de la mitad de la dosis diaria recomendada para un adulto joven y su ajuste se hará de acuerdo con la respuesta clínica obtenida, o de ser posible, según los niveles plasmáticos medidos en el laboratorio.

Ante problemas básicamente psicoafectivos o sociales el médico está obligado a ponderar satisfactoriamente la ventaja de utilizar técnicas y procedimientos terapéuticos no medicamentosos.

Entre los grupos de fármacos que tienen tendencia a producir reacciones adversas con mayor frecuencia en el adulto mayor tenemos a: hipnóticos, diuréticos, antihipertensivos, antiparkinsonianos, psicotrópicos y digitálicos.

Entre las reacciones adversas más comunes se encuentran confusión mental, estreñimiento, hipotensión postural y síncope.

### **FARMACOTERAPIA EN LA EDAD PEDIÁTRICA**

Todos los niños, particularmente los recién nacidos, difieren de los adultos en su respuesta a medicamentos. Se debe tener especial cuidado en el período neonatal (primeros 30 días de vida) y las dosis siempre se deben calcular según el peso corporal. A esta edad, el riesgo de toxicidad está aumentado por ineficiente filtración renal, deficiencias enzimáticas relativas, variación en la susceptibilidad del órgano blanco, y sistemas de destoxificación inadecuados que dan lugar a una excreción retardada. En la niñez se debe ajustar la dosificación según el peso hasta los 50 Kg. o hasta llegar a la pubertad.

#### **Dosificación en niños.**

Se puede calcular la dosis pediátrica sobre la base de la dosificación en el adulto usando la edad, peso corporal, o área de superficie corporal, o con una combinación de estos factores. Los métodos más confiables se basan en el área de superficie corporal.

Se puede usar el peso corporal para calcular las dosis que se expresan en mg/kg. Los niños pequeños pueden requerir una dosis mayor por kilogramo que los adultos debido a tasas de metabolismo más elevadas. También se deben considerar otros problemas. Por ejemplo, el cálculo por peso corporal en el niño obeso puede resultar en la administración de dosis

mayores a lo necesario; en tales casos, las dosis debe calcularse sobre la base del peso ideal, relativo a la estatura y edad.

Los estimados de área de superficie corporal son más exactos que el peso corporal para calcular las dosis pediátricas ya que muchos fenómenos físicos se relacionan mejor al área de superficie corporal. El promedio de área de superficie corporal de un adulto de 70 Kg. es aproximadamente 1.8m<sup>2</sup>. Por lo tanto, para calcular la dosis de un niño se puede usar la siguiente fórmula:

$$\text{Dosis aproximada} = \frac{\text{área de superficie (m}^2\text{)} \times \text{dosis de adulto}}{1.8}$$

También se puede usar el método de porcentaje para calcular dosis pediátricas de medicamentos comúnmente prescritos que tienen un amplio margen entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica.

La tabla presenta una relación de la edad con el peso corporal (en kilogramos y en libras), la estatura (en centímetros y pulgadas), el área de superficie corporal (en metros cuadrados) y el correspondiente porcentaje de la dosis de adulto.

| Edad           | Peso Corporal |     | Estatura |      | Superficie     | Porcentaje<br>dosis adulto |
|----------------|---------------|-----|----------|------|----------------|----------------------------|
|                | Kg            | Lb  | Cm       | Plg. | m <sup>2</sup> |                            |
| Recién nacido* | 3.4           | 7.5 | 50       | 20   | 0.23           | 12.5                       |
| 1 mes*         | 4.2           | 9   | 55       | 22   | 0.26           | 14.5                       |
| 3 meses*       | 5.6           | 12  | 59       | 23   | 0.32           | 18                         |
| 6 meses        | 7.7           | 17  | 67       | 26   | 0.40           | 22                         |
| 1 año          | 10            | 22  | 76       | 30   | 0.47           | 25                         |
| 3 años         | 14            | 31  | 94       | 37   | 0.62           | 33                         |
| 5 años         | 18            | 40  | 108      | 42   | 0.73           | 40                         |
| 7 años         | 23            | 51  | 120      | 47   | 0.88           | 50                         |
| 12 años        | 37            | 81  | 148      | 58   | 1.25           | 75                         |
| <b>Adulto</b>  |               |     |          |      |                |                            |
| Varón          | 68            | 150 | 173      | 68   | 1.8            | 100                        |
| Mujer          | 56            | 123 | 163      | 64   | 1.6            | 100                        |

\* Estas cifras se refieren a neonatos a término y no a prematuros, los cuales pueden requerir dosis menores según su condición clínica.

También existen nomogramas para calcular las dosis pediátricas.

Cuando se usan medicamentos nuevos o potencialmente tóxicos, se deben seguir cuidadosamente las recomendaciones del fabricante.

### FARMACOTERAPIA EN EL EMBARAZO

Desde las primeras semanas de la gestación cualquier agente de tipo viral, físico, (por ejemplo radiaciones) o químico (por ejemplo fármacos) puede producir alteraciones del embrión que dan lugar a malformaciones congénitas. En gran parte de este primer período del embarazo, entre la tercera y cuarta semana, la mujer puede no saber que está embarazada. De ahí que la problemática es doble: uso de fármacos durante el embarazo, pero también embarazo durante el uso de fármacos.

Durante las últimas semanas de la gestación la administración, sobre todo continuada de algunos fármacos puede facilitar la aparición de complicaciones en el parto.

Dados los peligros derivados de la especial susceptibilidad, primero del embrión y después del feto a los medicamentos, es esencial evitar la administración de fármacos a la mujer gestante en la medida que ello sea posible. En los casos en los que la abstención total sea imposible, se deberá elegir el medicamento a administrar en función de la relación

beneficio/daño según la información que se conoce en la actualidad y en la dosis efectiva más baja. Esta información se resume en las tablas N°1, N°2 y N°3.

En los últimos años se ha descubierto que derivados del retinol (vitamina A) y el propio retinol pueden ser causa de graves malformaciones congénitas. Este descubrimiento sobre la teratogenia de una vitamina, evidencia la especial susceptibilidad del embrión y la necesidad de una extrema prudencia en la prescripción de medicamentos a la mujer gestante.

Tabla N°1. Fármacos que administrados a la madre pueden producir malformaciones congénitas (Teratogénicos):

| Fármaco                | Malformación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido valproico        | Espina bífida (riesgo observado en algunos estudios)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aminoglucósidos        | Hipoacusia, raramente sordera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anticoagulantes orales | Administración durante las diez primeras semanas, hipoplasia de las estructuras nasales (sólo demostrada para la warfarina).                                                                                                                                                                                                          |
| Antifólicos            | La aminopterina durante el primer trimestre produce malformaciones múltiples: retraso del crecimiento, disostosis craneales, hendidura palatina, hipoplasia mandibular y malformaciones del oído. El metotrexato administrado durante el primer trimestre produce malformaciones de los huesos craneales y ausencia de algunos dedos. |
| Cloroquina             | Sordera, déficit neurológicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dietilestilbestrol     | Carcinoma vaginal de células claras en niñas, adolescentes o en mujeres jóvenes.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ergocalciferol         | Depósitos de calcio y estenosis aórtica supraválvular congénita.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Etretinato             | Hidrocefalia, microcefalia, alteraciones del oído externo; aborto.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fenitoína              | Malformaciones de los dedos; hendidura palatina (la incidencia es seguramente parecida entre las madres epilépticas que no toman fenitoína).                                                                                                                                                                                          |
| Tetraciclina           | Tinción de los dientes; depresión del crecimiento óseo.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Tabla N°2. Fármacos que, administrados a la madre, pueden afectar al feto o al neonato:

| Fármaco                               | Efecto indeseable                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido acetilsalicílico                | Déficit en factor XII; disminución de la agregabilidad plaquetaria.                                                   |
| Alcohol                               | Abstinencia aguda; cuadro similar al delirium tremens; déficit neurológicos; diversos.                                |
| Aminoglucósidos                       | Hipoacusia, raramente sordera.                                                                                        |
| Anticoagulantes orales                | Muerte intrauterina; hemorragia post-natal.                                                                           |
| Antitiroideos                         | Bocio neonatal; hipotiroidismo.                                                                                       |
| Cloranfenicol                         | Síndrome gris; colapso cardiovascular.                                                                                |
| Fenitoína                             | Enfermedad hemorrágica del neonato (que responde a la vitamina K).                                                    |
| Fenobarbital                          | Enfermedad hemorrágica del recién nacido (que responde a la vitamina K); síndrome de abstinencia; hiperexcitabilidad. |
| Heroína (dependencia)                 | Bajo peso al nacer; prematuridad; síndrome materna de abstinencia.                                                    |
| Litio                                 | Cianosis; flacidez; letárgica; posible bocio.                                                                         |
| Metafonía (programa de deshabitación) | Síndrome de abstinencia.                                                                                              |
| Noretisterona                         | Masculinización de un feto hembra.                                                                                    |
| Primidona                             | Enfermedad hemorrágica del recién nacido (que responde a vitamina K).                                                 |
| Reserpina                             | Ocupación nasal; letargia; dificultad para el amamantamiento.                                                         |
| Tiazidas                              | Trombocitopenia con hemorragia                                                                                        |
| Vitamina K                            | Hiperbilirrubinemia con aumento del riesgo de ictericia nuclear                                                       |

Tabla Nº3. Sistema actual usado por la FDA de U.S.A. para caracterizar el riesgo para el feto cuando sea absolutamente necesario el uso de fármacos durante el embarazo.

| Categoría | Caracterización del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | Los estudios controlados en humanos no han demostrado riesgos para el feto.                                                                                                                                                                                                                           |
| B         | Los estudios realizados en animales no indican riesgos para el feto, y no se han realizado estudios controlados en seres humanos; o cuando los estudios realizados en animales demuestran la existencia de un riesgo para el feto, pero no los estudios bien controlados realizados en seres humanos. |
| C         | No se han realizado estudios adecuados sobre animales o sobre seres humanos, o cuando se han demostrado efectos adversos                                                                                                                                                                              |
|           | fetales en los animales y no se dispone de datos sobre el ser humano.                                                                                                                                                                                                                                 |
| D         | Existen pruebas de riesgo para el feto humano, pero los beneficios pueden ser aceptables en los casos de una situación que amenaza la vida y en la que no existe un fármaco más seguro.                                                                                                               |
| X         | Estudios en humanos y animales han demostrado anormalidades fetales, o cuando existen riesgos fetales demostrados que sobrepasan cualquier posible beneficio.                                                                                                                                         |

MEDICAMENTOS Y LACTANCIA MATERNA

La mayoría de los medicamentos y otras sustancias químicas que están presentes en la circulación de la madre pueden pasar de la sangre a la leche materna. La presencia en la leche materna de un medicamento o sustancia química ingerida por la madre está relacionada a múltiples factores, tales como la forma de administración (por boca o por inyección), la cantidad y la rapidez de su absorción en el intestino, el tiempo que permanece el medicamento en la sangre materna, el tamaño de la molécula del medicamento y otras características físicas y químicas del medicamento.

A pesar de limitaciones en la cantidad y la calidad de la información disponible sobre la presencia de medicamentos en la leche materna, el análisis de esta información sugiere que para la mayoría de los medicamentos, incluyendo aquellos con acciones potentes, el riesgo para el lactante o recién nacido es mínimo bajo ciertas condiciones.

Entre los medicamentos que no son compatibles con la lactancia materna se pueden mencionar aquellos utilizados en el tratamiento del cáncer, la migraña, padecimientos de la tiroides, la enfermedad reumatoidea, algunos anticoagulantes y las sustancias radioactivas. Algunas de estas sustancias requieren la interrupción temporal de la lactancia mientras dure el tratamiento o estudio diagnóstico.

Siempre debe considerarse el riesgo potencial para el recién nacido o lactante tomando en cuenta que pueden recibir el medicamento a través de la leche materna, con relación al beneficio que obtiene la madre con el medicamento y el beneficio de la lactancia materna (tanto para la madre como para su lactante). En otras palabras, no se debe preguntar si una madre que toma medicamentos debe dar pecho, sino, si una madre que da pecho debe recibir medicamentos. En muchas ocasiones, los padecimientos de la madre pueden aliviarse sin la necesidad de tomar medicamentos, empleando medidas como el reposo, higiene, dieta apropiada, aplicación de compresas, etc.

Cuando la madre que da pecho debe recibir medicamentos es necesario tomar ciertas precauciones para reducir al mínimo el riesgo de exponer al lactante a un medicamento administrado, a través de la leche materna tales como:

1. Emplear medicamentos con menor capacidad para acumularse en la leche materna (con carácter ácido y no los alcalinos).
2. Usar medicamentos de menor potencia.
3. Tomar el medicamento inmediatamente después de haber dado pecho.
4. Observar al lactante por cambios en su comportamiento (actividad, sueño, irritabilidad) o por cambios en su piel.

Tabla Nº1. Medicamentos contraindicados durante la lactancia:

| Medicamento          | Signo/síntoma en lactante o efecto sobre lactancia                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bromocriptina        | Disminuye la lactancia                                                                                                                                      |
| Cimetidina*          | Puede disminuir la acidez gástrica en el lactante, inhibir metabolismo de los medicamentos, y ocasionar la estimulación del Sistema Nervioso Central (SNC). |
| Clemastina           | Marco, irritabilidad, rechazo de alimentos, llanto agudo, rigidez del cuello.                                                                               |
| Ciclofosfamida+      | Posible inhibición inmune; efecto desconocido sobre el crecimiento o asociación con carcinogénesis.                                                         |
| Ergotamina           | Vómitos, diarrea, convulsiones (dosis empleadas en medicamentos para la migraña).                                                                           |
| Fenindiona           | Hemorragia.                                                                                                                                                 |
| Tiamazol (metimazol) | Posible intervención con la función de la tiroides.                                                                                                         |
| Metotrexato          | Posible supresión inmune; efecto desconocido sobre el crecimiento o asociación con carcinogénesis.                                                          |
| Sales de oro         | Erupción cutánea, inflamación del riñón y del hígado.                                                                                                       |
| Tiouracilo           | Función disminuida de la tiroides; no se aplica a propiltiouracilo.                                                                                         |

\*Se concentra en la leche materna

+ Información no disponible sobre otros agentes citotóxicos

Tabla Nº 2. Medicamentos que requieren el cese temporal de la lactancia:

| Medicamento       | Modificación recomendada en patrón de lactancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metronidazol      | Suspensión de lactancia por 12-24 horas para permitir excreción de la dosis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Radiofármacos     | Radioactividad presente en la leche, consultar al especialista en medicina nuclear antes de llevar a cabo el estudio diagnóstico de manera que se pueda emplear otra sustancia radionuclear con tiempo de excreción más corto en la leche materna; antes del estudio la madre deberá ordeñarse y almacenar suficiente leche en el congelador para alimentar al lactante; después del estudio la madre deberá ordeñarse para mantener la producción de leche pero tendrá que desechar toda la leche ordeñada durante el tiempo requerido en que haya radioactividad presente en la leche. |
| Galio-69          | Radioactividad presente en la leche por 2 semanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sodio Radioactivo | Radioactividad presente en la leche por 96 hr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnecio-99       | Radioactividad presente en la leche por 15 hr-3 días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yodo-125          | Riesgo de cáncer de la tiroides; radioactividad presente en la leche por 12 días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yodo-131          | Radioactividad presente en la leche por 2-14 días dependiendo del estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### MEDICAMENTOS Y ENFERMEDAD HEPÁTICA

La enfermedad del hígado puede alterar la respuesta a medicamentos en varias maneras, y se debe mantener al mínimo la prescripción de medicamentos en todo paciente con enfermedad hepática severa. Los principales problemas ocurren en pacientes con ictericia, ascitis, o evidencia de encefalopatía.

**Alteración del metabolismo del fármaco.** Para muchos medicamentos el hígado es la ruta principal de eliminación, pero la reserva hepática parece ser grande y la enfermedad hepática tiene que ser severa antes de ocurrir cambios importantes en el metabolismo de medicamentos. Las pruebas hepáticas de rutina son una pobre guía de la capacidad del

hígado de metabolizar medicamentos, y en el paciente individual no es posible predecir el grado de afección del metabolismo de un medicamento en particular.

Algunos medicamentos, como, rifampicina, se excretan en la bilis sin cambios y pueden acumularse en pacientes con ictericia obstructiva intrahepática o extrahepática.

**Hipoproteínemia.** La hipoalbuminemia en la enfermedad hepática severa se asocia a una menor fijación del fármaco a proteínas y a un aumento en la toxicidad de algunos medicamentos con mucha afinidad a las proteínas como la fenitoína y la prednisolona.

**Coagulación disminuida.** La reducción en la síntesis de factores de la coagulación, indicado por un tiempo de protrombina prolongado, aumenta la sensibilidad a los anticoagulantes orales como la warfarina y la fenindiona.

**Encefalopatía hepática.** En la enfermedad hepática severa muchos medicamentos pueden afectar la función cerebral y pueden precipitar encefalopatía hepática. Estos incluyen todos los medicamentos sedantes, analgésicos opiáceos, aquellos diuréticos que producen hipokalemia, y medicamentos que producen estreñimiento.

**Sobrecarga de fluidos.** El edema y la ascitis pueden exacerbarse por medicamentos que retienen fluidos, por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos y corticoesteroides.

**Medicamentos hepatotóxicos.** La hepatotoxicidad es dosis-dependiente o no predecible (idiosincrásica). Los medicamentos que causan toxicidad dosis-dependiente pueden hacerlo a dosis menores que en pacientes con función hepática normal, y algunos medicamentos que producen reacciones de tipo idiosincrásico lo hacen con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad hepática. Se recomienda evitar estos medicamentos.

Medicamentos que se deben evitar o usar con mucha cautela en la enfermedad hepática:

| Medicamento                      | Comentario                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analgésicos                      | Evitar. Los opiáceos pueden precipitar coma.                                                                                                                        |
| Andrógenos                       | Evitar. Toxicidad dosis dependiente con algunos, y producen retención de fluidos.                                                                                   |
| Antiácidos                       | En pacientes con retención de líquidos, evitar aquellos que contienen gran cantidad de sodio. Evitar aquellos que causan estreñimiento, puede precipitar coma.      |
| Anticoagulantes orales           | Evitar. Especialmente si el tiempo de protrombina ya está prolongado.                                                                                               |
| Anticonceptivos orales           | Evitar en la enfermedad colestásica y en pacientes con una historia de prurito o colestasis durante el embarazo.                                                    |
| Antidepresivos                   | Los tricíclicos son preferibles a los Inhibidores de la Mono Aminoxidasa (IMAOs), pero los efectos sedantes están aumentados                                        |
| Antihistamínicos                 | Evitar. Puede precipitar coma.                                                                                                                                      |
| Antiinflamatorios no esteroideos | Riesgo aumentado de hemorragia gastrointestinal y puede causar retención de líquidos.                                                                               |
| Antipsicóticos                   | Todos pueden precipitar coma; las fenotiazinas son hepatotóxicas.                                                                                                   |
| Ansiolíticos                     | Todos pueden precipitar coma.                                                                                                                                       |
| Aspirina                         | Evitar. Riesgo aumentado de sangramiento gastrointestinal.                                                                                                          |
| Aurotiomalato (oro)              | Evitar en enfermedad hepática severa. Puede producir hepatotoxicidad.                                                                                               |
| Bezafibrato                      | Evitar en la enfermedad hepática severa.                                                                                                                            |
| Cloranfenicol                    | Evitar. Riesgo aumentado de depresión de médula ósea.                                                                                                               |
| Clorpropamida                    | Evitar. Riesgo aumentado de hipoglicemia y puede producir ictericia.                                                                                                |
| Colestiramina                    | Interfiere con la absorción de vitaminas solubles en lípidos y puede empeorar la mala absorción en la cirrosis biliar primaria.                                     |
| Cimetidina                       | Riesgo aumentado de confusión; reducir dosis.                                                                                                                       |
| Clindamicina                     | Reducir dosis.                                                                                                                                                      |
| Clomifeno                        | Evitar en la enfermedad hepática severa.                                                                                                                            |
| Diuréticos de asa                | La hipokalemia puede precipitar coma; se debe usar diurético ahorrador de potasio para prevenir esto; riesgo aumentado de hipomagnesemia en la cirrosis alcohólica. |

|                  |                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doxorrubicina    | Reducir dosis según la concentración de bilirrubina.                                                                                             |
| Epirubicina      | Reducir dosis según la concentración de bilirrubina.                                                                                             |
| Ergotamina       | Evitar en la enfermedad hepática severa: Riesgo de toxicidad aumentada.                                                                          |
| Eritromicina     | Puede causar hepatotoxicidad idiosincrásica.                                                                                                     |
| Etretinato       | Evitar: Puede ocurrir mayor compromiso hepático.                                                                                                 |
| Fenitoína        | Reducir dosis para evitar toxicidad.                                                                                                             |
| Fenobarbital     | Puede precipitar coma.                                                                                                                           |
| Isoniazida       | Evitar: Hepatotoxicidad idiosincrásica es más común.                                                                                             |
| Lignocaina       | Evitar (o reducir dosis) en enfermedad hepática severa.                                                                                          |
| Magnesio sulfato | Evitar en el coma hepático si hay riesgo de falla renal.                                                                                         |
| Metildopa        | Evitar. Riesgo aumentado de hepatotoxicidad.                                                                                                     |
| Metotrexato      | Toxicidad dosis-dependiente. Evitar en condiciones no malignas (ejemplo, psoriasis).                                                             |
| Metronidazol     | Reducir dosis en enfermedad hepática severa.                                                                                                     |
| Nifedipina       | Reducir dosis.                                                                                                                                   |
| Nitroprusiato    | Evitar en enfermedad hepática severa.                                                                                                            |
| Paracetamol      | Toxicidad dosis-dependiente. Evitar dosis grandes.                                                                                               |
| Pirazinamida     | Evitar. Hepatotoxicidad idiosincrásica más común.                                                                                                |
| Prednisolona     | Efectos colaterales más comunes.                                                                                                                 |
| Prednisona       | Prednisolona es preferible (se requiere conversión de prednisona a prednisolona en el hígado antes de ser activa).                               |
| Primidona        | Puede precipitar coma.                                                                                                                           |
| Propranolol      | Reducir dosis oral.                                                                                                                              |
| Rifampicina      | Eliminación comprometida; puede aumentarse riesgo de hepatotoxicidad; evitar o no exceder 8 mg/kg/día.                                           |
| Teofilina        | Reducir dosis.                                                                                                                                   |
| Tetraciclinas    | Evitar. Toxicidad dosis-dependiente por la vía IV (intravenosa).                                                                                 |
| Tiazidas         | La hipokalemia puede precipitar coma (prevenible con diurético ahorrador de potasio); riesgo aumentado de hipomagnesemia en cirrosis alcohólica. |
| Valproato        | Evitar si es posible. La hepatotoxicidad e insuficiencia hepática pueden ocurrir ocasionalmente (usualmente en los primeros 6 meses).            |
| Verapamilo       | Reducir dosis.                                                                                                                                   |
| Zidovudina       | Puede ocurrir acumulación.                                                                                                                       |

### USO DE MEDICAMENTOS EN LA INSUFICIENCIA RENAL

El uso de medicamentos puede implicar problemas especiales en pacientes con insuficiencia renal. Esto se debe a tres motivos:

1. La incapacidad para excretar un medicamento o sus metabolitos que normalmente son eliminados por el riñón, puede dar lugar a su acumulación en caso de administración repetida.
2. En las nefropatías acompañadas de hipoalbuminemia se pueden registrar efectos farmacológicos más intensos como consecuencia de una disminución de la fijación a las proteínas plasmáticas y del incremento consiguiente de la fracción libre circulante del medicamento.
3. En caso de insuficiencia renal los efectos de algunos medicamentos (por ejemplo diuréticos tiazídicos) pueden disminuir.

A menudo estos problemas se pueden resolver, bien mediante un ajuste de la dosis o bien por la elección de un producto alternativo. Asimismo, la especial susceptibilidad de los pacientes nefróticos a los efectos adversos potenciales de los medicamentos obliga a hacer una selección cuidadosa de los medicamentos utilizados.

La necesidad de modificar la pauta de administración de un medicamento en caso de insuficiencia renal depende de tres factores:

1. La proporción del medicamento que normalmente se excreta en forma inalterada por la orina;
2. El grado de afectación del funcionamiento renal: generalmente no es necesario modificar las pautas de administración con valores de depuración de creatinina superiores a 50 ml/min;
3. El margen terapéutico del medicamento considerado, es decir la diferencia entre las dosis (o concentraciones) terapéuticas y las dosis (o concentraciones) tóxicas.

En general en caso de administración repetida se suelen reducir las dosis de mantenimiento o bien se alarga el intervalo de dosificación, o bien ambas cosas a la vez, pero no se suele alterar la dosis inicial.

Se debe evitar, en lo posible, el uso de medicamentos nefrotóxicos en los pacientes con enfermedad renal. En estos pacientes hay una mayor probabilidad de que las consecuencias de la nefrotoxicidad sean más graves cuando la reserva renal ya está comprometida.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS DE IMPORTANCIA CLÍNICA

La interacción farmacológica potencial se puede definir como la probabilidad de que un medicamento altere la intensidad de los efectos intrínsecos de otro, si ambos se administran de manera simultánea.

Las interacciones medicamentosas pueden ser:

|                                  |                                 |                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Benéficas. | <input type="radio"/> Adversas. | <input type="radio"/> Notables o sobresalientes. |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|

También pueden considerarse como de índole **farmacocinética** (determinadas por modificaciones en la absorción, la distribución o la eliminación de un medicamento por el otro) o de tipo **farmacodinámico** (competencia por receptores entre agonistas y antagonistas).

Los efectos de un medicamento pueden ser aumentados o disminuidos por la administración previa o simultánea de otro medicamento. Se pueden predecir muchas interacciones farmacológicas si se conocen los efectos farmacodinámicos, las propiedades farmacocinéticas y los mecanismos de acción de los medicamentos que en ellas intervienen. La mayor parte podrían evitarse por la aplicación de estos conocimientos y la aplicación simple del sentido común.

Las interacciones medicamentosas pueden producirse por varios mecanismos, principalmente acciones sobre los mismos receptores o sistemas fisiológicos y alteración de la farmacocinética de los medicamentos. Las enfermedades inducidas por fármacos o las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico pueden modificar la respuesta o potenciar la toxicidad de otro medicamento.

Las interacciones observadas in vitro o en animales de experimentación no se producen necesariamente en la especie humana por lo cual esta información debe aplicarse con mucha cautela.

En los pacientes a los que se administre una combinación de medicamentos en la que se ha descrito una interacción no se producirá siempre esa interacción. Muchas interacciones con importancia clínica, sobre todo las de naturaleza farmacocinética, dependen de varios factores, además de los medicamentos administrados.

Las interacciones farmacocinéticas demostradas con una combinación determinada de medicamentos no deben ser extrapoladas a otras combinaciones de medicamentos parecidos a los primeros.

Debido a que la administración de más de un medicamento es una práctica común, la posibilidad de interacciones es grande, pero en la actualidad es difícil valorar la importancia global de las interacciones farmacológicas, y sus peligros probablemente se han exagerado.

Las interacciones más frecuentes, con mucha diferencia, son las de potenciación mutua de los depresores del sistema nervioso central, como los hipnóticos, tranquilizantes, antidepresivos, etanol, analgésicos, antihistamínicos, anticonvulsivantes y otros medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central.

Las interacciones más fácilmente reconocibles son aquellas en las que intervienen los

anticoagulantes orales, hipoglicemiantes orales, glucósidos cardíacos y citostáticos. Estos medicamentos tienen un estrecho margen terapéutico y una respuesta exagerada a su administración es potencialmente mortal. Las interacciones en las que participan algunos antihipertensivos y anticonvulsivantes también pueden ser importantes.

### INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS IMPORTANTES

| FÁRMACOS O GRUPOS DE FÁRMACOS | INTERACCIONES CLÍNICAMENTE DOCUMENTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acetaminofén</li> <li>▪ Anticoagulantes orales</li> <li>▪ Depresores del sistema nervioso central</li> <li>▪ Insulina</li> <li>➤ Fármacos que pueden originar una reacción similar a la del disulfiram: cefalosporinas, hidrato de cloral, disulfiram, metronidazol, sulfonilureas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alopurinol                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anticoagulantes orales</li> <li>▪ Azatioprina</li> <li>▪ Mercaptopurina</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antiácidos                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Digoxina</li> <li>▪ Hierro</li> <li>▪ Itraconazol</li> <li>▪ Ketoconazol</li> <li>▪ Quinolonas</li> <li>▪ Salicilatos</li> <li>▪ Poliestireno sódico</li> <li>▪ Tetraciclina</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anticoagulantes orales        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fármacos que pueden aumentar el efecto anticoagulante: antiinflamatorios no esteroides, amiodarona, esteroides anabólicos, cimetidina, ciprofloxacina, clofibrato, cloranfenicol, danazol, dextrotiroxina, disulfiram, eritromicina, fluconazol, gemfibrocil, hormonas tiroideas, lovastatina, metronidazol, miconazol, propafenona, quinidina, salicilatos, sulfonamidas, trimetropin con sulfa.</li> <li>➤ Fármacos que pueden disminuir el efecto anticoagulante: barbitúricos, carbamacepina, colestiramina, fenitoína, primidona, rifampicina.</li> <li>➤ Efectos de los anticoagulantes sobre otros</li> </ul> |

|                                              | fármacos: Fenitoína, hipoglicemiantes orales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antidepresores, tricíclicos y heterocíclicos | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Barbitúricos</li> <li>▪ Carbamacepina</li> <li>▪ Cimetidina</li> <li>▪ Clonidina</li> <li>▪ Guanetidina</li> <li>▪ Inhibidores de la monoaminooxidasa</li> <li>▪ Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina</li> <li>▪ Quinidina</li> <li>▪ Simpatomiméticos</li> </ul>                                                                                                                   |
| Antihistamínicos de segunda generación       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eritromicina</li> <li>▪ Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina</li> <li>▪ Itraconazol</li> <li>▪ Ketoconazol</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antiinflamatorios no esteroides (AINES)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fenitoína</li> <li>▪ Furosemida</li> <li>▪ Hidralacina</li> <li>▪ Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina</li> <li>▪ Metotrexato</li> <li>▪ Triamtereno</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Antimuscarínicos                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antimuscarínicos combinados</li> <li>▪ Levodopa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barbitúricos                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acido valproico</li> <li>▪ Bloqueadores de los beta-adrenorreceptores</li> <li>▪ Bloqueadores de los canales de calcio</li> <li>▪ Ciclosporina</li> <li>▪ Corticosteroides</li> <li>▪ Depresores del Sistema Nervioso Central</li> <li>▪ Doxiciclina</li> <li>▪ Estrógenos</li> <li>▪ Fenotiacinas</li> <li>▪ Itraconazol</li> <li>▪ Ketoconazol</li> <li>▪ Quinidina</li> <li>▪ Teofilina</li> </ul> |
| Bloqueadores de beta-adrenorreceptores       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fármacos que pueden incrementar el efecto bloqueador beta: cimetidina, clorpromacina, furosemida, hidralacina</li> <li>➤ Fármacos que pueden disminuir el efecto bloqueador beta: antiinflamatorios no esteroides, inductores de enzima</li> <li>➤ Efectos de los bloqueadores beta sobre otros fármacos: clonidina, insulina, lidocaína, prazosina, simpatomiméticos</li> </ul>                      |
| Bloqueadores de canales de calcio            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Carbamacepina, ciclosporina, cimetidina, fenitoína, rifampicina</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carbamacepina                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ciclosporina</li> <li>▪ Cimetidina</li> <li>▪ Claritromicina</li> <li>▪ Corticosteroides</li> <li>▪ Danazol</li> <li>▪ Diltiazem</li> <li>▪ Doxiciclina</li> <li>▪ Eritromicina</li> <li>▪ Estrógenos</li> <li>▪ Haloperidol</li> <li>▪ Inhibidores de la Recaptación de Serotonina</li> <li>▪ Nefazodona</li> <li>▪ Propoxifeno</li> </ul>                                                           |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teofilina</li> <li>▪ Verapamil</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ciclosporina                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aminoglicósidos</li> <li>▪ Anfotericina B</li> <li>▪ Andrógenos</li> <li>▪ Barbitúricos</li> <li>▪ Carbamacepina</li> <li>▪ Diltiazem</li> <li>▪ Eritromicina</li> <li>▪ Fenitoína</li> <li>▪ Fluconazol</li> <li>▪ Ketoconazol</li> <li>▪ Lovastatina</li> <li>▪ Rifampicina</li> <li>▪ Verapamil</li> </ul>                                                     |
| Cloranfenicol                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fenitoína</li> <li>▪ Hipoglicemiantes de sulfonilurea</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diuréticos ahorradores de potasio | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina</li> <li>▪ Suplementos de potasio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estrógenos                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ampicilina</li> <li>▪ Corticosteroides</li> <li>▪ Diazepam</li> <li>▪ Fenitoína</li> <li>▪ Griseofulvina</li> <li>▪ Rifampicina</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Fenitoína                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fármacos cuyo metabolismo se estimula con la fenitoína: Corticosteroides, doxiciclina, metadona, quinidina, teofilina, verapamil</li> <li>➤ Fármacos que inhiben el metabolismo de la fenitoína: Amiodarona, cloranfenicol, fluconazol, fluoxetina, isoniacida, miconazol</li> <li>➤ Fármacos que aumentan el metabolismo de la fenitoína: Rifampicina</li> </ul> |
| Glucósidos digitálicos            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fármacos que pueden incrementar el efecto digitálico: Amiodarona, diltiazem, eritromicina, espironolactona, fármacos agotadores de potasio, propafenona, quinidina, verapamil</li> <li>➤ Fármacos que pueden disminuir el efecto digitálico: Caolín pectina, penicilamina, rifampicina, sulfasalacina</li> </ul>                                                  |
| Hierro                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hormonas tiroideas</li> <li>▪ Metildopa</li> <li>▪ Quinolonas</li> <li>▪ Tetraciclinas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Levodopa                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fenitoína</li> <li>▪ Fenotiacinas</li> <li>▪ Inhibidores de la monoaminoxidasa</li> <li>▪ Papaverina</li> <li>▪ Piridoxina</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Litio                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antiinflamatorios no esteroideos</li> <li>▪ Diuréticos</li> <li>▪ Haloperidol</li> <li>▪ Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina</li> <li>▪ Metildopa</li> <li>▪ Teofilina</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| Quinolonas                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cafeína</li> <li>▪ Sucralfato</li> <li>▪ Teofilina</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resinas fijadoras de ácidos       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acetaminofen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biliares         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diuréticos tiacídicos</li> <li>▪ Hormonas tiroideas</li> <li>▪ Glucósidos digitálicos</li> <li>▪ Metotrexato</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rifampicina      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Corticosteroides</li> <li>▪ Hipoglicemiantes de sulfonilurea</li> <li>▪ Ketoconazol</li> <li>▪ Itraconazol</li> <li>▪ Teofilina</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salicilatos      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Corticosteroides</li> <li>▪ Heparina</li> <li>▪ Inhibidores de la anhidrasa carbónica</li> <li>▪ Metotrexato</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teofilina        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Benzodiacepinas</li> <li>▪ Claritromicina</li> <li>▪ Diltiazem</li> <li>▪ Eritromicina</li> <li>▪ Tabaquismo</li> <li>▪ Tracina</li> <li>▪ Verapamil</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Warfarina Sódica | <p>Interacción moderada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alopurinol</li> <li>▪ Aminoglucósidos</li> <li>▪ Carbamacepina</li> <li>▪ Cloranfenicol</li> <li>▪ Anticonceptivos orales</li> <li>▪ Corticosteroides</li> <li>▪ Diazóxido</li> <li>▪ Diflunisal</li> <li>▪ Eritromicina</li> <li>▪ Etanol (alcohol, licor, cerveza)</li> <li>▪ Griseofulvina</li> <li>▪ Heparina</li> <li>▪ Indometacina</li> <li>▪ Ácido mefenámico</li> <li>▪ Metronidazol</li> <li>▪ Miconazol</li> <li>▪ Fenitoína</li> <li>▪ Quinidina</li> <li>▪ Vitamina E</li> <li>▪ Sulindaco</li> <li>▪ Vitamina K</li> </ul> <p>Interacción sumamente importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amiodarena</li> <li>▪ Esteroides Anabólicos</li> <li>▪ Antidiabéticos (lorpropamida, Tolbutamida)</li> <li>▪ Barbitúricos</li> <li>▪ Cimetidina</li> <li>▪ Clofibrato</li> <li>▪ Fenilbutazona</li> <li>▪ Rifampicina</li> <li>▪ Salicilatos</li> <li>▪ Sulfonamidas</li> <li>▪ Hormonas Tiroideas.</li> </ul> |

#### REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

##### Definición de reacciones adversas:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido "reacción adversa" como "cualquier respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada y que ocurre a dosis usadas en humanos para la profilaxis, el diagnóstico o tratamiento de una

enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica". En esta definición no se incluyen los errores de medicación ya que se implica el uso apropiado y rutinario del medicamento. Tampoco se clasifican como reacciones adversas el abuso de drogas, la intoxicación accidental o con intento suicida, las dosis inadecuadas o los problemas de biodisponibilidad que dan lugar a una falla terapéutica, aunque se consideran en el contexto más amplio de riesgo global asociado al uso de un medicamento. Las interacciones medicamentosas se pueden clasificar como reacciones adversas cuando las circunstancias y el resultado clínico reúnen los criterios especificados en la definición de la OMS.

Ocasionalmente, las reacciones adversas no son causadas por el ingrediente activo primario. Las impurezas que se formaron durante la producción, los preservantes, los vehículos, los productos de degradación, y los excipientes, que se consideran terapéuticamente "inactivos" también pueden producir efectos adversos.

Las reacciones adversas resultan de acciones farmacológicas conocidas y desconocidas que producen toxicidad más o menos predecibles, así como de hipersensibilidad e idiosincrasia no predecible. La información sobre reacciones adversas siempre es incompleta cuando un medicamento se introduce por primera vez al uso clínico. La exposición a un medicamento en la fase de pre-comercialización se limita a 1,000-3,000 personas. Por ende, la probabilidad de identificar reacciones adversas graves con una frecuencia menor de 1:1,000 es remota. El rango completo de reacciones adversas puede no conocerse hasta que un medicamento haya sido usado (1) en pacientes con una amplia variedad de enfermedades, trastornos, o condiciones, (2) en cientos de miles de pacientes, especialmente para eventos adversos con una incidencia de menos de 1 a 10 en 10,000, y (3) por un período prolongado o sólo mucho tiempo después de la exposición al medicamento.

#### Prevención de reacciones adversas:

En general, se pueden prevenir las reacciones adversas que son consecuencia de la exageración de su efecto farmacológico conocido y dependiente de la dosis. Las siguientes pautas pueden contribuir a reducir la incidencia de reacciones adversas.

1. Nunca usar un fármaco a menos que exista una buena indicación. Si la paciente está embarazada, no usar un medicamento a menos que la necesidad sea imperiosa.
2. Es muy importante reconocer la alergia y la idiosincrasia como causas de reacciones adversas. Preguntar al paciente si ha tenido reacciones previas, o si existe algún antecedente en familiar cercano.
3. Preguntar si el paciente está tomando otros medicamentos, incluyendo la automedicación; recordar que pueden ocurrir interacciones.
4. La edad y las enfermedades hepáticas y renales pueden alterar el metabolismo o la excreción de medicamentos, por lo cual podría ser necesario prescribir a dosis más bajas. Factores farmacogenéticos pueden causar variaciones en la tasa de metabolismo, particularmente de la isoniazida y de los antidepresivos tricíclicos.
5. Prescriba el mínimo de medicamentos posible y provea información muy clara a los adultos mayores o a cualquier paciente propenso a interpretar en forma errónea las instrucciones complicadas.
6. Cuando sea posible, utilice un medicamento ampliamente conocido.
7. Con un nuevo medicamento hay que estar particularmente alerta ante la posibilidad de reacciones adversas o acontecimientos inesperados.
8. Advertir al paciente si hay probabilidad de que ocurran reacciones adversas.

#### SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA

Mediante Ley 1 de 10 de enero de 2001 se crea el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), al cual corresponde implantar los procedimientos necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFV) y de integrar, identificar y divulgar la información de las notificaciones de las sospechas de reacciones

adversas, reacciones adversas conocidas, fallas farmacéuticas y terapéuticas de los medicamentos y productos farmacéuticos.

Los objetivos primordiales del Sistema Nacional de Farmacovigilancia son:

- a. Obtener información necesaria sobre reacciones adversas, fallas farmacéuticas y terapéuticas de los medicamentos y productos farmacéuticos para la toma oportuna de acciones con el fin que la población panameña pueda obtener productos de mayor seguridad, calidad y eficacia y a la vez promover el uso racional de los mismos.
- b. Mantener una comunicación dinámica y adecuada con los profesionales de la salud para la notificación de las sospechas de reacciones adversas, fallas farmacéuticas y terapéuticas de los medicamentos y productos farmacéuticos en forma directa.
- c. Ingresar como centro colaborador al Programa Internacional de Monitoreo de Drogas de la Organización Mundial de la Salud.
- d. Establecer la vía oficial de comunicación para el reporte de sospechas de reacciones adversas, fallas farmacéuticas y terapéuticas de los medicamentos, la cual se hará a través de los formularios correspondientes.
- e. Tramitar las notificaciones de reacciones adversas, fallas farmacéuticas y terapéuticas de los medicamentos tomando en cuenta la confidencialidad tanto del notificador, como del paciente y de la instalación de salud que informa.

La notificación de sospechas de reacciones adversas, fallas farmacéuticas y terapéuticas, se hará en los formularios correspondientes para tal fin, los cuales están destinados a:

- a. Los profesionales de la salud y pacientes quienes lo remitirán en primera instancia a los Centros Regionales e Institucionales de Farmacovigilancia y en segunda instancia directamente al CNFV.
- b. Las empresas distribuidoras y fabricantes lo enviarán directamente al CNFV.

Los laboratorios fabricantes, los proveedores de medicamentos y todo el personal médico, científico y técnico están obligados a notificar de inmediato a la Autoridad de Salud, sus sospechas de reacciones adversas y fallas farmacéuticas y terapéuticas que pueden haberse derivado por o durante el uso de los medicamentos y productos farmacéuticos, que se fabriquen o comercialicen en la República de Panamá. La omisión de ésta responsabilidad es considerada como una falta leve por ocultar deliberadamente o no comunicar oportunamente la información referida, acarreando la sanción correspondiente establecida en la Ley 1 citada.

### **ALERGIA A MEDICAMENTOS**

La farmacoterapia conlleva, desafortunadamente reacciones adversas a medicamentos que constituyen probablemente la causa más común de padecimientos iatrógenos en el humano. Las reacciones alérgicas constituyen de un 6% a 10% de todas las reacciones adversas a medicamentos. La penicilina, la aspirina y las sulfonamidas representan aproximadamente 90% de las causas.

La alergia química es una reacción adversa que resulta de la sensibilización previa a una sustancia particular o a una que es estructuralmente similar y que son mediadas por el sistema inmune. Los términos hipersensibilidad y alergia a medicamentos son usados con frecuencia para describir el estado alérgico. Una reacción alérgica a un medicamento es, por tanto, cualquier reacción adversa no relacionada con la acción farmacológica normal del medicamento; es cualitativamente anormal y para la cual se puede demostrar claramente o inferir un mecanismo inmunológico.

Las manifestaciones clínicas de reacciones alérgicas a medicamentos son diversas y múltiples. La forma más agresiva de hipersensibilidad es la anafilaxis. La expresión clínica más común es la reacción cutánea de prurito, la urticaria, la dermatitis de contacto y eczematosa y la erupción morbiliforme. Otras reacciones pueden mimetizar cualquier

síndrome clínico conocido (fiebre, ictericia, vasculitis, nefropatía, neuropatía, asma, neumonitis por hipersensibilidad, trombocitopenia, anemia aplásica y anemia hemolítica). Es importante que el profesional médico mantenga siempre presente las características que ayudan a distinguir la hipersensibilidad de otras formas de reacción a los medicamentos:

1. Ocurren solamente en una pequeña porción de la población tratada con el medicamento.
2. La reacción sólo ocurre al menos siete días después de administrar el medicamento, a menos que hubiese sensibilización previa a la misma.
3. Las reacciones son diferentes a las acciones farmacológicas conocidas del medicamento pero semejan reacciones de hipersensibilidad tales como anafilaxis y enfermedad del suero.
4. Las reacciones pueden ocurrir con dosis bajas del medicamento y pueden reproducirse con fármacos de estructura química similar.
5. Los síntomas usualmente persisten por tres a cinco días después que se discontinúa el medicamento.

En general, la utilidad práctica de pruebas in vitro para hacer el diagnóstico de hipersensibilidad a un medicamento es muy limitada. Por tanto, siempre que ocurra una reacción cutánea en un paciente bajo tratamiento con fármacos se debe sospechar de la medicación del paciente. Igualmente si hay una reacción sistémica inusual no esperada en la enfermedad que está en tratamiento.

Debe hospitalizarse todo paciente con eritema multiforme o síndrome de Stevens-Johnson; dermatitis exfoliativa, angioedema que involucre la laringe o signos sistémicos (artritis severa o afección de órganos).

Los pacientes con historia previa de reacción a medicamentos no deben recibir el mismo otra vez. Si no hay alternativa, consultar al inmunólogo, dado que muchos medicamentos, en especial la penicilina y sus derivados, anestésicos locales y tintes radio-opacos pueden administrarse si se toman las medidas apropiadas, aún habiendo ocurrido una reacción alérgica previa.

### **Hospital de Larga Estancia Enfermedad de Hansen (Lepra)**

La Lepra es una enfermedad crónica e infecciosa, causada por el Bacilo Mycobacterium Lepral.

Representa un problema de salud a nivel mundial, pudiendo brotar esporádicamente debido al movimiento migratorio.

La enfermedad afecta principalmente la piel los nervios periféricos, la mucosa de las vías aéreas superior y también los ojos, además de algunas estructuras.

La introducción y difusión de la poliquimioterapia (PQT) ha modificado radicalmente el perfil de la enfermedad en todos los países endémicos.

#### **Ventajas:**

- Altamente eficaz para la cura
- Reduce el período de tratamiento
- Bien aceptado por los enfermos
- Fácil de aplicar en el terreno
- Impide el desarrollo de la resistencia medicamentosa
- Interrumpe la transmisión de la infección
- Reduce el riesgo de la recidiva
- Previene las discapacidades
- Mejora la actitud de la comunidad.

Esquema del tratamiento para la enfermedad de Hansen (Lepra) recomendados por la O.M.S.

Todos los casos nuevos y registrados deben iniciar de inmediato los esquemas PQT (Poliquimioterapia); son una combinación de Rifampicina, Clofazimina y Dapsona.

**Cuidados generales para el uso de Medicamentos de la PQT:**

- Los medicamentos no deben administrarse a enfermos con disfunción renal o hepático grave.
- La dapsona no debe administrarse a enfermos con anemia intensa. Se debe mejorar la anemia antes de iniciar tratamiento con PQT.
- Los enfermos alérgicos a las sulfas no deben recibir dapsona.
- En caso de toxicidad grave por dapsona, los enfermos PB deben recibir 50 mgs de clofazimina al día y una dosis mensual de 300mgs como sustituto de la dapsona. Los enfermos MB deben proseguir el tratamiento con Rifampicina y Clofazimina a las dosis habituales.
- En caso de resistencia a la rifampicina (comprobada por la prueba en la almohadilla del ratón) en pacientes Multibacilares:
  - Clofazimina 50mgs diarios, junto con 2 de los siguientes medicamentos por 6 meses; ofloxacina 400mgs diarios, Minociclina 100mgs diarios.
  - Clofazimina 50mgs diarios junto con (1) uno de los siguientes medicamentos por 18 meses más.
  - Minociclina: 100mgs diarios
  - Ofloxacina: 400mgs

En caso de rechazo a la clofazimina por la pigmentación de la piel; se puede sustituir por:

- Ofloxacina 400mgs diarios ó
- Minociclina: 100mgs diarios.

Debe considerarse curado todo caso PB que haya tomado las seis dosis mensuales indicadas de PQT en un máximo de 9 meses.

Debe considerarse curado todo caso MB que haya tomado las 24 dosis mensuales.

**A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN DOS LISTAS CORRESPONDIENTES A LOS RENGLONES DE MEDICAMENTOS:**

**UNA SEGÚN GRUPO ANATÓMICO Y SUB-GRUPO TERAPÉUTICO (ATC) CON SUS INDICACIONES TERAPÉUTICAS Y OTRA EN ORDEN ALFABÉTICO.**

| LISTA CORRESPONDIENTE A LOS RENGLONES DE MEDICAMENTOS SEGUN GRUPO ANATOMICO Y SUB-GRUPO TERAPEUTICO (ATC) CON SUS INDICACIONES TERAPEUTICAS |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  | </ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24/1-

| #   | A | 02 | B | C | 01 | Omeprazol                 | 20mg         | Cápsula                      | Oral     | Inhibidores de la bomba de protones                                                                           | Tratamiento combinado con antibióticos para la erradicación de la infección comprobada por <i>Helicobacter pylori</i> , en úlcera péptica.                                                           | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
|-----|---|----|---|---|----|---------------------------|--------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| #17 | A | 02 | B | C | 01 | Omeprazol                 | 20mg         | Cápsula                      | Oral     | Inhibidores de la bomba de protones                                                                           | Tratamiento combinado con antibióticos para la erradicación de la infección comprobada por <i>Helicobacter pylori</i> , en úlcera péptica.                                                           | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #18 |   |    |   |   |    |                           |              |                              |          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
| #19 | A | 02 | B | C | 01 | Omeprazol                 | 10mg         | Cápsula                      | Oral     | Inhibidores de la bomba de protones                                                                           | Tratamiento combinado con antibióticos para la erradicación de la infección comprobada por <i>Helicobacter pylori</i> , en úlcera péptica.                                                           | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #20 | A | 02 | B | X | 02 | Sucralfato                | 40mg         | Vial                         | IV       | Inhibidores de la bomba de protones                                                                           | Tratamiento combinado con antibióticos para la erradicación de la infección comprobada por <i>Helicobacter pylori</i> , en úlcera péptica.                                                           | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #21 | A | 02 | B | X | 02 | Sucralfato                | 1g           | Comprimido, o gel oral unido | Oral     | Otros fármacos para el tratamiento de la úlcera péptica                                                       | Tratamiento de la úlcera péptica. Tratamiento de la hipersecreción patológica gastroduodenal. Profilaxis de la úlcera de stress.                                                                     | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #22 | A | 02 | D | A | 00 | Simeticona                | 40mg/ml      | Frasco 30ml                  | Oral     | Agente antiespumante en procedimientos gastroscópicos. Tratamiento de la aerofagia de la dispepsia funcional. |                                                                                                                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #23 | A | 03 | A |   |    |                           |              |                              |          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
| #24 | A | 03 | A | D | 01 | Papaverina                | 30-32.5mg/ml | Vial 10ml                    | IM IV    | Papaverina y derivados.                                                                                       | Tratamiento intravenoso antiespasmódico en el cólico uretral y en otros espasmos viscerales.                                                                                                         | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #25 | A | 03 | B | A | 01 | Atropina sulfato          | 1mg/ml       | Ampolla 1ml                  | IM IV SC | Anticolinérgico.                                                                                              | Indicado como preanestésico antiespasmódico. Tratamiento de la arritmia post infarto del miocardio. Junto a la neostigmina está indicada en la reversión del bloqueo neuromuscular no depolarizante. | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #26 | A | 03 | B | B |    |                           |              |                              |          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #27 | A | 03 | B | B | 01 | Escopolamina butilbromuro | 20mg/ml      | Ampolla 1ml                  | IM IV    | Alcaloides de la belladona                                                                                    | Tratamiento sintomático de trastornos caracterizados por espasmo de la musculatura lisa en el tracto gastrointestinal y genito urinario. Tratamiento sintomático de la dismenorrea.                  | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #28 |   |    |   |   |    |                           | 10mg         | Comprimido                   | Oral     | Antiespasmódico.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #29 | A | 03 | B | B | 02 | Homatropina metilbromuro  | 5mg/5ml      | Elor                         | Oral     | Alcaloides de la belladona                                                                                    | Tratamiento sintomático de trastornos caracterizados por espasmo de la musculatura lisa en el tracto gastrointestinal y genito urinario. Tratamiento sintomático de la dismenorrea.                  | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #30 | A | 03 | D |   |    |                           |              |                              |          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #31 | A | 03 | D |   |    |                           |              |                              |          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #32 | A | 03 | D | B | 04 | Butilscopolamina          | 20 mg        | Ampolla 2.5ml                | IM IV    | Alcaloides de la belladona                                                                                    | Tratamiento sintomático de trastornos caracterizados por espasmo de la musculatura lisa en el tracto gastrointestinal y genito urinario. Tratamiento sintomático de la dismenorrea.                  | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |

- 24/3 -

|     |   |    |   |   |    |  |                                             |               |                 |       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|----|---|---|----|--|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| #33 | A | 03 | D | A | 02 |  | Piloferona HCL con Fenpiverinio Bromuro     | 10mg / 0.1 mg | Ampolla 2.5ml   | IM IV | Agentes anticolinérgicos sintéticos en combinación con analgésicos | Tratamiento sintomático de espasmos musculares.                                                                                                                                                                                                                | n | s | n | s | n | n |
| #34 | A | 03 | D | C | 00 |  | Pramiverina                                 | 2.25mg        | Ampolla 2.5ml   | IM IV | Otros antiespasmódicos en combinación con analgésicos.             | Tratamiento sintomático de espasmos musculares.                                                                                                                                                                                                                | n | s | n | s | n | n |
| #35 | A | 03 | D | C | 00 |  | Analgésico: Dipirona (Metamizol sódico)     | 2.5g          | Ampolla 2.5ml   | IM IV |                                                                    | Tratamiento sintomático de espasmos musculares.                                                                                                                                                                                                                | n | s | n | s | n | n |
| #36 | A | 03 | D |   |    |  | Antiespasmódico con Analgésico:             |               |                 |       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |
| #37 | A | 03 | D |   |    |  | Antiespasmódico:                            |               |                 |       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |
| #38 | A | 03 | D | B | 04 |  | N-butilbromuro de escopolamina o            | 10mg          | Comprimido      | Oral  | Belladona y derivados en combinación con analgésicos               | Tratamiento sintomático de espasmos musculares.                                                                                                                                                                                                                | n | s | n | s | n | n |
| #39 | A | 03 | D | A | 02 |  | Piloferona HCL 5mg con Fenpiverinio Bromuro | 15mg / 0.1 mg | Comprimido      | Oral  | Agentes anticolinérgicos sintéticos en combinación con analgésicos | Tratamiento sintomático de espasmos musculares.                                                                                                                                                                                                                | n | s | n | s | n | n |
| #40 | A | 03 | D | C | 00 |  | Pramiverina o                               | 2mg           | Comprimido      | Oral  |                                                                    | Tratamiento sintomático de espasmos musculares.                                                                                                                                                                                                                | n | s | n | s | n | n |
| #41 | A | 03 | D | C | 00 |  | Analgésico: Dipirona (Metamizol sódico)     | 250-500mg     | Comprimido      | Oral  | Pirazolona                                                         | Tratamiento sintomático de espasmos musculares.                                                                                                                                                                                                                | n | s | n | s | n | n |
| #42 | A | 03 | F | A | 01 |  | Metoclopramida                              | 5mg/5ml       | Jarabe 90-125ml | Oral  | Propulsivos.                                                       | Tratamiento de los trastornos de la motilidad del tracto gastrointestinal alto, particularmente en el retardo del vaciamiento gástrico. Control del reflujo gastroesofágico. Tratamiento de las náuseas y vómitos de causas distintas al mareo por movimiento. | s | s | s | s | n | s |
| #43 | A | 03 | F | A | 01 |  | Metoclopramida                              | 5mg/ml        | Ampolla 2ml     | IM IV | Propulsivos.                                                       | Tratamiento de los trastornos de la motilidad del tracto gastrointestinal alto, particularmente en el retardo del vaciamiento gástrico. Control del reflujo gastroesofágico. Tratamiento de las náuseas y vómitos de causas distintas al mareo por movimiento. | s | s | s | s | s | s |

- 24/4 -

| Antieméticos y anti-nauseas |   |    |   |    |                                                                                      |                                 |                                                |        |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---|----|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #44                         | A | 04 | A | A  | Antagonistas de receptores 5-HT3:                                                    |                                 |                                                |        |                                                                                                                                                                                          |
| #45                         | A | 04 | A | 00 | Orondansetron clorhidrato o                                                          | 2mg/ml                          | Ampolla 4ml                                    | IV     | Antagonistas de la 5-HT3.                                                                                                                                                                |
| #46                         | A | 04 | A | 01 | Tropisetron o                                                                        | 1mg/ml                          | Ampolla 5ml                                    | IV     | Prevención y tratamiento de la náusea y del vómito inducidos por quimioterapia y radioterapia.                                                                                           |
| #47                         | A | 04 | A | 03 | Granisetron                                                                          | 1mg/ml                          | Ampolla 3ml                                    | IV     |                                                                                                                                                                                          |
| #48                         | A | 04 | A | 02 | Antagonistas de receptores 5-HT3:                                                    |                                 |                                                |        |                                                                                                                                                                                          |
| #49                         | A | 04 | A | 00 | Orondansetron clorhidrato o                                                          | 8mg                             | Comprimido                                     | Oral   | Prevención y tratamiento de la náusea y del vómito inducidos por quimioterapia y radioterapia.                                                                                           |
| #50                         | A | 04 | A | 01 | Tropisetron o                                                                        | 5mg                             | Comprimido                                     | Oral   |                                                                                                                                                                                          |
| #51                         | A | 04 | A | 03 | Granisetron                                                                          | 1mg                             | Comprimido                                     | Oral   |                                                                                                                                                                                          |
| #52                         | A | 04 | A | 02 | Laxantes.                                                                            |                                 |                                                |        |                                                                                                                                                                                          |
| #53                         | A | 06 | A |    | Bisacodil                                                                            | 5mg                             | Supositorio                                    | Rectal | Tratamiento evacuante del colon, previo a procedimientos de examen radiológico, estudios endoscópicos y de cirugía del colon.                                                            |
| #54                         | A | 06 | A | 02 | Acetate nicotínico                                                                   | 36.40%                          | Frasco 60ml                                    | Oral   |                                                                                                                                                                                          |
| #55                         | A | 06 | A | 05 | Castor Aceite (Ricino Aceite) USP                                                    |                                 |                                                |        |                                                                                                                                                                                          |
| #56                         | A | 06 | A | G  | Enemas:                                                                              |                                 |                                                |        |                                                                                                                                                                                          |
| #57                         | A | 06 | A | G  | Sodio bifosfato con Sodio fosfato o                                                  | 19g/7g                          | Tubo descartable con cánula rectal, 60-135ml   |        | Tratamiento evacuante del colon, previo a procedimientos de examen radiológico, estudios endoscópicos y de cirugía del colon.                                                            |
| #58                         | A | 06 | A | G  | Dioctil sulfosuccinato sódico con Sorbitol                                           | 0.01g /13.4g                    | Envase descartable con cánula rectal, 80-135ml | Enemas |                                                                                                                                                                                          |
| #59                         | A | 06 | A | D  | Lactulosa líquido                                                                    | 667mg/ml                        | Frasco 450-500ml                               | Oral   | Encefalopatía portal sistémica.                                                                                                                                                          |
| #60                         | A | 06 | A | C  | Psyllium Plantago                                                                    | 49% (Mínimo)                    | 200-250g (pote)                                | Oral   | Tratamiento del estreñimiento intestinal agudo o espasmo crónico. Tratamiento del estreñimiento secundario a patologías del recto o a cirugía anorectal y a déficit de ingesta de fibra. |
| #61                         | A | 06 | A | B  | Ruibarbo y Sodio                                                                     | 1.5% de rubarbo y 3.5% de sodio |                                                | Oral   | Estimulante del movimiento intestinal.                                                                                                                                                   |
| #62                         | A | 06 | C | D  | Magnesio citrato                                                                     | 88.16mg/ml                      | 10 onzas                                       | Oral   | Laxante oral.                                                                                                                                                                            |
| #63                         | A | 07 | A |    | Antidiarreicos, antiinflamatorios intestinales y agentes antinfeciosos intestinales. |                                 |                                                |        |                                                                                                                                                                                          |

24/5

|     |   |    |   |   |    |                                              |       |                    |                                                 |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |   |    |   |    |   |
|-----|---|----|---|---|----|----------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|
| #54 | A | 07 | A | A | 02 | Nistatina                                    |       | 100,000U/ml        | Suspension, gotas con gotero calibrado, 24-30ml | Oral  | Antibióticos                                       | Tratamiento de la candidiasis bucal y en otras partes del tracto gastrointestinal.                                                                                                                                                                                                                        | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #65 | A | 07 | B | A | 01 | Carbon activo                                |       | USP                | Pólv                                            | Oral  | Absorbentes intestinales. Preparaciones de carbón. | Prevenitivo y reductor de la absorción de las sustancias tóxicas en el tubo digestivo.                                                                                                                                                                                                                    | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #66 | A | 07 | C | A |    | Formulaciones de sales de rehidratación oral |       |                    |                                                 |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |   |    |   |    |   |
| #67 |   |    |   |   |    | Con un contenido mínimo de:                  |       |                    |                                                 |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #68 |   |    |   |   |    | Dextrosa anhidra                             | 20.0g | Sobre              |                                                 | Oral  | Electrolitos carbonohidratos.                      | Tratamiento de resitación de líquidos y electrolitos perdidos por diarrea.                                                                                                                                                                                                                                | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #69 |   |    |   |   |    | Sodio Cloruro                                | 3.5g  |                    |                                                 |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #70 |   |    |   |   |    | Sodio Citrato Dihidratado                    | 2.9g  |                    |                                                 |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #71 |   |    |   |   |    | Potasio cloruro                              | 1.5g  |                    |                                                 |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #72 | A | 07 | D | A | 03 | Loperamida clorhidrato                       | 2mg   | Cápsula comprimido |                                                 | Oral  | Antipropulsivos                                    | Diarrea aguda y crónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #73 | A | 07 | E | C | 01 | Sulfasalazina                                | 500mg | Comprimido         |                                                 | Oral  | Acido aminosalicilico y agentes similares.         | Tratamiento de ataque y de mantenimiento de la colitis ulcerosa leve a moderada. Tratamiento coadyuvante en regimenes intensivos de manejo de la colitis ulcerosa severa (Enfermedad de Crohn). Tratamiento alternativo en la artritis reumatoidea severa que no ha respondido a la terapia convencional. | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #74 | A | 10 |   |   |    | Fármacos utilizados en la diabetes.          |       |                    |                                                 |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |   |    |   |    |   |
| #75 | A | 10 | A | A |    | Insulinas                                    |       |                    |                                                 |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |   |    |   |    |   |
| #76 | A | 10 | A | A | 04 | Insulina Lenta (humana)                      |       | 100U/ml            | Vial 10ml                                       | SC    | De larga acción.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #77 | A | 10 | A | A | 02 | Insulina N.P.H.(humana)                      |       | 100U/ml            | Vial 10ml                                       | SC    | De larga acción.                                   | Tratamiento de la diabetes mellitus.                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #78 | A | 10 | A | A | 01 | Insulina Regular (humana)                    |       | 100U/ml            | Vial 10ml                                       | IV SC | De corta acción.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #79 | A | 10 | B | B |    | Hipoglucemiantes orales                      |       |                    |                                                 |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |    |   |    |   |    |   |
| #80 | A | 10 | B | B | 02 | Clorpropamida                                |       | 250mg              | Comprimido                                      | Oral  | Sulfonamidas y derivados de urea.                  | Tratamiento oral de la Diabetes mellitus no insulino dependiente.                                                                                                                                                                                                                                         | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #81 | A | 10 | B | B | 01 | Glibenclamida                                |       | 5mg                | Comprimido                                      | Oral  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #82 | A | 10 | B | B | 09 | Gliclazida                                   |       | 80mg               | Comprimido                                      | Oral  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |

- 24/6 -

| #   | A | 10 | B | 07 | Glipizida                                          | 5mg    | Capsula comprimido                       | Oral   | (tipo II)                                                                                                                                                                                          | n | s | n | n | n | n | n | n |
|-----|---|----|---|----|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #83 | A | 10 | B | 07 | Glipizida                                          | 5mg    | Capsula comprimido                       | Oral   |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #84 | A | 10 | B | 02 | Metformina clorhidrato                             | 850mg  | Tableta ranurada                         | Oral   | Tratamiento de la diabetes mellitus tipo II. Tratamiento asociado en la diabetes mellitus tipo I, particularmente en diabéticos obesos con resistencia a la insulina.                              | s | n | s |   |   |   |   |   |
| #85 | A | 11 | B |    | Vitaminas                                          |        |                                          |        |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #86 | A | 11 | B | 00 | Multivitaminas                                     |        | Gotas con gotero calibrado, 15-20ml      | Oral   | Tratamiento suplementario vitamínico cuando la ingesta es insuficiente o en condiciones moderadas de déficit.                                                                                      | s |   | s |   |   |   |   |   |
| #87 | A | 11 | B | 00 | Multivitaminas adultos                             |        | Ampolla, vial o bolsa IV plástica unidos | o Oral | Tratamiento suplementario vitamínico cuando la ingesta es insuficiente o en condiciones moderadas de déficit.                                                                                      | s | n | s |   |   |   |   |   |
| #88 | A | 11 | B | 00 | Multivitaminas con Minerales                       |        | Capsula comprimido                       | Oral   | Tratamiento suplementario vitamínico cuando la ingesta es insuficiente o en condiciones moderadas de déficit.                                                                                      | s | n | s |   |   |   |   |   |
| #89 | A | 11 | B | 00 | Multivitaminas pediátricas                         |        | Ampolla, vial o bolsa IV plástica unidos | IV     | Tratamiento suplementario vitamínico cuando la ingesta es insuficiente o en condiciones moderadas de déficit.                                                                                      | s | n |   |   |   |   |   |   |
| #90 | A | 11 | C | 03 | Alfacalcidol                                       | 0.25ug | Capsula                                  | Oral   | Tratamiento de la hipocalcemia crónica asociada a hipoparatiroidismo. Profilaxis y tratamiento del raquitismo nutricional. Tratamiento de la osteodistrofia renal. Tratamiento de la hipocalcemia. | n | s | n |   |   |   |   |   |
| #91 | A | 11 | C | 03 | Ergocalciferol (derivados hidroxiados). Alfalcidol | 1mcg   | Capsula                                  | Oral   | Tratamiento de la hipocalcemia crónica asociada a hipoparatiroidismo. Profilaxis y tratamiento del raquitismo nutricional. Tratamiento de la osteodistrofia renal. Tratamiento de la hipocalcemia. | n | n | s |   |   |   |   |   |
| #92 | A | 11 | C | 00 | Trivitaminas ADC                                   |        | Frasco con gotero calibrado, 15-20ml     | Oral   | Tratamiento profiláctico del déficit de vitaminas A, D y C en el lactante menor.                                                                                                                   | s | n | n |   |   |   |   |   |
| #93 | A | 11 | E | 00 | Complejo B                                         |        | Elbor o jarabe, Frasco 200ml             | Oral   | Tratamiento suplementario de vitaminas del grupo B cuando la ingesta es insuficiente o la absorción inadecuada.                                                                                    | s | s | s |   |   |   |   |   |

- 4/28 -

[illegible]

| #    | B | 01 | A | Agentes antitrombóticos: | 5mg                              | Comprimido                          | Oral                   | Antagonistas de la vitamina K | Profilaxis y tratamiento de las trombosis venosas profundas y del tromboembolismo pulmonar. Profilaxis del tromboembolismo sistémico asociado a fibrilación atrial. | S                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
|------|---|----|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| #110 | B | 01 | A |                          |                                  |                                     |                        |                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #111 | B | 01 | A | 03                       | Warfarina sódica                 |                                     |                        |                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #112 | B | 01 | A | B 00                     | Heparina de bajo peso molecular: | Actividad Anti-Xa de 2500 a 4000 UI | Solución inyectable    |                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #113 | B | 01 | A | B 00                     |                                  | 3000                                |                        | IM IV                         | Grupo de las heparinas                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #114 | B | 01 | A | B 06                     |                                  | 3075                                | 3.6                    | IM IV                         | Grupo de las heparinas                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #115 | B | 01 | A | B 05                     |                                  | 2,980-4,000                         | 2.6-3.8                | IM IV                         | Grupo de las heparinas                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #116 | B | 01 | A | B 04                     |                                  | 2500                                | 2.7                    | IM IV                         | Grupo de las heparinas                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #117 | B | 01 | A | B 01                     | Heparina sódica                  | 5,000 UI/ml                         | Ampolla o vial 5ml     | IV SC                         | Grupo de las heparinas                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #118 | B | 01 | A | B 10                     | Tinzaparina                      | 3,500UI                             | Jeringuilla prellenada | SC                            | Grupo de las heparinas                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #119 | B | 01 | A | C 17                     | Tirofiban clorhidrato            | 0.25mg/ml                           | Inyectable             | Parenteral                    | Inhibidores de agregación plaquetaria excluyendo la heparina                                                                                                        | Prevencción temprana del infarto del miocardio en pacientes con síndrome coronario inestable o infarto no Q que serán sometidos a angioplastia.                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #120 | B | 01 | A | C 06                     | Acetil Salicílico ácido          | 75-100mg                            | Comprimido             | Oral                          | Inhibidor de la agregación plaquetaria.                                                                                                                             | Prevencción de la trombosis arterial o venosa.                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |
| #121 | B | 01 | A | C 04                     | Clopidogrel disulfato            | 75mg                                | Comprimido             | Oral                          | Inhibidores de agregación plaquetaria excluyendo la heparina.                                                                                                       | Profilaxis de eventos isquémicos en pacientes sometidos a angioplastia con utilización de dispositivo STENT.                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |
| #122 | B | 01 | A | D 01                     | Estreptoquinasa                  | 1,500,000 UI                        | Ampolla o vial         | IV                            | Enzimas.                                                                                                                                                            | Tratamiento fibrinolítico en trombos de venas profundas, en síndrome coronario agudo, en embolismo pulmonar, en el tromboembolismo agudo arterial, en las derivaciones arteriovenosas trombosadas y en el infarto agudo del miocardio. |   |   |   |   |   |   |   |
| #123 | B | 02 | A |                          | Antihemorrágicos:                |                                     |                        |                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |
| #124 | B | 02 | A | 01                       | Aminocapróico ácido              | 250mg/ml                            | Ampolla 20ml           | IV                            | Antifibrinolíticos. Aminocácidos.                                                                                                                                   | Tratamiento específico de las alteraciones producidas por síndrome de fibrinólisis. Antihemorrágico.                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |

| #    | B | 02 | B | D | 04 | Complejo protrombínico            | Mínimo de 200 UI de Factor IX | Solución o polvo con diluyente | IM/IV | Factores coagulantes de la sangre          | Tratamiento primario para el control del sangrado en pacientes con déficit del factor IX (ejemplo: hemofilia B). Tratamiento para revertir los efectos anticoagulantes del coumadin.                                                                                                                    | n | n | n | n | n | n | n | n |
|------|---|----|---|---|----|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125 | B | 02 | B | X | 01 | Etamsilato                        | 125mg/ml                      | Ampolla 2ml                    | IM/IV | Agente hemostático.                        | Prevención y control de la hemorragia de vasos pequeños.                                                                                                                                                                                                                                                | n | n | s | s | n | n | n | n |
| #127 | B | 02 | B |   |    |                                   | 500mg                         | Comprimido                     | Oral  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n | n | s | s | n | n | n | n |
| #128 | B | 02 | B | D | 02 | Factor VIII                       | 200-350UI                     | Vial                           | IM/IV | Factores coagulantes de la sangre.         | Tratamiento primario para el control del sangrado en pacientes con déficit del factor IX (ejemplo: hemofilia B). Tratamiento para revertir los efectos anticoagulantes del coumadin.                                                                                                                    | s | n | n | n | n | n | n | s |
| #129 | B | 02 | B | A | 01 | Filomenadiona                     | 10mg/ml                       | Ampolla 1ml                    | IM/IV | Vitamina K y otros hemostáticos.           | Tratamiento de la hemorragia o de la amenaza de hemorragia causada por sobredosificación de un anticoagulante oral. Prevención y tratamiento de hemorragia en el neonato. Deficiencia de vitamina K con predisposición al sangrado (ejemplo: ictericia obstructiva, malabsorción, déficit nutricional). | s | s | s | n | n | n | n | s |
| #130 | B | 03 | A |   |    | Preparaciones antifibrinolíticas: |                               |                                |       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #131 | B | 03 | A |   |    | Preparaciones de hierro           |                               |                                |       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #132 | B | 03 | A | A | 02 | Ferroso fumarato                  | 140mg/5ml                     | Jarabe 150 - 200ml             | Oral  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s | s | n | s | s | s | s | s |
| #133 | B | 03 | A | A | 07 |                                   | 50-100mg elemental            | (Hierro Comprimido)            | Oral  | Preparaciones orales de hierro bivalentes. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s | s | s | s | s | s | s | s |
| #134 | B | 03 | A |   |    | Hierro (sal ferrosa)              | 125mg/ml Elemental            | (Hierro Solas, 15-20ml)        | Oral  |                                            | Profilaxis y tratamiento de la deficiencia de hierro.                                                                                                                                                                                                                                                   | s | s | n | n | s | n | n | n |
| #135 | B | 04 | A | C | 06 | Hierro Dextran                    | 50mg/ml                       |                                | IM    | Preparaciones parenterales de hierro       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n | n | s | s | s | s | n | n |
| #136 | B | 03 | A | C | 00 | Hierro no dextran                 | 10-20mg/ml                    | Vial                           | IV    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s | s | s | s | s | n | n | n |
| #137 | B | 03 | B | A |    | Vitamina B12                      |                               |                                |       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #138 | B | 03 | B | A | 01 | Cianocobalamina                   | 1000mcg/ml                    | Ampolla 1ml                    | IM    | (Cianocobalamina derivados).               | Tratamiento de la anemia perniciosa. Tratamiento suplementario de vitamina B12 cuando la ingesta es insuficiente o la absorción inadecuada. Profilaxis luego de gastrectomía total o resección total del íleo.                                                                                          | s | s | s | s | s | n | s | s |
| #139 | B | 03 | B | B |    | Ácido fólico                      |                               |                                |       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #140 | B | 03 | B | B | 01 | Fólico ácido                      | 5mg                           | Comprimido                     | Oral  | Ácido fólico y derivados.                  | Profilaxis y tratamiento de la deficiencia de ácido fólico. Tratamiento de la anemia megaloblástica.                                                                                                                                                                                                    | s | s | s | s | s | n | s | s |

- 24/10 -

|      |   |    |   |    |                                                   |  |                        |                                                                   |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|----|---------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #141 | B | 03 | X | A  | Otras preparaciones antiánémicas:                 |  | 2,000 UI               | Vial                                                              | IV SC | Otras preparaciones antiánémicas.     | Tratamiento de la anemia asociada a déficit de eritropoyetinas por insuficiencia renal.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S | S | n | n | n | S | n | n |
| #142 | B | 03 | X | A  | Eritropoyetina                                    |  |                        |                                                                   | IV SC |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n | n | n | S | n | n | n | n |
| #143 |   |    |   |    |                                                   |  | 50,000 UI              | Vial                                                              |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #144 | B | 04 |   |    | Agentes reductores de los lípidos séricos.        |  |                        |                                                                   |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #145 | B | 04 | D | 01 | Colestiramina resina                              |  | 4g de principio activo | Póvulo para ingestión oral sobre infusión intravenosa.            | Oral  | Secuestradores de ácidos biliares.    | Coadyuvante a la terapia dietética en el manejo de pacientes con hipercolesterolemia primaria. Tratamiento paliativo del prurito secundario a ictericia biliar parcial.                                                                                                                                                                                                            | n | n | n | n | n | n | n | S |
| #146 | B | 05 |   |    | Substitutos del plasma y soluciones de perfusión: |  |                        |                                                                   |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #147 | B | 05 | A |    | Sangre y productos relacionados:                  |  |                        |                                                                   |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #148 | B | 05 | A | 01 | Albúmina Humana pobre en sodio                    |  | 20 - 25%               | Frasco con equipo adaptable desechable para infusión intravenosa. | IV    | Substitutos de proteínas plasmáticas. | Tratamiento restaurador de las necesidades proteínicas en el paciente con déficit de las mismas. Tratamiento de la hipocalcemia severa asociada con bajo volumen plasmático y edema generalizado, donde la sal y el agua están restringidos para la expansión del volumen requerido. Coadyuvante en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia del neonato en exanguíneo transición. | S | S | n | n | n | n | S |   |
| #149 | B | 05 | A | 07 | Hetararch (coloide artificial)                    |  | 6%                     | Bolsa 500ml                                                       | IV    | Substitutos de plasma y proteínas.    | Tratamiento de la hipocalemia cuando se desea la expansión del plasma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n | S | n | n | n | n | n | n |
| #150 | B | 05 | B |    | Soluciones intravenosas:                          |  |                        |                                                                   |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #151 | B | 05 | B | 01 | Aminoácido/glicerol, con electrolito              |  | 3%                     | Frasco 1000ml                                                     | IV    | Soluciones para nutrición parenteral. | Manejo de la nutrición por vía parenteral cuando no pueda mantenerse la alimentación por vía oral o cuando la ingestión o infusión de nutrientes por la vía digestiva no es práctica, está contraindicada o no es tolerada por el paciente. Tratamiento nutricional en el neonato.                                                                                                 | n | n | n | n | n | n | n | n |
| #152 | B | 05 | B | 01 | Aminoácidos                                       |  | 5%                     | 250ml                                                             | IV    | Soluciones para nutrición parenteral. | Manejo de la nutrición en pacientes con insuficiencia renal aguda no dializados o con insuficiencia renal crónica.                                                                                                                                                                                                                                                                 | S | S | S | S | S | S | S | n |
| #153 |   |    |   |    |                                                   |  | 8%                     | 500ml                                                             | IV    | Soluciones para nutrición parenteral. | Manejo de pacientes con insuficiencia hepática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n | S | S | S | S | S | S | n |
| #154 | B | 05 | B | 01 | Aminoácidos cristalinos                           |  | 10%                    | Frasco 500ml                                                      | IV    | Soluciones para nutrición parenteral. | Manejo de pacientes con insuficiencia hepática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S | S | S | S | S | S | n | n |

| #    | B | A  | B | A | 01 | Aminoácidos cristalinos, con cisteína, histidina, leucina y tirosina |  | 10% | Frasco 500ml<br>250ml<br>IV                                                                  |  | \$ | n | n | n | n | \$ | Manejo de la nutrición por vía parenteral cuando no puede mantenerse la alimentación por vía oral o cuando la ingestión o infusión de nutrientes por la vía digestiva no es práctica, está contraindicada o no es tolerada por el paciente. Tratamiento nutricional en el neonato. |
|------|---|----|---|---|----|----------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #155 | B | 05 | B | A | 01 | Cistaina hidrocloreto                                                |  | 10% | Frasco 500ml<br>250ml<br>IV                                                                  |  | \$ | n | n | n | n | \$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| #156 | B | 05 | B | A | 01 | Cistaina hidrocloreto                                                |  | 10% | Ampolla o vial 100ml<br>250ml<br>IV                                                          |  | \$ | n | n | n | n | \$ | Tratamiento supletorio en déficit nutricional en prematuros.                                                                                                                                                                                                                       |
| #157 | B | 05 | B | A | 03 | Dextrosa                                                             |  | 50% | Ampolla o vial 50-100ml<br>250ml<br>IV                                                       |  | \$ | n | n | n | n | \$ | Solución hipertónica para preparaciones nutricionales intravenosas.                                                                                                                                                                                                                |
| #158 |   |    |   |   |    |                                                                      |  | 5%  | Envase plástico IV (bolsa o frasco), con equipo adaptable para infusión intravenosa, 500 ml  |  | \$ | n | n | n | n | \$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| #159 |   |    |   |   |    |                                                                      |  | 5%  | Envase plástico IV (bolsa o frasco), con equipo adaptable para infusión intravenosa, 500 ml  |  | \$ | n | n | n | n | \$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| #160 |   |    |   |   |    |                                                                      |  | 5%  | Envase plástico IV (bolsa o frasco), con equipo adaptable para infusión intravenosa, 1000 ml |  | \$ | n | n | n | n | \$ | Vehículo de fármacos intravenosos. Restaurador hídrico y energético.                                                                                                                                                                                                               |
| #161 |   |    |   |   |    |                                                                      |  | 10% | Envase plástico IV (bolsa o frasco), con equipo adaptable para infusión intravenosa, 500ml   |  | \$ | n | n | n | n | \$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| #162 | B | 05 | B | A | 03 | Dextrosa Hipertónica                                                 |  | 70% | 2,000 ml<br>IV                                                                               |  | \$ | n | n | n | n | \$ | Solución hipertónica para preparaciones nutricionales intravenosas.                                                                                                                                                                                                                |

- 24/12 -

[illegible]

-24/13-

|      |   |    |   |   |    |                                                                                              |  |         |  |                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| #169 | B | 05 | B | B | 00 | Ringer lactato                                                                               |  | X       |  | Envase plástico IV (bolsa o Frasco), con equipo adaptable desechable para infusión intravenosa, 500ml  | Soluciones que afectan el balance electrolítico. | Tratamiento preferencial en las pérdidas severas de volumen hídrico, cuando la rehidratación oral no es posible.                 | S | S | S | S | S | S | S |
| #170 | B | 05 | B | B | 00 | Ringer lactato                                                                               |  | X       |  | Envase plástico IV (bolsa o Frasco), con equipo adaptable desechable para infusión intravenosa, 1000ml | Soluciones que afectan el balance electrolítico. | Tratamiento preferencial en las pérdidas severas de volumen hídrico, cuando la rehidratación oral no es posible.                 | S | S | S | S | S | S | n |
| #171 | B | 05 | B | C | 01 | Manitol                                                                                      |  | 20%     |  | Frasco con equipo IV adaptable desechable para infusión intravenosa, 250ml                             | Soluciones productoras de diuresis osmótica.     | Reducción de la hipertensión intracraneana y de la hipertensión intraocular. Coadyuvante en el manejo de la insuficiencia renal. | S | S | S | S | S | n | S |
| #172 | B | 05 | X | A |    | Soluciones aditivas intravenosas.                                                            |  |         |  |                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |
| #173 | B | 05 | X | A | 05 | Magnesio sulfato                                                                             |  | 10%     |  | Ampolla 10ml                                                                                           | Soluciones aditivas.                             | Edematoso. Corrección de la hipomagnesemia.                                                                                      | S | S | S | S | S | n | S |
| #174 | B | 05 | X | A | 30 | Oligoelementos o elementos trazas para adultos con zinc, cobre, manganeso, cromo y molibdeno |  |         |  | Vial                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                  | S | S | S | S | S | n | n |
| #175 | B | 05 | X | A | 30 | Oligoelementos o elementos trazas para pediatría con zinc, cobre, manganeso                  |  |         |  | Vial                                                                                                   | Electrolitos en combinación con otros fármacos.  | Complemento nutricional en paciente adulto sometido a nutrición parenteral total.                                                | S | S | n | n | n | n | S |
| #176 | B | 05 | X | A | 01 | Potasio cloruro                                                                              |  | 2mEq/ml |  | Ampolla 10-20ml                                                                                        |                                                  | Tratamiento de la depleción de potasio.                                                                                          | S | S | S | S | S | n | S |
| #177 | B | 05 | X | A | 09 | Potasio fosfato                                                                              |  | 3Mm/ml  |  | Vial                                                                                                   | Soluciones electrolíticas.                       | Tratamiento en nutrición parenteral total.                                                                                       | S | n | S | S | n | n | n |

-24114-

| #    | B | 05 | X A | 02 | Sodio bicarbonato: solución hipertónica |  | 7.5%   | Vial 50ml                                                                                        | IV | Soluciones electrolíticas. | Soluciones activas i.v. Soluciones electrolíticas. Alcalinizador sistémico para corregir la acidosis metabólica; minimizar la cristalización del ácido úrico asociada a agentes uricosúricos; incrementar la solubilidad de las sulfonamidas y la excreción renal en sobredosis de barbitúricos y salicilatos. | S | S | S | S | n | n | S |
|------|---|----|-----|----|-----------------------------------------|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| #178 |   |    |     |    |                                         |  |        |                                                                                                  |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |
| #179 | B | 05 | X A | 03 | Sodio cloruro                           |  | 0.9%   | Envase plástico IV (bolsa o frasco), con equipo adaptable para infusión intravenosa, 500ml       |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S | S | S | n | S | S | S |
| #180 |   |    |     |    |                                         |  | 0.9%   | Envase plástico IV (bolsa o frasco), con equipo adaptable para infusión intravenosa, 1000ml      |    |                            | Tratamiento del desbalance hidroelectrolítico con depleción de sodio como ocurre en cetoacidosis diabética y en las pérdidas por gastroenteritis.                                                                                                                                                              | S | S | S | S | n | n | n |
| #181 |   |    |     |    |                                         |  | 0.9%   | Envase plástico, Intraarticular bolsa o frasco plástico 3000ml                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   | n | n | n | n | n |
| #182 |   |    |     |    |                                         |  | 0.9%   | Envase plástico, IV bolsa o frasco plástico libre de PVC, con equipo adaptable desechable, 250ml |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   | n | n | n | n | n |
| #183 | B | 05 | X A | 03 | Sodio cloruro: solución hipertónica     |  | 20-25% | Vial 30-50ml                                                                                     | IV | Soluciones electrolíticas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |
| #184 | B | 06 | A   |    | Otros agentes hematológicos.            |  |        |                                                                                                  |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S | S | S | S | n | n | S |

- 24/15 -

|      |   |    |   |   |    |                            |  |  |           |                                                                  |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
|------|---|----|---|---|----|----------------------------|--|--|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| #185 | B | 06 | A | A | 03 | Hialuronidasa liofilizada  |  |  | 1500UI    | 1-10 ml                                                          | IM SC Pericardial | Enzimas. | Agente coadyuvante en la implantación de lentes intraculares, en el aumento de la permeabilidad de infusiones o inyecciones subcutáneas e intramusculares (ejemplo: anestésicos). Agente facilitador de la reabsorción del exceso de líquidos y sangre tisular.                                      | \$ | n  | n  | n  | n  | n  |
| #186 |   |    |   |   |    |                            |  |  |           |                                                                  |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
| #187 | C |    |   |   |    |                            |  |  |           |                                                                  |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
| #188 | C | 01 | A |   |    | Terapia cardíaca:          |  |  |           |                                                                  |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
| #189 | C | 01 | A | A | 05 | Digoxina                   |  |  | 0.25mg/ml | Ampolla 1-2ml<br>Comprimido                                      | IM IV             |          | Tratamiento para la digitalización rápida y para mantenimiento de la terapia en la insuficiencia cardíaca, en la fibrilación atrial, en el flutter atrial y en la taquicardia atrial paroxística.                                                                                                    | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #190 |   |    |   |   |    |                            |  |  | 0.25mg    |                                                                  |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |
| #191 |   |    |   |   |    |                            |  |  | 0.05mg/ml | Elisir pediatrico, Oral<br>frasco con gotero<br>calibrado, 60 ml | Oral              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ | n  | n  | n  | n  | \$ |
| #192 | C | 01 | A | C | 06 | Fenilefrina                |  |  | 1%        | Ampolla 1ml                                                      | IV                |          | Mantenimiento de la presión arterial durante anestesia general o por intubación. Tratamiento de la falla vascular durante el choque de hipotensión inducido por drogas.                                                                                                                              | n  | \$ | n  | \$ | \$ | \$ |
| #193 | C | 01 | B | A | 02 | Procainamida clorhidrato   |  |  | 100mg/ml  | Ampolla 10ml                                                     | IM IV             |          | Tratamiento y prevención de las arritmias ventriculares.                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | n  | n  | n  | n  | n  |
| #194 | C | 01 |   |   |    |                            |  |  | 250mg     | Capsula comprimido                                               | Oral              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ | n  | n  | n  | n  | n  |
| #195 | C | 01 | B | A | 01 | Quindina sulfato           |  |  | 300mg     | Capsula comprimido L.A.                                          | Oral              |          | Tratamiento o profilaxis de la fibrilación atrial, del flutter atrial, de la taquicardia extrasistólica atrial, de la taquicardia extrasistólica nodal y de la taquicardia ventricular. Tratamiento facilitador de la cardioversión (eléctrica) y del mantenimiento del ritmo sinusal luego de ésta. | \$ | \$ | n  | n  | n  | n  |
| #196 | C | 01 | B | B | 01 | Lidocaína sin preservativo |  |  | 2%        | Vial 20-50ml                                                     | IM IV             |          | Anestésico en infiltración local y bloqueo regional. Analgésico regional intravenoso. Tratamiento profiláctico de la arritmia ventricular, particularmente después de infarto de miocardio.                                                                                                          | \$ | \$ | n  | \$ | n  | \$ |
| #197 | C | 01 | B | D | 01 | Amiodarona                 |  |  | 50mg/ml   | Ampolla 3ml                                                      | Parenteral        |          | Tratamiento de la taquicardia ventricular (recurrente), sinfónica, en pacientes que no toleran o que no han respondido a otros antiarrítmicos) y de la arritmia supraventricular.                                                                                                                    | n  | \$ | \$ | n  | \$ | \$ |
| #198 |   |    |   |   |    | Amiodarona clorhidrato     |  |  | 200mg     | Comprimido                                                       | Oral              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | n  | \$ |

|      |   |    |   |    |   |   |    |                                      |               |  |                     |          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---|----|---|----|---|---|----|--------------------------------------|---------------|--|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| #199 | C | 01 | C | 01 | C | E | 01 | Aminona lactato                      | 5mg/ml        |  | Vial 20ml           | IV       | Inhibidor fosfodiesterase y Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos. | Manejo de la falla congestiva. Coadyuvante en el tratamiento de la descompensación cardíaca congestiva o en la depresión de la energía de contracción del corazón debida a una falla intrínseca o vascular severa (soporte inotrópico). Soporte inotrópico en el infarto del miocardio, en cirugía cardíaca, en cardiopatías, choque séptico y choque cardiogénico. Como prueba de esfuerzo cardiovascular durante estudio electrocardiográfico. | n  | \$ | n  | \$ | n  | \$ | n  | \$ |
| #200 | C | 01 | C | 01 | C | A | 07 | Dobutamina                           | 12.5mg/ml     |  | Vial 20ml           | IV       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | \$ | \$ | n  | \$ | n  | \$ |    |
| #201 | C | 01 | C | 01 | C | A | 04 | Dopamina clorhidrato                 | 40-50mg/ml    |  | Ampolla o vial, 5ml | IV       | Estimulantes cardíacos, excluyendo los glicosídeos cardíacos.      | Tratamiento corrector del desbalance hemodinámico en el síndrome de choque por infarto del miocardio, trauma, septicemia embolizante, cirugía de corazón abierto e insuficiencia cardíaca.                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ | \$ | \$ | \$ | n  | \$ | n  | \$ |
| #202 | C | 01 | C | 01 | C | A | 02 | Isoproterenol                        | 0.2mg/ml      |  | Ampolla 5ml         | IM/IV SC | Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos.                             | Tratamiento de las crisis reversibles de obstrucción de las vías aéreas (Ej. Asma y bronquitis). Tratamiento de urgencia de la bradicardia sinusal y del bloqueo cardíaco.                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ | \$ | n  | \$ | n  | \$ | n  | \$ |
| #203 | C | 01 | C | 01 | C | A | 03 | Norepinefrina bitartrato             | 1mg/ml        |  | Ampolla 4ml         | IV       | Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos.                             | Tratamiento de la hipotensión aguda en ciertas condiciones tales como el estado de choque, hipotensión, anestesia espinal, infarto del miocardio, etc. Tratamiento coadyuvante del paro cardíaco.                                                                                                                                                                                                                                                | \$ | \$ | \$ | \$ | n  | \$ | n  | \$ |
| #204 | C | 01 | C | 01 | C | D | 02 | Gliceril trinitrato (nitroglicerina) | 5 mg/24 horas |  | Parches             | Tópico   |                                                                    | Profilaxis de la crisis de angina de pecho en el transoperatorio en pacientes con coronariopatía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ | \$ | \$ | \$ | n  | \$ | n  | \$ |
| #205 |   |    |   |    |   |   |    |                                      | 0.4mg         |  | Tableta sublingual  | Subl.    | Vasodilatadores utilizados en enfermedades cardíacas, orgánicas.   | Profilaxis y mejoría de las crisis dolorosas de la angina de pecho. Manejo de la angina de pecho inestable y de espasmos de la arteria coronaria (angina de Prinzmetal). Coadyuvante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica.                                                                                                                                                                                                     | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n  | \$ |
| #206 |   |    |   |    |   |   |    |                                      | 5mg/ml        |  | Vial 10ml           | IV       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ | \$ | \$ | \$ | n  | \$ | n  | \$ |
| #207 | C | 01 | C | 01 | C | D | 08 | Isosorbida dinitrato                 | 5mg           |  | Comprimido          | Subl.    |                                                                    | Tratamiento de la crisis de angina de pecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ | \$ | n  | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |



- 24/9 -

|      |   |    |   |   |    |                        |              |          |  |                              |        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|---|----|------------------------|--------------|----------|--|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| #223 | C | 02 | D | D | 01 | Nitroprusiato sódico   |              | 50mg     |  | Ampolla o vial               | IV     | Derivados nitrofuránicos.                                             | Tratamiento rápido reductor de la presión arterial en crisis hipertensivas. Mantenimiento de la presión arterial en valores bajos, para evitar el sangrado, durante procedimientos bajo anestesia. | S | n | n | n | S |
| #224 | C | 02 | D | E | 01 | Verapamilo clorhidrato |              | 40mg     |  | Comprimido                   | Oral   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | n | S | n | S | n |
| #225 |   |    |   |   |    |                        |              | 80mg     |  | Comprimido                   | Oral   | Selectivos con efecto cardíaco directo. Derivados de la fenilalanina. |                                                                                                                                                                                                    | S | n | S | S | n |
| #226 |   |    |   |   |    |                        |              | 120mg    |  | Capsula comprimido AP        | Oral   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | n | S | S | S | n |
| #227 |   |    |   |   |    |                        |              | 2.5mg/ml |  | Ampolla 2ml                  | IV     |                                                                       | Tratamiento de las taquiarritmias supraventriculares, de la angina tipo variante Prinzmetal, de la angina crónica estable, de la angina in crescendo o angina preinfarto.                          | S | S | S | S | n |
| #228 | C | 02 | K | D | 01 | Ketanserina            |              | 2%       |  | Tubo, 78g                    | Tópico | Otros antihipertensivos. Antagonistas de serotonina                   | Tratamiento coadyuvante en el manejo de la úlcera de la piel.                                                                                                                                      | n | n | S | n | S |
| #229 | C | 03 |   |   |    | Diuréticos             |              |          |  |                              | Oral   | De lecho bajo.                                                        | Tratamiento, solo o combinado con otros agentes antihipertensivos, de la Hipertensión Arterial y edema asociado a Insuficiencia Cardíaca Congestiva.                                               | S | n | n | S | n |
| #230 | C | 03 | B | A | 11 | Indapamida             |              | 2.5mg    |  | Comprimido                   | Oral   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |
| #231 | C | 03 | B | A | 11 | Indapamida             |              | 1.5mg    |  | Comprimido acción prolongada | Oral   | De lecho bajo.                                                        | Tratamiento, solo o combinado con otros agentes antihipertensivos, de la Hipertensión Arterial y edema asociado a Insuficiencia Cardíaca Congestiva.                                               | S | n | S | S | n |
| #232 | C | 03 | C | A | 02 | Bumetanida             |              | 0.5mg/ml |  | Ampolla 4ml                  | IM IV  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | n | S | S | n | n |
| #233 | C | 03 | C | A | 01 |                        | Furosemida o | 40mg     |  | Comprimido                   | Oral   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | S | S | S | S | S |



24/20

[illegible]

- 24/21 -

|      |   |    |   |   |    |                                                                            |                |           |                    |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|
| #265 | C | 09 | A | A | 04 |                                                                            | Perindopril    | 4mg       | Comprimido         | Oral    | Inhibidores de la enzima convertidora angiotensina (ECA), solos. | Tratamiento de la Hipertensión Arterial esencial y de la Renovascular. Tratamiento coadyuvante de la insuficiencia Cardíaca Congestiva. Tratamiento sintomático de la distrofia ventricular secundaria a infarto del miocardio.   | \$ | n | n | n | n | n | n | n |
| #266 | C | 09 | A | A | 05 |                                                                            | Ramipril       | 2.5mg     | Comprimido         | Oral    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | \$ | n | n | n | n | n | n | n |
| #267 | C | 10 | A | A | 00 | Inhibidores de la 3 Hidroxi-3 metilglutaril Coenzima A reductasa(HMG-CoA): |                |           |                    |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| #268 |   |    |   |   |    |                                                                            | Fluvastatina o | 40mg      | Capsula comprimido | o Oral  | Inhibidores de la HMG CoA reductasa.                             | Tratamiento reductor de los niveles sanguíneos de colesterol total y de LDL-colesterol, en pacientes con Hipercolesterolemia primaria, cuando la respuesta a la dieta y a otras medidas no farmacológicas hayan sido inadecuadas. | \$ | n | n | n | n | n | n |   |
| #269 |   |    |   |   |    |                                                                            | Lovastalina o  | 20mg      | Capsula comprimido | o Oral  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | \$ | n | n | n | n | n | n | n |
| #270 |   |    |   |   |    |                                                                            | Pravastatina o | 10mg      | Capsula comprimido | o Oral  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | \$ | n | n | n | n | n | n | n |
| #271 |   |    |   |   |    |                                                                            | Atorvastalina  | 10mg      | Capsula comprimido | o Oral  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | \$ | n | n | n | n | n | n | n |
| #272 |   |    |   |   |    |                                                                            | Simvastatina   | 10mg      | Capsula comprimido | o Oral  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | \$ | n | n | n | n | n | n | n |
| #273 | C | 10 | A | B | 05 |                                                                            | Fenofibrato    | 200-250mg | Capsula comprimido | o Oral  | Fibratos.                                                        | Tratamiento de las hiperlipidemias tipos IIa, IIb, III, IV y V en pacientes que no responden adecuadamente a la dieta y a otras medidas apropiadas.                                                                               | \$ | n | n | n | n | n | n |   |
| #274 | C | 10 | A | B | 00 |                                                                            | Bezafibrato o  | 200mg     | Capsula comprimido | o Oral  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | \$ | n | n | n | n | n | n | n |
| #275 |   |    |   |   |    |                                                                            | Gemfibrozilo   | 600mg     | Capsula comprimido | o Oral  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | \$ | n | n | n | n | n | n | n |
| #276 | D |    |   |   |    | DERMATOLÓGICOS                                                             |                |           |                    |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| #277 | D | 01 |   |   |    | Antifúngicos para uso dermatológico.                                       |                |           |                    |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| #278 | D | 01 | A |   |    | Antimicóticos tópicos.                                                     |                |           |                    |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |   |
| #279 | D | 01 | A | A | 08 |                                                                            | Griseofulvina  | 125mg/5ml | Suspension 120ml   | 90-Oral | Antifúngicos para uso sistémico.                                 | Tratamiento de las infecciones de la piel, uñas, piel cabellos causada por especies de Microsporum, Trichophyton y Epithymophyton.                                                                                                | \$ | n | n | n | n | n | n | n |
| #280 | D | 01 | A | C | 00 | Imidazoles:                                                                |                |           |                    |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |   |



- 24/25-23

|                                    |   |    |   |   |    |  |  |                                           |            |  |                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|----|---|---|----|--|--|-------------------------------------------|------------|--|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Otros Antibióticos de uso tópicos: |   |    |   |   |    |  |  |                                           |            |  |                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #304                               | D | 06 | A | X | 00 |  |  | Fusidato sódico o:                        | 2%         |  | Unguento, tubo 15-20g      |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #305                               | D | 06 | A | X | 01 |  |  |                                           |            |  |                            | Otros antibióticos para uso tópico.                                                                                                                            |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |   |    |   |   |    |  |  |                                           |            |  |                            | Tratamiento tópico de infecciones de la piel causadas por <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> y <i>Corynebacterium minutissimum</i> . |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #306                               | D | 06 | A | X | 09 |  |  | Mupirocin                                 | 2%         |  | Tubo                       | Tópico                                                                                                                                                         |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #307                               | D | 06 | B | A | 01 |  |  | Sulfadiazina de Plata                     | 1%         |  | Crema, pote 200-400g       | Tópico                                                                                                                                                         | Quimioterápicos para uso tópico.                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #308                               | D | 07 | A |   |    |  |  | Corticoides tópicos:                      |            |  |                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #309                               | D | 07 | A | C | 01 |  |  | Belametasona valerato                     | 0.1%       |  | Loción capilar Frasco 20ml | Tópico                                                                                                                                                         | Antiinflamatorio tópico.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |   |    |   |   |    |  |  |                                           |            |  |                            |                                                                                                                                                                | Tratamiento supresor tópico, de procesos inflamatorios no bacterianos de la piel (eczemas y dermatitis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #310                               | D | 07 | A | 0 | 00 |  |  | Corticoides de baja potencia:             |            |  |                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #311                               | D | 07 | A | A | 02 |  |  | Hidrocortisona                            | 0.25%-2.5% |  | Loción, 15-30ml            | Tópico                                                                                                                                                         | Antiinflamatorio tópico.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |   |    |   |   |    |  |  |                                           |            |  |                            |                                                                                                                                                                | Tratamiento supresor tópico, de procesos inflamatorios no bacterianos de la piel (eczemas y dermatitis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #312                               | D | 07 | A | 0 | 00 |  |  | Corticoides Fluorinado potencia media:    |            |  |                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #313                               | D | 07 | A | D | 01 |  |  | Belametasona valerato o                   | 0.1%       |  | Crema, tubo 15g            | Tópico                                                                                                                                                         | Antiinflamatorio tópico.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #314                               | D | 07 | A | C | 04 |  |  | Fluocinolona acetónida o                  | 0.025%     |  | Crema, tubo 15g            | Tópico                                                                                                                                                         |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #315                               | D | 07 | A | B | 09 |  |  | Triamcinolona acetónida                   | 0.1%       |  | Crema, tubo 15g            | Tópico                                                                                                                                                         | Antiinflamatorio tópico.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |   |    |   |   |    |  |  |                                           |            |  |                            |                                                                                                                                                                | Tratamiento supresor tópico, de procesos inflamatorios no bacterianos de la piel (eczemas y dermatitis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #316                               | D | 07 | A | 0 | 00 |  |  | Corticoides no Fluorinado, potencia baja: |            |  |                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #317                               | D | 07 | A | B | 08 |  |  | Desonide o                                | 0.05%      |  | Crema, tubo 15-30g         | Tópico                                                                                                                                                         |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #318                               | D | 07 | A | A | 02 |  |  | Hidrocortisona                            | 0.25-2.5%  |  | Crema, tubo 15-30g         | Tópico                                                                                                                                                         | Antiinflamatorio tópico.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |   |    |   |   |    |  |  |                                           |            |  |                            |                                                                                                                                                                | Tratamiento supresor tópico, de procesos inflamatorios no bacterianos de la piel (eczemas y dermatitis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #319                               | D | 07 | A | 0 | 00 |  |  | Corticoides potencia alta:                |            |  |                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #320                               | D | 07 | A | C | 11 |  |  | Amcinonide o                              | 0.1%       |  | Crema, tubo 15g            | Tópico                                                                                                                                                         |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #321                               | D | 07 | A | C | 01 |  |  | Belametasona dipropionato o               | 0.05%      |  | Crema, tubo 15g            | Tópico                                                                                                                                                         |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #322                               | D | 07 | A | C | 04 |  |  | Fluocinolona acetónida o                  | 0.2%       |  | Crema, tubo 15g            | Tópico                                                                                                                                                         | Antiinflamatorio tópico.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |   |    |   |   |    |  |  |                                           |            |  |                            |                                                                                                                                                                | Tratamiento supresor tópico, de procesos inflamatorios no bacterianos de la piel (eczemas y dermatitis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

-24/25-

| Antinfeciosos y antisépticos ginecológicos. |        |      |                                                           |          |                                           |        |                        |   |   |
|---------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|------------------------|---|---|
| #344                                        | G 01 1 |      |                                                           | 100000U  | Tableta vaginal                           |        |                        | n | s |
| #345                                        | G 01 A | A 01 | Nistatina                                                 |          |                                           |        |                        | n | s |
| #346                                        | G 01 A | F 20 | Combinación de derivados imidazólicos.                    |          |                                           |        |                        | n | s |
| #347                                        |        |      | Clotrimazol                                               | 0.01g    | Crema, tubo                               | Tópico |                        | n | s |
| #348                                        |        |      | Sulfisoxazole                                             | 0.10g    | Crema, tubo                               | Tópico |                        | n | s |
| #349                                        |        |      | Alantoina                                                 | 0.02g    | Crema, tubo                               | Tópico |                        | n | s |
| #350                                        | G 01 A | F 20 | Combinación de derivados imidazólicos.                    |          |                                           |        |                        | n | s |
| #351                                        |        |      | Clotrimazol                                               | 0.20g    | Ovulos                                    | Tópico |                        | n | s |
| #352                                        |        |      | Sulfisoxazole                                             | 0.30g    | Ovulos                                    | Tópico |                        | n | s |
| #353                                        |        |      | Alantoina                                                 | 0.06g    | Ovulos                                    | Tópico |                        | n | s |
| #354                                        | G 01 A | F 01 | Derivados imidazólicos.                                   |          |                                           |        |                        | n | s |
| #355                                        | G 01 A | F 02 | Clotrimazol o,                                            | 1-2%     | Crema vaginal, tubo con aplicador, 35-40g |        |                        | n | s |
| #356                                        | G 01 A | F 07 | Isconazol o,                                              | 1-2%     | Ovulo o Tableta vaginal                   |        |                        | n | s |
| #357                                        | G 01 A | F 04 | Miconazol                                                 | 1-2%     | Ovulo o Tableta vaginal                   |        |                        | n | s |
| #358                                        | G 01 A | F 01 | Metronidazol                                              | 500mg    | Ovulo o Tableta vaginal                   |        |                        | n | s |
| #359                                        | G 01 A | X 03 | Poliresuleno (Metacresolsulfónico ácido con formaldehído) | 36-41%   | Líquido, 10-25ml                          | Tópico |                        | n | s |
| #360                                        | G 01 A | X 03 | Poliresuleno (Metacresolsulfónico ácido con formaldehído) | 18mg/g   | Jalisco, tubo con aplicador, 50g          |        |                        | n | s |
| #361                                        | G 02   |      | Otros ginecológicos.                                      |          |                                           |        |                        | n | s |
| #362                                        | G 02   |      | Oxitócicos.                                               |          |                                           |        |                        | n | s |
| #363                                        | G 02 A | B 01 | Metilergonovina                                           | 0.2mg/ml | Ampolla 1ml                               | IM IV  | Alcoholes de argemina. | n | s |

- 24/26 -

|      |   |    |   |   |    |                                                      |                                             |                |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|---|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #364 | G | 02 | A | D | 02 | Dioprostone                                          |                                             | 0.5mg/3g       | Gel con aplicador pre vaginal cargado    | Prostaglandinas | Manejo del aborto fallido con muerte fetal intrauterina. Inducción de la expulsión de la Mola Hydatidiforme Intrauterina... Inducción del aborto terapéutico. Inducción de la maduración del cuello uterino previo al parto.                                                       | n | n | n | n | n | n | n | n |
| #365 | G | 03 | A |   |    | Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital. |                                             |                |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #366 | G | 03 | A |   |    | Anticonceptivos hormonales para uso sistémico.       |                                             |                |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #367 | G | 03 | A | A | 06 | Anovulatorio inyectable                              |                                             |                |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #368 |   |    |   |   |    |                                                      | Norelisterona enantato y Estradiol valerato | 50mg/ml        | Ampollas                                 | IM              | Progestágenos y Planificación familiar. Tratamiento de la disfunción hormonal en la mujer.                                                                                                                                                                                         | n | s | n | n | n | n | n | n |
| #369 |   |    |   |   |    |                                                      | Estradiol valerato                          | 5mg/ml         | Ampollas                                 | IM              | Progestágenos y Planificación familiar. Tratamiento de la disfunción hormonal en la mujer.                                                                                                                                                                                         | n | s | n | n | n | n | n | n |
| #370 | G | 03 | A | A | 00 | Anovulatorio oral comprimido.                        |                                             |                |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #371 |   |    |   |   |    |                                                      | Estrógeno:                                  |                |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #372 |   |    |   |   |    |                                                      | Ethinilestradiol                            | 0.020-0.030mg  | Comprimido                               | Oral            | Progestágenos y Planificación familiar. Tratamiento de la disfunción hormonal en la mujer.                                                                                                                                                                                         | s | s | n | n | n | n | n | n |
| #373 |   |    |   |   |    |                                                      | Progestágenos:                              |                |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #374 |   |    |   |   |    |                                                      | Levonorgestrel o                            | 0.15mg         | Comprimido                               | Oral            | Progestágenos y Planificación familiar. Tratamiento de la disfunción hormonal en la mujer.                                                                                                                                                                                         | s | s | n | n | n | n | n | n |
| #375 |   |    |   |   |    |                                                      | Gestodeno                                   | 0.075mg        | Comprimido                               | Oral            | Progestágenos y Planificación familiar. Tratamiento de la disfunción hormonal en la mujer.                                                                                                                                                                                         | s | s | n | n | n | n | n | n |
| #376 | G | 03 | B |   |    | Andrógenos.                                          |                                             |                |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #377 | G | 03 | B | B | 01 | Mesterolona                                          |                                             | 25mg           | Comprimido                               | Oral            | Derivados de androstano (3). Andrógenos.                                                                                                                                                                                                                                           | s | s | n | n | n | n | n | n |
| #378 | G | 03 | B | A | 03 | Testosterona cipionato o propionato                  |                                             | 100 - 250mg/ml | Ampolla 1ml                              | IM              | Tratamiento de la deficiencia androgénica masculina. Tratamiento del cáncer de mama en la mujer.                                                                                                                                                                                   | s | s | n | n | n | n | n | n |
| #379 | G | 03 | C |   |    | Estrógenos.                                          |                                             |                |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #380 | G | 03 | C | A | 57 | Estrógenos conjugados                                |                                             | 0.625mg/g      | Crema vaginal, tubo con aplicador 40-45g | Vaginal         | Tratamiento de la vaginitis atáfrica, de la caurosis y del sangrado de la mucosa vaginal por hipostrogénismo.                                                                                                                                                                      | s | s | n | s | n | s | n | n |
| #381 |   |    |   |   |    |                                                      |                                             | 0.625mg        | Comprimido                               | Oral            | Estrógenos. Tratamiento de los síntomas vasculares asociados a la menopausia. Tratamiento del sangrado uterino debido a desbalance hormonal. Tratamiento del hipogonadismo femenino, de la insuficiencia ovárica primaria. Tratamiento paliativo del cáncer de mama y de próstata. | s | s | n | s | n | s | n | n |



- 24/28 -

| Hormonas y análogos del lóbulo anterior de la pituitaria |   |    |   |  |  |  |  |  |  | Hormonas y análogos del lóbulo posterior de la pituitaria |  |       |  |                        |                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|----|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|-------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #401                                                     | H | 01 | A |  |  |  |  |  |  | Vial                                                      |  | IM SC |  | Somatropina y análogos | Tratamiento suplenatorio de la deficiencia de hormona del crecimiento hipofisiaria, o secundaria a insuficiencia renal y de la diabetes gonadal (Síndrome de Turner). | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |

- 24/29.

[illegible]

| H    | 02 | A  | B | 04 | Melliprednisolona succinato sódico | 500mg                       | Ampolla o vial, 5-1V<br>10ml | Glucocorticoides. | Tratamiento de urgencia en reacciones anafilácticas y alergias del sistema respiratorio y de la piel. Tratamiento de control de las agudizaciones de la colitis ulcerativa y de la enfermedad de Crohn. Tratamiento del edema cerebral secundario a tumor cerebral. Prevención y tratamiento del rechazo de órganos transplantados. | \$                                                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
|------|----|----|---|----|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| #429 |    |    |   |    |                                    |                             |                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #430 | H  | 02 | A | B  | 06                                 | Prednisona                  | 50mg                         | Comprimido        | Oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glucocorticoides.                                                                                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #431 | H  | 02 | A | B  | 08                                 | Triamcinolona Acetonida     | 10mg/ml                      | Ampolla o vial    | Intralesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #432 | H  | 03 | A |    |                                    | Terapia tiroidea:           |                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #433 | H  | 03 | A | A  |                                    | Preparaciones tiroideas.    |                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #434 | H  | 03 | A | A  | 01                                 | Levo tiroxina sal sódica    | 0.1mg                        | Comprimido        | Oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #435 | H  | 03 | A | A  | 02                                 | Liotironina                 | 25mcg                        | Comprimido        | Oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hormonas tiroideas.                                                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #436 | H  | 03 | B |    |                                    | Preparaciones antitiroideas |                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #437 | H  | 03 | B | 02 | Tiamazol (Metimazol)               | 5mg                         | Comprimido                   | Oral              | Derivados imidazoles que contienen azufre                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tratamiento del hipertiroidismo. Tratamiento preventivo de crisis de tiroides; preoperatorio en cirugía o en radioterapia del tiroides. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #438 | H  | 05 | B |    |                                    | Hormonas antiparatiroides   |                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

- 24/31 -

|                                                     |   |    |   |   |    |                                                                                      |  |                      |                                         |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|---|----|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| #439                                                | H | 05 | B | A | 01 | Calcitonina                                                                          |  | 100 U/ml             | Amplia 1ml                              | IM SC | Preparados con calcitonina             | Tratamiento de la enfermedad de Paget, de la hipercalemia, de la Osteoporosis en mujer postmenopáusica y del dolor en el cáncer metastásico a hueso.                                                                                                                                                                                                                      | n | s | n | s | n | n |
| #440                                                | J |    |   |   |    |                                                                                      |  |                      |                                         |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| <b>ANTIINFECIOSOS GENERALES PARA USO SISTÉMICO</b>  |   |    |   |   |    |                                                                                      |  |                      |                                         |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| <b>Antibacterianos para uso sistémico:</b>          |   |    |   |   |    |                                                                                      |  |                      |                                         |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #441                                                | J | 01 | A |   |    |                                                                                      |  |                      |                                         |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #442                                                | J | 01 | A | A | 07 | Tetraciclina clorhidrato                                                             |  | 250mg<br>500mg       | Cápsula comprimido                      | Oral  | Tetraciclina.                          | Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por gérmenes susceptibles tanto gram negativos como gram positivos (incluyendo acné vulgar, antrax, clamidia, gonoreas, etc).                                                                                                                                                                                             | n | s | s | s | n | n |
| #443                                                | J | 01 | A |   |    |                                                                                      |  |                      |                                         |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #444                                                | J | 01 | A |   |    |                                                                                      |  |                      |                                         |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #445                                                | J | 01 | B | A | 01 | Cloranfenicol                                                                        |  | 500mg                | Cápsula comprimido                      | Oral  |                                        | Tratamiento de infecciones severas por cepas susceptibles ( <i>Salmonella typhi</i> , otras especies de <i>Salmonellas</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Neisseria</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>Bacteroides fragilis</i> , <i>Rickettsia rickettsii</i> , <i>Chlamydia</i> and <i>Mycoplasma</i> ) cuando otras alternativas menos tóxicas sean inapropiadas. | s | n | n | s | n | n |
| #446                                                | J | 01 | B |   |    |                                                                                      |  | 250mg                | Cápsula comprimido                      | Oral  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n | n | n | s | n | s |
| #447                                                | J | 01 | B |   |    |                                                                                      |  | 125mg/5ml            | Suspensión 60ml                         | Oral  | Amfenicoles.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s | n | n | n | n | s |
| #448                                                | J | 01 | B |   |    |                                                                                      |  | 1g                   | Vial                                    | IV    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s | n | n | n | n | s |
| #449                                                | J | 01 | C |   |    |                                                                                      |  |                      |                                         |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| <b>Antibacterianos betalactámicos, penicilinas.</b> |   |    |   |   |    |                                                                                      |  |                      |                                         |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #450                                                | J | 01 | C | A | 04 | Amoxicilina                                                                          |  | 250mg/5ml            | Póvoro para suspensión, frasco 60-100ml | Oral  |                                        | Tratamiento de infecciones bacterianas por cepas susceptibles en: Otitis media, sinusitis, mastoiditis aguda, agudización de bronquitis crónica, neumonía, infecciones del tracto urinario bajo, bacteriuria asintomática, infección urinaria relacionada a cepas resistentes a penicilina.                                                                               | s | s | n | n | s | n |
| #451                                                | J | 01 | C |   |    |                                                                                      |  | 500mg                | Cápsula comprimido                      | Oral  | Penicilinas de amplio espectro.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s | n | s | s | s | n |
| #452                                                | J | 01 | C | A | 01 | Ampicilina anhidra o trihidratada                                                    |  | 500mg                | Cápsula comprimido                      | Oral  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n | n | s | n | s | n |
| #453                                                | J | 01 | C |   |    |                                                                                      |  | 1g                   | Vial                                    | IM IV |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s | s | s | s | n | s |
| #454                                                | J | 01 | C | E | 08 | Bencilpenicilina benzatínica                                                         |  | 2.400.000 UI         | Vial                                    | IM    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s | s | s | s | s | n |
| #455                                                | J | 01 | C | E | 09 | Bencilpenicilina procainica                                                          |  | 4-4.8 millones U.I.  | Vial                                    | IM    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n | s | s | n | s | s |
| #456                                                | J | 01 | C |   |    | Bencilpenicilina procainica, con o sin bencilpenicilina cristalina sódica o potásica |  | 600.000 - 800.000 UI | Vial                                    | IM    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s | n | s | s | n | n |
| #457                                                | J | 01 | C | E | 01 | Bencilpenicilina sódica                                                              |  | 1.000.000 UI         | Vial                                    | IV    | Penicilinas sensibles a beta lactamas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s | s | n | s | s | n |
| #458                                                | J | 01 | C |   |    |                                                                                      |  | 10.000.000 UI        | Vial                                    | IV    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n | s | s | n | n | s |

[illegible]

- 24/35 -

[illegible]

|      |             |                                              |  |             |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |   |   |   |   |   |    |
|------|-------------|----------------------------------------------|--|-------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|---|----|
| #483 | J 01 D A 39 | Cefitibuten                                  |  | 400mg       | Capsula        | Oral  | Tratamiento de exacerbaciones infecciosas agudas de la<br>bronquitis crónica causada por H. Influenza, Moraxella<br>catarrhalis o S. Pneumoniae. Tratamiento de la otitis media<br>causada por H. Influenza, Moraxella catarrhalis o S. Pyogenes.        | n  | s  | n | n | n | n | n | n  |
| #484 | J 01 D A 63 | Ceftioxona sódica                            |  | 250mg       | Ampolla o vial | IM    | Tratamiento de urethritis gonococcica.                                                                                                                                                                                                                   | S  | n  | n | S | n | S | n | n  |
| #485 | J 01 D A 63 | Ceftriaxena sódica                           |  | 1g          | Ampolla o vial | IM IV | Tratamiento de infecciones causadas por organismos<br>susceptibles en el tracto respiratorio bajo, de la piel y sus<br>estructuras del sistema urinario, de infecciones<br>intrabdominales y pélvicas, de la meningitis y como profilaxis<br>quirurgica. | \$ | S  | S | S | S | S | n | \$ |
| #486 | J 01 D A 06 | Celuroxima                                   |  | 750mg       | Vial           | IM IV | Tratamiento de infecciones severas causadas por gérmenes<br>resistentes a otras cefalosporinas y preferencialmente por H.<br>Influenza y Neisseria gonorrhoeae                                                                                           | n  | n  | S | n | n | n | n | \$ |
| #487 |             |                                              |  | 125mg/5ml   | Frasco 50ml    | Oral  | Cefalosporinas y sustancias<br>relacionadas.                                                                                                                                                                                                             | n  | n  | n | n | n | n | n | \$ |
| #488 | J 01 D H 51 | Imipenem con Cilastatina                     |  | 500mg/500mg | Vial           | IV    | Tratamiento de infecciones aeróbicas y anaerobias por gram-<br>positivos o gram-negativos. Profilaxis quirurgica.                                                                                                                                        | \$ | \$ | S | n | S | n | n | n  |
| #489 | J 01 D H 02 | Mecopenam                                    |  | 500mg       | Ampolla o vial | IV    | Apandicitis complicada y peritonidis, meningitis bacteriana<br>causada por gérmenes susceptibles resistentes a otros<br>antibióticos.                                                                                                                    | n  | n  | S | n | S | n | n | \$ |
| #490 |             |                                              |  | 1g          | Vial           | IV    |                                                                                                                                                                                                                                                          | S  | n  | n | S | n | n | n | n  |
| #491 | J 01 F      | Macrolidos, lincosamidás y estreptograminas: |  | 500mg       | Comprimido     | Oral  | Tratamiento de infecciones por protozoos de la especie<br><i>Cryptosporidium</i> en pacientes inmunocomprometidos y en<br>SIDA.                                                                                                                          | n  | n  | S | n | S | n | n | n  |
| #492 | J 01 F A 10 | Azitromicina                                 |  | 500mg       | Comprimido     | Oral  |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |   |   |   |   |   |    |
| #493 | J 01 F A 09 | Clarithromicina                              |  | 500mg       | Comprimido     | Oral  |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |   |   |   |   |   |    |
| #494 | J 01 F A 09 | Clarithromicina                              |  | 250mg/5ml   | Frasco 60ml    | Oral  | Tratamiento de erradicación de las infecciones por Helicobacter<br>pylori, en combinación con inhibidores de la bomba de<br>protones, en pacientes con úlcera gastroduodenal.                                                                            | n  | n  | n | n | S | n | S | n  |
| #495 | J 01 F A 01 | Eritromicina (base, esleato)                 |  | 500mg       | Comprimido     | Oral  |                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ | S  | n | S | S | S | S | n  |

24/35-

| #    | Indicador   | Medicamento                      | Dosis             | Volumen | Vialidad | Forma farmacéutica                                    | Indicaciones | Contraindicaciones | Precauciones | Interacciones | Efectos secundarios | Reacciones adversas |
|------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| #496 |             | etilsuccinato)                   | 100mg/ml          |         |          | Gotas pediátricas, Oral con gotero calibrado, 10-20ml |              |                    |              |               |                     |                     |
| #497 |             |                                  | 250mg/5ml         |         |          | Gránulo para suspensión, 60-100ml                     |              |                    |              |               |                     |                     |
| #498 | J 01 F A 02 | Espiramida                       | 1-1.5 millones UI |         |          | Cápsula comprimido                                    | Oral         |                    |              |               |                     |                     |
| #499 | J 01 F F 02 | Lincamicina                      | 300mg/ml          |         |          | Vial 2ml                                              | IM IV        |                    |              |               |                     |                     |
| #500 | J 01 F F 01 | Clindamicina clorhidrato         | 300mg             |         |          | Cápsula comprimido                                    | Oral         |                    |              |               |                     |                     |
| #501 |             |                                  | 150mg/ml          |         |          | Ampolla 4ml                                           | IM IV        |                    |              |               |                     |                     |
| #502 |             |                                  | 75mg/5ml          |         |          | Suspensión 100ml                                      | Oral         |                    |              |               |                     |                     |
| #503 | J 01 G A 01 | Estreptomidina                   | 1g                |         |          | Vial                                                  | IM           |                    |              |               |                     |                     |
| #504 | J 01 G      | Aminoglicósidos antibacterianos: |                   |         |          |                                                       |              |                    |              |               |                     |                     |
| #505 | J 01 G B 06 | Amikacina sulfato                | 250mg/ml          |         |          | Ampolla o vial 2ml                                    | IM IV        |                    |              |               |                     |                     |
| #506 | J 01 G B 03 | Gentamicina sulfato              | 40mg/ml           |         |          | Ampolla o vial 2ml                                    | IM IV        |                    |              |               |                     |                     |

- 24/36 -

[illegible]

-24137-

[illegible]

[illegible]

- 24/39 -

[illegible]

- 24/40 -

|      |   |    |   |   |    |                                                                                                      |  |         |                               |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| #560 | J | 05 | A | E | 03 | Ritonavir                                                                                            |  | 100mg   | Capsula comprimido            | Oral | Inhibidor de la proteasa                            | Tratamiento en combinacion con otros agentes antiretrovirales en el manejo de la infeccion VIH-1.                                                                                                                                                                                                                                    | S | S | S | S | S | S | S |
| #561 | J | 05 | A | E | 02 | Indinavir sulfato                                                                                    |  | 400mg   | Capsula comprimido            | Oral |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
| #562 | J | 05 | A | F | 02 | Didanosina                                                                                           |  | 100mg   | Capsula comprimido            | Oral |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
| #563 | J | 05 | A | F | 04 | Efavirenz                                                                                            |  | 40mg    | Capsula comprimido            | Oral |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
| #564 | J | 05 | A | F | 05 | Lamivudina                                                                                           |  | 10mg/ml | Frasco 240ml                  | Oral |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
| #565 | J | 05 | A | F | 05 | Lamivudina                                                                                           |  | 150mg   | Capsula comprimido            | Oral | Inhibidor nucleosido de la transcriptasa inversa    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
| #566 | J | 05 | A | F | 01 | Zidovudina                                                                                           |  | 10mg/ml | Frasco 240ml                  | Oral |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
| #567 | J | 05 | A | F | 01 | Zidovudina                                                                                           |  | 10mg/ml | Vial 20ml                     | IV   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
| #568 | J | 05 | A | F | 01 | Zidovudina                                                                                           |  | 100mg   | Capsula                       | Oral |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
| #569 | J | 05 | A | G | 03 | Efavirenz                                                                                            |  | 200mg   | Capsula comprimido            | Oral | Inhibidor no-nucleosido de la transcriptasa inversa | Tratamiento de la infeccion por HIV asintomatica, incipiente o avanzada. Profilaxis de la transmision de la infeccion HIV materno-fetal.                                                                                                                                                                                             | S | S | S | S | S | S | S |
| #570 | J | 06 | A | A | 00 | Suero Inmune e Inmunoglobulinas: Antiescorpionico                                                    |  |         | Ampolia o vial                | IV   |                                                     | Tratamiento del envenenamiento agudo por picadura de alacran o escorpion.                                                                                                                                                                                                                                                            | S | S | S | S | S | S | S |
| #571 | J | 06 | A | A | 00 | Suero Inmune e Inmunoglobulinas: Antiescorpionico                                                    |  |         | Ampolia o vial                | IV   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
| #572 | J | 06 | A | A | 03 | Suero Antiofidico, Antibotrapico polivalente (Que incluya anti B.asper/atrox) con o sin antiaquesico |  |         | Vial 10ml                     | IV   |                                                     | Tratamiento del envenenamiento agudo por mordedura de serpientes de especies botrox (asper y atrox).                                                                                                                                                                                                                                 | S | S | S | S | S | S | S |
| #573 | J | 06 | A | A | 03 | Suero Antiofidico: Antimicrurus (Anticoral) (Que incluya anti M. imparitius)                         |  |         | Vial                          | IV   | Suero Inmune.                                       | Tratamiento del envenenamiento agudo por mordedura de serpientes de especies micrurus (M. rhipartus).                                                                                                                                                                                                                                | S | S | S | S | S | S | S |
| #574 | J | 06 | B | A | 02 | Inmunoglobulina                                                                                      |  | 2.5-3g  | Povo liofilizado solubilizado | IV   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |
| #575 | J | 06 | B | A | 02 | Inmunoglobulina                                                                                      |  | 0.5-1g  | Povo liofilizado solubilizado | IV   |                                                     | Terapia de mantenimiento en pacientes incapaces de producir suficientes cantidades de anticuerpos IgG. Indicada en pacientes que requieren un incremento inmediato de los niveles de inmunoglobulina y la aplicacion intramuscular esta contraindicada. Trombocitopenia cronica autoinmune y en purpura trombocitopenica idiopatica. | S | S | S | S | S | S | S |
| #576 | J | 06 | B | A | 02 | Inmunoglobulina                                                                                      |  | 5-6g    | Povo liofilizado solubilizado | IV   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S | S | S | S | S | S | S |

- 2014 -

| #    | J | 06 | B | B | 01 | Inmunoglobulina Anti-D (Rh) Humana       | 125-150mcg/ml | Vial 2ml                      | IM    | Inmunoglobulinas específicas. | Prevenión de la inmunización de los individuos Rh negativos expuestos a globulos rojos Rh positivos. | S  | S  | S  | S  | S  | n | n | n | n |
|------|---|----|---|---|----|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| #577 | J | 06 | B | B | 01 | Inmunoglobulina anti-tetánica            | 250U          | Vial o jeringuilla            | IM    |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #578 | J | 06 | B | B | 02 | Tóxide tetánico (precipitado en alumbre) |               |                               |       |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #579 | J | 07 | A | M | 08 | Triple vacuna DPT                        |               |                               |       |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #580 | J | 07 | A | K | 52 | Vacuna antineumocócica                   | 25mcg/0.5ml   | Vial o jeringuilla prellenada | IM SC |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #581 | J | 07 | A | L | 02 | Vacuna anti-sarampión viva atenuada      |               | Ampolla 0.5ml                 | SC    |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #582 | J | 07 | A | A | 20 | Ciclofosfamida                           |               |                               |       |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #583 | J | 07 | A | A | 20 | Ciclofosfamida                           |               |                               |       |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #584 | J | 07 | A | A | 20 | Ciclofosfamida                           |               |                               |       |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #585 | L | 01 | A | B | 01 | Busulfano                                | 2mg           | Comprimido                    | Oral  |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #586 | L | 01 | A | B | 01 | Busulfano                                | 50mg          | Comprimido                    | Oral  |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #587 | L | 01 | A | B | 01 | Busulfano                                | 500mg-1g      | Ampolla o vial                | IV    |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #588 | L | 01 | A | A | 01 | Ciclofosfamida                           |               |                               |       |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #589 | L | 01 | A | A | 01 | Ciclofosfamida                           |               |                               |       |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #590 | L | 01 | A | A | 01 | Ciclofosfamida                           |               |                               |       |                               |                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |

| #    | L | 01 | A | A | 02 | Clorambucil      | 2mg     | Comprimido                                                   | Oral                | Análogos de la mostaza nitrogenada.                                                                                  | Tratamiento único o en combinación de la leucemia linfocítica crónica, de linfomas malignos (incluyendo linfocarcinoma, enfermedad de Hodgkin y linfoma folicular gigante), de carcinoma de ovario, de mama y de testículo. Tratamiento de anemia hemolítica autoinmune asociada a citoglutinas; de policitemia vera y macroglobulinemia.                                                                                                                                                  | n | n | s | n | n | n |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|---|----|------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #591 | L | 01 | A | A | 02 | Clorambucil      | 2mg     | Comprimido                                                   | Oral                | Análogos de la mostaza nitrogenada.                                                                                  | Tratamiento único o en combinación de la leucemia linfocítica crónica, de linfomas malignos (incluyendo linfocarcinoma, enfermedad de Hodgkin y linfoma folicular gigante), de carcinoma de ovario, de mama y de testículo. Tratamiento de anemia hemolítica autoinmune asociada a citoglutinas; de policitemia vera y macroglobulinemia.                                                                                                                                                  | n | n | s | n | n | n |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #592 | L | 01 | A | A | 03 | Melfalano        | 2mg     | Comprimido                                                   | Oral                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   | Tratamiento del mieloma múltiple. Tratamiento de remisión de la policitemia nuda vera.                             | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n | s | n | n | n |   |   |   |
| #593 | L | 01 | A | A | 03 | Melfalano        | 50mg    | Vial                                                         | IV                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   | Tratamiento de sarcoma de tejidos blandos, del cáncer del pulmón, cáncer de ovario, testicular, cervical, de mama. | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n | s | n | n | n | s |   |   |
| #594 | L | 01 | A | A | 06 | Ifostamida       | 1g      | Vial                                                         | IV                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   | Tratamiento del mieloma. Linfoma y tumores cerebrales.                                                             | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n | s | n | n | n | n |   |   |
| #595 | L | 01 | A | D | 02 | Lomustina        | 20mg    | Comprimido                                                   | Oral                | Nitrosoureas.                                                                                                        | Tratamiento del mieloma. Linfoma y tumores cerebrales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s | n | s | n | n | n | n                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #596 | L | 01 | A | D | 01 | Carbustina       | 100mg   | Ampolla o vial con diluyente                                 | IV                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                    | Tratamiento del mieloma. Linfoma y tumores cerebrales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | s | n | s | n | n | n | n |   |
| #597 | L | 01 | B |   |    | Antimetabolitos. | 1g      | Injectable                                                   | Parenteral          | Análogos del ácido fólico.                                                                                           | Tratamiento de enfermedades neoplásicas incluyendo: Tumores trofoblásticos, Leucemia linfocítica y mielocítica aguda, Leucemia miélogica, Linfoma no Hodgkin, Micosis fungoides, Carcinoma de mamas, Carcinoma pulmonar broncogénico, Carcinoma de vejiga y de cabeza y cuello. Sarcoma osteogénico. Tratamiento de la Artritis Reumatoidea severa del adulto, con nula respuesta a la terapia convencional. Tratamiento de la Psoriasis severa no controlada con la terapia convencional. | s | n | s | n | n | n | s                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #598 | L | 01 | B | A | 01 | Melotrexato      | 25mg/ml | Vial 2ml (solución isotónica parenteral libre preservativos) | Parenteral IM IT IV |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                    | Tumores trofoblásticos, Leucemia linfocítica y mielocítica aguda, Leucemia miélogica, Linfoma no Hodgkin, Micosis fungoides, Carcinoma de mamas, Carcinoma pulmonar broncogénico, Carcinoma de vejiga y de cabeza y cuello. Sarcoma osteogénico. Tratamiento de la Artritis Reumatoidea severa del adulto, con nula respuesta a la terapia convencional. Tratamiento de la Psoriasis severa no controlada con la terapia convencional. | s | n | s | n | n | n | s |   |
| #599 | L | 01 | B | A | 01 | Melotrexato      | 25mg/ml | Vial 2ml (solución isotónica parenteral libre preservativos) | Parenteral IM IT IV |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                    | Tumores trofoblásticos, Leucemia linfocítica y mielocítica aguda, Leucemia miélogica, Linfoma no Hodgkin, Micosis fungoides, Carcinoma de mamas, Carcinoma pulmonar broncogénico, Carcinoma de vejiga y de cabeza y cuello. Sarcoma osteogénico. Tratamiento de la Artritis Reumatoidea severa del adulto, con nula respuesta a la terapia convencional. Tratamiento de la Psoriasis severa no controlada con la terapia convencional. | s | n | s | n | n | n | n | s |
| #600 | L | 01 | B | A | 01 | Melotrexato      | 25mg/ml | Vial 2ml (solución isotónica parenteral libre preservativos) | Parenteral IM IT IV |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                    | Tumores trofoblásticos, Leucemia linfocítica y mielocítica aguda, Leucemia miélogica, Linfoma no Hodgkin, Micosis fungoides, Carcinoma de mamas, Carcinoma pulmonar broncogénico, Carcinoma de vejiga y de cabeza y cuello. Sarcoma osteogénico. Tratamiento de la Artritis Reumatoidea severa del adulto, con nula respuesta a la terapia convencional. Tratamiento de la Psoriasis severa no controlada con la terapia convencional. | s | n | s | n | n | n | n | s |
| #601 | L | 01 | B | B | 05 | Fludarabina      | 50mg    | Vial                                                         | IV                  | Tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, refractaria a los esquemas de primera línea con agentes alquilantes. | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n | s | n | n | n | n | n                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |

- 24/43 -

|      |      |   |      |                                                 |         |                                  |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |
|------|------|---|------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| #602 | L 01 | B | 02   | Mercaptopurina                                  | 50mg    | Comprimido                       | Oral | Análogos de purina        | Terapia de mantenimiento en la leucemia linfoblástica aguda.<br>Tratamiento curativo de la leucemia linfocítica aguda.<br>Tratamiento alternativo a la cirugía en paciente con enfermedad de Crohn que no responden a esteroides y a otros fármacos. | s | n | s | n | n | s |
| #603 | L 01 | B | C 01 | Citarabina                                      | 100mg   | Ampolla o vial, con IV diluyente | IV   | Análogos de la pirimidina | Tratamiento inductor y de mantenimiento de la remisión en la leucemia mieloide aguda, en la leucemia linfocítica, en la leucemia meníngea y tratamiento del linfoma. Útil en combinación con otros antineoplásicos en protocolos de quimioterapia.   | s | n | s | n | n | s |
| #604 |      |   |      |                                                 | 500mg   | Ampolla o vial, con IV diluyente | IV   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | n | n | n | n | n | s |
| #605 |      |   |      |                                                 | 1g      | Vial                             | IV   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | s | n | s | n | n | n |
| #606 | L 01 | B | C 02 | Fluorouracilo                                   | 50mg/ml | Ampolla o vial 5 - 10ml          | IV   | Análogos de la pirimidina | Tratamiento del carcinoma de colon, de recto, de estómago, del páncreas exocrino, del hígado, de mama, cabeza y cuello, del vejiga, de pulmón, de cérvix y del carcinoma epitelial de ovario.                                                        | s | n | s | n | n | n |
| #607 | L 01 | B | C 05 | Gencitabina                                     | 200mg   | Vial                             | IV   |                           | Tratamiento del adenocarcinoma pancreático localizado, n avanzado o metastásico. Tratamiento del carcinoma pulmonar de células no pequeñas localizado, avanzado o metastásico.                                                                       | n | n | s | n | n | n |
| #608 |      |   |      |                                                 | 1g      | Vial                             | IV   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | n | n | s | n | n | n |
| #609 | L 01 | B | C 06 | Capecitabine                                    | 500mg   | Comprimido                       | Oral | Análogos de la pirimidina | Monoterapia de segunda línea en cáncer colorrectal metastásico, en carcinoma de mama metastásico y carcinoma de pulmón de células no pequeñas.                                                                                                       | n | n | s | n | n | n |
| #610 | L 01 | C |      | Plantas alcaloides y otros productos naturales. |         |                                  |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |
| #611 | L 01 | C | A 01 | Vinblastina sulfato                             | 10mg    | Vial 10mg                        | IV   |                           | Tratamiento del linfoma de Hodgkin y del no Hodgkin, de la histiocitos, del teratoma y del seminoma testicular.<br>Tratamiento del carcinoma de mama, del cotocarcinoma y del carcinoma de células renales.                                          | s | n | s | n | n | s |

[illegible]

- 24/45 -

[illegible]

[illegible]

- 24/47 -

[illegible]

- 24/48 -

|      |   |    |   |   |    |  |                               |       |                | Antandrogenos.                       |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                 |  |  | del cáncer metastático de la próstata.                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|---|----|--|-------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------|--|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #656 | L | 02 | B | B | 02 |  | Nilutamida                    | 50mg  | Comprimido     | Oral                                 |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             | S | S | n | S | n | n | n | n | n |   |   |
|      |   |    |   |   |    |  |                               |       |                | Inhibidores selectivos de aromatasa: |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #657 | L | 02 | B | B | 03 |  | Anastrozol o,                 | 1 mg  | Comprimido     | Oral                                 |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             | n | n | n | S | n | n | n | n | n |   |   |
| #658 | L | 02 | B | B | 03 |  | Letrozol                      | 2.5mg | Comprimido     | Oral                                 |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             | n | n | n | S | n | n | n | n | n |   |   |
| #659 | L | 02 | B | B | 04 |  |                               |       |                |                                      |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      |   |    |   |   |    |  |                               |       |                | Inhibidores enzimáticos              |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                 |  |  | Tratamiento del cáncer de mama avanzado, en mujeres postmenopáusicas, donde la enfermedad ha progresado luego de la terapia con tamoxifeno. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #660 | L | 03 |   |   |    |  | Agentes inmunomoduladores:    |       |                |                                      |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #661 | L | 03 | A |   |    |  | Agentes inmunostimulantes:    |       |                |                                      |  |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Tratamiento del carcinoma metastásico renal y del melanoma maligno metastásico. |  |  |                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #662 | L | 03 | A | A | 01 |  | Aldesleukina (Interleukina-2) |       | Vial           | 18-22 millones UI                    |  |  | IM IV SC |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             |   |   |   | n | n | S | n | n | n | n |   |
| #663 | L | 03 | A | A | 02 |  | Filgrastim                    |       | Vial           | 300mcg/ml                            |  |  | IV SC    | Citoquinas.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #664 | L | 03 | A | A | 04 |  | Interferon alfa 2a o alfa 2b  |       | Ampolla o vial | 4.5-5 millones unidades              |  |  | IM IV SC | Tratamiento de: Leucemia de células pilosas. Sarcoma de Kaposi relacionado a SIDA. Carcinoma renal. Leucemia mielodérmica crónica. Mieloma múltiple. Linfoma cutáneo de células T. Hepatitis no A, no B crónicas activas. Hepatitis no C crónica activa. |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             |   |   |   | S | S | n | n | n | n | n |   |
| #665 | L | 03 | A | A | 04 |  | Interferon alfa 2a o alfa 2b  |       | Ampolla o vial | 9-10 millones unidades               |  |  | IM IV SC | Citoquinas.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #666 | L | 03 | A | A | 03 |  | Molgramosin                   |       | Vial           | 150mcg/ml                            |  |  | IV SC    | Tratamiento de: Leucemia de células pilosas. Sarcoma de Kaposi relacionado a SIDA. Carcinoma renal. Leucemia mielodérmica crónica. Mieloma múltiple. Linfoma cutáneo de células T. Hepatitis no A, no B crónicas activas. Hepatitis no C crónica activa. |  |  |                                                                                 |  |  |                                                                                                                                             |   |   |   | S | n | n | n | n | n | n | S |

- 24/49 -

[illegible]

- 24/50 -

|                              |   |    |   |   |    |                                                   |  |          |                    |        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|----|---|---|----|---------------------------------------------------|--|----------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #676                         | L | 04 | A | A | 06 | Micofenolato mofetil                              |  | 250mg    | Cápsula            | Oral   | Inmunosupresores selectivos.                           | Coadyuvante en la prevención del rechazo agudo del trasplante renal (en combinación con ciclosporina y corticosteroides).                                                                                                                                                                                                                  | S | n | n | n | n | n | n | n | n | S |
| #677                         | L | 04 | A | X | 01 | Azatioprina                                       |  | 50mg     | Comprimido         | Oral   | Análogos de la purina.                                 | Agente coadyuvante en el tratamiento preventivo del rechazo del trasplante renal... Tratamiento de la artritis reumatoidea severa en pacientes adultos seleccionados que no responden a la terapia convencional.                                                                                                                           | S | n | n | n | n | n | n | n | n | S |
| #678                         | L | 04 | A | X | 02 | Talidomida                                        |  | 50mg     | Cápsula            | Oral   | Análogos de la purina.                                 | Reacciones leprosas. En oncología, se utiliza para prevención del rechazo de médula ósea                                                                                                                                                                                                                                                   | n | n | n | S | n | S | n | S | n | n |
| #679                         |   |    |   |   |    |                                                   |  |          |                    |        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO: |   |    |   |   |    |                                                   |  |          |                    |        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #680                         | M |    |   |   |    | Antinflamatorios y antireumáticos:                |  |          |                    |        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #681                         | M | 01 |   |   |    | Antinflamatorios y antireumáticos no esteroideos: |  |          |                    |        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #682                         | M | 01 | A |   |    | Indometacina                                      |  | 100mg    | Supositorio        | Rectal |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #683                         | M | 01 | A | B | 01 | Indometacina                                      |  | 200mg    | Comprimido         | Oral   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #684                         | M | 01 | A | B | 02 | Sulindaco                                         |  |          |                    |        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #685                         | M | 01 | A | B | 05 | Diclofenaco sódico                                |  | 50mg     | Cápsula comprimido | Oral   | Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas. | Tratamiento de la artritis reumatoidea, de la osteoartritis y de las espondilitis anquilosante; de varias condiciones reumáticas incluyendo bursitis, mialgia, ciática y tendinitis; de lesiones que incluyen desgarramiento o distensión; dismenorrea; cefalea, migraña, cangria menor y dental; dolor postpartum; cólico renal o biliar. | S | n | S | S | S | S | S | n | n | n |
| #686                         | M | 01 | A | B | 05 | Diclofenaco sódico                                |  | 50mg     | Supositorio        | Rectal |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #687                         | M | 01 | A | B | 05 | Diclofenaco sódico                                |  | 75mg/3ml | Ampollas           | IM     | Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas. | Tratamiento de la artritis reumatoidea, de la osteoartritis y de las espondilitis anquilosante; de varias condiciones reumáticas incluyendo bursitis, mialgia, ciática y tendinitis; de lesiones que incluyen desgarramiento o distensión; dismenorrea; cefalea, migraña, cangria menor y dental; dolor postpartum; cólico renal o biliar. | S | S | S | S | S | S | S | S | n | n |

- 24/51 -

|      |   |    |   |   |    |                                             |  |           |                    |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|---|----|---------------------------------------------|--|-----------|--------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| #688 | M | 01 | A | C | 06 | Meloxicam                                   |  | 7.5 gm    | Comprimido         | Oral | Oxucamos                          | Dolor músculo esquelético de todo tipo, en especial secundarias a procesos inflamatorios. Tratamiento de la enfermedad reumatoidea, de la osteoartritis y de artritis juvenil crónica.                                                                                                                       | n | s | n | s | n | n |
| #689 | M | 01 | A | E | 01 | Ibuprofeno                                  |  | 400mg     | Comprimido         | Oral |                                   | Tratamiento antiinflamatorio y analgésico de las enfermedades reumáticas: artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, osteoartritis y gota aguda. Tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético de enfermedades infecciosas.                                                                  | s | s | s | s | s | s |
| #690 | M | 01 | A | E | 02 | Naproxeno                                   |  | 500-550mg | Cápsula comprimido | Oral | Derivados del ácido propiónico    | Tratamiento antiinflamatorio y analgésico en la dismenorrea y luego de la inserción de dispositivos intrauterinos.                                                                                                                                                                                           | n | s | n | s | n | n |
| #691 | M | 01 | A | H | 02 | Rofecoxib                                   |  | 25mg      | Comprimido         | Oral | Coxibes                           | Antiinflamatorio no esteroideo. Analgésico. Bloqueador específico de COX-2. Uso en dolor moderado a severo.                                                                                                                                                                                                  | n | n | n | s | n | n |
| #692 | M | 01 | C |   |    | Agentes antirreumáticos específicos:        |  |           |                    |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
| #693 | M | 01 | C | B | 01 | Aurotiomalato sódico                        |  | 50mg/ml   | Ampolla 1ml        | IM   | Preparaciones de oro.             | Indicado cuando han fallado terapias con antiinflamatorios no esteroideos.                                                                                                                                                                                                                                   | n | n | n | n | n | n |
| #694 | M | 01 | C | C | 01 | Penicilamina                                |  | 250-300mg | Cápsula comprimido | Oral | Penicilamina y agentes similares. | Tratamiento de la artritis reumatoidea severa, no controlada con los procedimientos usuales.                                                                                                                                                                                                                 | n | n | n | s | n | n |
| #695 | M | 03 |   |   |    | Relajantes musculares:                      |  |           |                    |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
| #696 | M | 03 | A |   |    | Relajantes musculares de acción periférica: |  |           |                    |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
| #697 | M | 03 | A | A | 01 | Alcuronio (Alhordoxifema)                   |  | 10mg/ml   | Ampolla 2ml        | IV   | Alcaloides curare                 | Tratamiento facilitador de la intubación endotraqueal. Coadyuvante de la anestesia general. Relajante de la musculatura esquelética durante los procedimientos quirúrgicos. Reductor de la intensidad de la contracción muscular asociada a convulsiones inducidas por fármacos o procedimientos eléctricos. | s | n | n | n | n | n |
| #698 | M | 03 | A | B | 01 | Suxametonio cloruro (Succinilcolina)        |  | 50mg/ml   | Vial 10ml          | IV   | Derivados de colina               | Tratamiento facilitador de la intubación endotraqueal. Coadyuvante de la anestesia general. Relajante de la musculatura esquelética durante los procedimientos quirúrgicos. Reductor de la intensidad de la contracción muscular asociada a convulsiones inducidas por fármacos o procedimientos eléctricos. | s | s | s | n | n | s |

24/52

|      |   |    |   |   |    |                                          |           |                 |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---|----|---|---|----|------------------------------------------|-----------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| #699 | M | 03 | A | C | 04 | Ataracuno besilato                       | 10mg/ml   | Ampolla 2.5-5ml | IV   | Condyuante de la anestesia general durante la cirugía. Facilitador de la inducción endotraqueal.                                                                                   | \$                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #700 | M | 03 | A | C | 01 | Pancuronio bromuro                       | 2mg/ml    | Ampolla 2ml     | IV   | Bloqueo neuromuscular durante anestesia general en intervenciones quirúrgicas. Facilitador de la ventilación pulmonar en pacientes manipulados en Unidades de Cuidados Intensivos. | n                                       | s  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  |
| #701 | M | 03 | A | C | 03 | Vecuronio                                | 10mg      | Vial            | IV   |                                                                                                                                                                                    | Otros compuestos de amonio cuaternario. | n  | s  | n  | n  | n  | n  | n  | n  |
| #702 | M | 03 | A | C | 09 | Rocuronio bromuro                        | 10mg/ml   | Vial 5ml        | IV   | Inducción de la relajación muscular durante cirugía.                                                                                                                               | \$                                      | n  | \$ | \$ | n  | n  | n  | n  | \$ |
| #703 | M | 03 | B |   |    | Relajantes musculares de acción central: |           |                 |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #704 |   |    |   |   |    | Relajantes musculares de acción central: |           |                 |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #705 | M | 03 | B | X | 02 | Tizanidina clorhidrato o                 | 4mg       | Comprimido      | Oral | Otros agentes de acción central.                                                                                                                                                   | n                                       | s  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  |
| #706 |   |    |   |   |    | Baclofeno                                | 10mg      | Comprimido      | Oral | Otros agentes de acción central.                                                                                                                                                   | s                                       | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | \$ |
| #707 | M | 04 |   |   |    | Preparaciones contra la gota:            |           |                 |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #708 | M | 04 | A | A | 01 | Alopurinol                               | 300mg     | Comprimido      | Oral | Inhibidor de la producción de ácido úrico.                                                                                                                                         | \$                                      | s  | s  | s  | s  | s  | s  | s  | n  |
| #709 | M |    |   |   |    |                                          | 100mg     | Comprimido      | Oral | Profilaxis y tratamiento de la gota y de los cálculos renales por ácido úrico y por oxalato de calcio.                                                                             | n                                       | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | \$ |
| #710 | M | 04 | A | C | 01 | Colchicina                               | 0.5-0.6mg | Comprimido      | Oral | Preparaciones que no afectan el metabolismo del profármaco de las mismas crisis.                                                                                                   | \$                                      | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | \$ |
| #711 | M | 05 | B |   |    | Fármacos que afectan la mineralización   |           |                 |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #712 | M | 05 | B | A | 08 | Zoledrónico ácido                        | 4mg       | Vial            | IV   | Tratamiento y prevención de lesiones osteolíticas, en neoplasias malignas (Vgr. cáncer de mama y mieloma múltiple).                                                                | n                                       | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  |
| #713 | M | 05 | B | A | 03 | Pamidronato sódico                       | 90mg      | Vial            | IV   | Tratamiento inhibitorio de la reabsorción ósea asociada a Cáncer o a Enfermedad de Paget.                                                                                          | n                                       | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  | n  |
| #714 |   |    |   |   |    |                                          |           |                 |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #715 | N |    |   |   |    | SISTEMA NERVIOSO:                        |           |                 |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #716 | N | 01 |   |   |    | Anestésicos:                             |           |                 |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #717 | N | 01 | A |   |    | Anestésicos generales:                   |           |                 |      |                                                                                                                                                                                    |                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |

-E57/112-

[illegible]

| #    | N | O2 | A | A | 01 | Morfina clorhidrato o sulfato                  | 10mg/ml        | Ampolla, jeringuilla calibrada o vial, 1ml | IM IV SC   | Alcaloides naturales.                 | opioides | Control del dolor agudo o crónico moderado a severo, de etiología diversa, particularmente de origen maligno.                            | S  | \$ | n  | n  | n  | s  |
|------|---|----|---|---|----|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| #738 |   |    |   |   |    |                                                |                |                                            |            |                                       |          |                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |    |
| #739 |   |    |   |   |    | Morfina sulfato                                | 15mg           | Comprimido                                 | Oral       |                                       |          |                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |    |
| #740 | N | 02 | A | B | 02 | Petidina (mepredina)                           | 50mg/ml        | Ampolla 2ml                                | IM IV      | Derivados fenilpiperidínicos.         |          | Tratamiento del dolor severo tanto clínico como quirúrgico.                                                                              | \$ | \$ | n  | n  | n  | \$ |
| #741 | N | 02 | A | X | 02 | Tramadol clorhidrato                           | 50mg           | Cápsula                                    | Oral       |                                       |          |                                                                                                                                          | \$ | \$ | n  | n  | n  | \$ |
| #742 |   |    |   |   |    |                                                | 100mg/ml       | Frasco gotero de 10ml                      | Oral       | Otros opiodes.                        |          |                                                                                                                                          | T  | n  | n  | \$ | n  | \$ |
| #743 |   |    |   |   |    |                                                | 50mg/ml        | Ampolla 2ml                                | Parenteral |                                       |          | Tratamiento del dolor moderado a severo                                                                                                  | n  | n  | \$ | \$ | n  | \$ |
| #744 | N | 02 | B |   |    | Otros analgésicos y antipiréticos:             |                |                                            |            | Acido salicílico derivados.           |          | Analgésico para alivio del dolor leve a moderado.                                                                                        | n  | \$ | n  | \$ | n  | \$ |
| #745 | N | 02 | B | A | 01 | Acetil Salicílico ácido                        | 300-325mg      | Comprimido con capa entérica               | Oral       |                                       |          | Antiflamatorio no esteroideo para el manejo de la artritis reumatoidea. Coadyuvante en el tratamiento de los trastornos tromboembólicos. | \$ | \$ | \$ | n  | n  | \$ |
| #746 | N | 02 | B | B | 02 | Dipirona (Metamizol) con sales magnésicas      | 400mg/ml       | Ampolla 5ml                                | IM IV      | Pirazolones.                          |          | Analgésico parenteral, no narcótico, para el tratamiento sintomático del dolor moderado a severo.                                        | n  | n  | \$ | n  | n  | \$ |
| #747 |   |    |   |   |    |                                                | 500mg/ml       | Ampolla 2ml                                | IM IV      |                                       |          |                                                                                                                                          | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #748 | N | 02 | B | E | 01 | Dipirona (Metamizol) sódica                    | 500mg          | Comprimido                                 | Oral       |                                       |          |                                                                                                                                          | \$ | \$ | n  | n  | n  | \$ |
| #749 |   |    |   |   |    | Paracetamol (Acetaminofén)                     | 250-300mg      | Supositorios pediatricos                   | Rectal     |                                       |          |                                                                                                                                          | \$ | \$ | n  | n  | n  | \$ |
| #750 |   |    |   |   |    |                                                | 90-100mg/ml    | Gotas con glicerol calibrado, 15-20ml      | Oral       | Anilidos.                             |          | Tratamiento analgésico temporal de dolores leves y de moderada intensidad. Antipirético.                                                 | \$ | \$ | n  | n  | n  | \$ |
| #751 |   |    |   |   |    |                                                | 120-160mg/5ml  | Jarabe o solución                          | Oral       |                                       |          |                                                                                                                                          | \$ | \$ | n  | n  | n  | \$ |
| #752 | N | 02 | B | E | 51 | Paracetamol (Acetaminofen) con Codeína fosfato | 300-325mg/30mg | Comprimido                                 | Oral       | Anilidos.                             |          | Tratamiento analgésico temporal del dolor moderado a intenso.                                                                            | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #753 | N | 02 | C |   |    | Preparaciones antimigrañosas:                  |                |                                            |            |                                       |          |                                                                                                                                          | \$ | \$ | n  | n  | n  | \$ |
| #754 | N | 02 | C | A | 52 | Ergotamina/Cafeína                             | 1mg/100mg      | Comprimido                                 | Oral       | Alcaloides del conezuelo del centeno. |          | Tratamiento del ataque agudo de migraña y de las distonías variantes de migraña que no responden a analgésicos.                          |    |    |    |    |    |    |
| #755 | N | 02 | C | X | 00 | Clonixinal de lisina                           | 50mg/ml        | Ampolla 4ml                                | IV         |                                       |          | Suplemento alimenticio. Tratamiento de la hiperginemia.                                                                                  | n  | n  | \$ | n  | n  | \$ |
| #756 | N | 03 | A |   |    | Antiepilepticos:                               |                |                                            |            |                                       |          |                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |    |
| #757 | N | 03 | A | A | 02 | Fenobarbital                                   | 16mg           | Comprimido                                 | Oral       |                                       |          | Tratamiento crónico para el control de las convulsiones tóricas                                                                          | n  | \$ | n  | n  | \$ | \$ |
| #758 |   |    |   |   |    |                                                | 64mg           | Comprimido                                 | Oral       |                                       |          | (Anexo II) de las remisiones nombradas del actario                                                                                       | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |



- 24/56 -

|      |   |    |   |   |    |                                    |                                      |        |                                              |       |  |                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|---|----|------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| #775 | N | 03 | A | X | 12 | Gabapentina                        |                                      | 300mg  | Comprimido comprimido dispersable masticable | Oral  |  | Tratamiento de segunda línea o coadyuvante en el manejo de las convulsiones refractarias.                                                                          | n | n | n | n | n | n | n |
| #776 | N | 03 | A | X | 09 | Lamotrigina                        |                                      | 25mg   | Comprimido comprimido dispersable masticable | Oral  |  |                                                                                                                                                                    | n | n | n | n | n | n | n |
| #777 |   |    |   |   |    |                                    |                                      | 100mg  | Comprimido comprimido dispersable masticable | Oral  |  |                                                                                                                                                                    | s | n | n | n | s | n | n |
| #778 | N | 03 | A | X | 11 | Topiramato                         |                                      | 25mg   | Comprimido comprimido dispersable masticable | Oral  |  | Tratamiento de segunda línea o coadyuvante en el manejo de las convulsiones refractarias. Tratamiento de las convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut. | n | n | n | n | s | n | s |
| #779 |   |    |   |   |    |                                    |                                      | 100mg  | Comprimido comprimido dispersable masticable | Oral  |  |                                                                                                                                                                    | n | n | n | n | s | n | n |
| #780 | N | 04 |   |   |    | Fármacos antiparkinsonianos:       |                                      |        |                                              |       |  |                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| #781 | N | 04 | A |   |    | Agentes anticolinérgicos:          |                                      |        |                                              |       |  |                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| #782 | N | 04 | A | A | 02 | Biperideno clorhidrato             |                                      | 4mg    | Comprimido CR                                | Oral  |  | Tratamiento de los primeros estadios de la enfermedad de Parkinson.                                                                                                | n | n | n | s | s | n | n |
| #783 |   |    |   |   |    |                                    |                                      | 2mg    | Comprimido                                   | Oral  |  |                                                                                                                                                                    | s | s | s | s | s | n | n |
| #784 |   |    |   |   |    | Biperideno lactato                 |                                      | 5mg/ml | Ampolla 1ml                                  | IM/IV |  |                                                                                                                                                                    | s | s | s | s | s | n | s |
| #785 |   |    |   |   |    |                                    |                                      | 2mg/ml | Ampollas                                     | IM    |  |                                                                                                                                                                    | n | n | n | n | s | n | n |
| #786 | N | 04 | A | A | 01 | Trihexifenidilo clorhidrato        |                                      | 5mg    | Comprimido                                   | Oral  |  |                                                                                                                                                                    | s | n | n | s | s | n | n |
| #787 | N | 04 | B |   |    | Agentes dopaminérgicos:            |                                      |        |                                              |       |  |                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| #788 | N | 04 | B | A |    | Antiparkinsonianos dopaminérgicos: |                                      |        |                                              |       |  |                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| #789 | N | 04 | B | A | 02 |                                    | Levodopa con 250mg/25mg carbidopa, o |        | Comprimido                                   | Oral  |  | Tratamiento de la enfermedad de Parkinson.                                                                                                                         | s | s | s | n | s | s | s |
| #790 |   |    |   |   |    |                                    | Levodopa con 200mg/50mg benserazide  |        | Comprimido                                   | Oral  |  |                                                                                                                                                                    | s | s | s | n | s | s | s |

-24/57-

|      |   |    |   |    |                               |       |                    |                       |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---|----|---|----|-------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| #791 | N | 04 | B | 01 | Ananladina clorhidrato        |       | 100mg              | Comprimido            | Oral        | Derivados de amantadina.                  | Tratamiento de la enfermedad de Parkinson en pacientes que no toleran otro tratamiento. Profilaxis y tratamiento de la influenza A.                                                                                                                                                                                                         | \$ | n  | \$ | n  | \$ | n  | \$ | n  |    |    |
| #792 | N | 04 | B | 01 | Bromocriptina                 |       | 2.5mg              | Comprimido            | Oral        | Agonistas de la dopamina.                 | Tratamiento de la enfermedad de Parkinson, reservado para aquellos pacientes que no pueden utilizar o no toleran la levodopa sola.                                                                                                                                                                                                          | \$ | \$ | n  | \$ | n  | \$ | n  | \$ |    |    |
| #793 | N | 05 |   |    | Psicolépticos:                |       |                    |                       |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #794 | N | 05 | A |    | Antipsicóticos:               |       |                    |                       |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| #795 | N | 05 | A | 01 | Clorpromacina clorhidrato     |       | 25mg               | Ampolla o vial, 1.5ml | IM IV, o IM | Fenotiazina con grupo dimetilaminopropil. | Tratamiento de control de la fase maniaca de la enfermedad bipolar, manejo de la enfermedad psicótica incluyendo la esquizofrenia.                                                                                                                                                                                                          | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |    |    |
| #796 |   |    |   |    |                               | 25mg  | Comprimido         | Oral                  | \$          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |    |
| #797 |   |    |   |    |                               | 100mg | Comprimido         | Oral                  | \$          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |    |
| #798 | N | 05 | A | 02 | Levomopromazina               |       | 25mg/ml            | Ampollas              | IM IV, o IM |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #799 |   |    |   |    |                               | 25mg  | Comprimido         | Oral                  | \$          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #800 | N | 05 | A | 02 | Flufenazina decanoato         |       | 25mg/ml            | Ampolla 1ml           | IM          | Fenotiazina con estructura piperacínica.  | Tratamiento de los trastornos esquizoafectivos, de la esquizofrenia, del autismo, de la hipomanía, de la agitación severa asociada a psicosis orgánicas y funcionales.                                                                                                                                                                      | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |    |    |
| #801 | N | 05 | A | 06 | Trifluoperazina               |       | 1mg                | Cápsula comprimido    | Oral        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #802 |   |    |   |    |                               | 5mg   | Cápsula comprimido | Oral                  | \$          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #803 | N | 05 | A | 01 | Penticiacina (Propeticiacina) |       | 4%                 | Gotas, frasco 30ml    | Oral        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #804 | N | 05 | A | 02 | Tioridazina clorhidrato       |       | 25mg               | Cápsula comprimido    | Oral        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #805 |   |    |   |    |                               | 100mg | Cápsula comprimido | Oral                  |             | \$                                        | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |    |    |
| #806 | N | 05 | A | 01 | Halofuperidol                 |       | 2mg/ml             | Gotas 15ml            | Oral        | Derivados de butirofenonas.               | Tratamiento de la esquizofrenia crónica. Tratamiento de mantenimiento de los trastornos bipolares. Tratamiento reductor de los movimientos espasmódicos habituales de músculos particulares, del Síndrome de Gilles de la Tourette, de la Corea de Huntington y de la agitación refractaria severa del anciano. Manejo del tipo intratable. | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |    |    |
| #807 |   |    |   |    |                               | 5mg   | Comprimido         | Oral                  | \$          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |

[illegible]

- 24/59 -

[illegible]

- 24/60 -

| # | N | A | X | 14 | 16 | 03 | 05 | 04 | 08 | 01 | 21 | G | 01 | 06 | B | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

- 24/69 -

| #    | N | O7 | A | 01 | Neostigmina metilsulfato | 0.5mg/ml | Ampola 1ml         | IM SC      | Parasimpaticomimicos<br>Anticolinesterasicos. | Tratamiento del bloqueo neuromuscular no depolarizante, inducido por relajantes musculares utilizados en anestesia, por antídotos aminoglucosidos y agentes antiarrítmicos. Manejo del ileo paralítico. Coadyuvante en el tratamiento de la taquicardia sinusl o supraventricular. Tratamiento de la miastenia grave. | S  | n | s | n | s |
|------|---|----|---|----|--------------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|
| #873 | N | 07 | A | 02 | Pridostigmina bromuro    | 60mg     | Cápsula comprimido | aOral      |                                               | Tratamiento de la miastenia gravis. Tratamiento antagonista del efecto secundario provocado por los relajantes musculares no depolarizantes (E). Fármacos curatizantes).                                                                                                                                              | S  | n | n | n | S |
| #874 | N | 07 | B | 02 | Bupropion (Amfebutamona) | 150mg    | Comprimido         | Oral       | Agentes anti-tabaquismo                       | Ansicolitico, antianicodina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n  | n | n | s | n |
| #875 |   |    |   |    |                          |          |                    |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |
| #876 | P |    |   |    |                          |          |                    |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |
| #877 | P | 01 |   |    |                          |          |                    |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |
| #878 | P | 01 | A |    |                          |          |                    |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |
| #879 | P | 01 | A | B  | 01                       |          | Suspensión 120ml   | Oral       |                                               | Tratamiento de la glandiasis y amebiasis intestinal. Tratamiento sistémico en la mujer de la tricomoniasis de las vías vaginal. Tratamiento sistémico de la tricomoniasis de las vías urinarias en el varón. Coadyuvante en el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori en la úlcera péptica.              | \$ | n | n | s | n |
| #880 |   |    |   |    |                          |          | Tableta ranurada   | Oral       | Derivados nitroimidazoles.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |
| #881 | P | 01 | B |    |                          |          |                    |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |
| #882 | P | 01 | B | A  | 02                       |          | 400mg              | Comprimido | Oral                                          | Antioquinonas.<br><br>Tratamiento profilático y supresivo de todas las formas de malaria. Tratamiento coadyuvante en el control de la enfermedad reumatóides y del lupus eritematoso.                                                                                                                                 | S  | n | n | n | S |

- 24/62 -

|                                                                 |   |    |   |    |                          |                                                                          |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|----|---|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| #883                                                            | P | 01 | B | D  | 01                       | Primetamina                                                              |                           | 25mg        | Comprimido  | Oral | Diaminopirimidinas.      | Tratamiento combinado con la sulfonamida en el manejo sintérgico de la toxoplasmosis. Tratamiento profiláctico contra la malaria en especies susceptibles de plasmodium. Tratamientos combinado con otros antimaláricos en el control rápido de la transmisión y de la supresión de la malaria. | S                                  | n                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n                                                                                            | n | n | S |   |   |   |
| Agentes que actúan sobre la leishmaniasis y la tripanosomiasis: |   |    |   |    |                          |                                                                          |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
| #884                                                            | P | 01 | C |    |                          |                                                                          |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S                                  | S                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n                                                                                            | n | n | n |   |   |   |
| #885                                                            | P | 01 | C | B  | 00                       | Antimoniocitos pentavalentes:                                            |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
| #886                                                            | P | 01 | C | B  | 01                       | \                                                                        | Meglumina antimonioato o, | 300mg/ml    | Ampolla 5ml | IM   | Compuestos de antimonio. | Tratamiento de la leishmaniasis.                                                                                                                                                                                                                                                                | S                                  | S                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n                                                                                            | n | n | n |   |   |   |
| #887                                                            | P | 01 | C | 02 | Estibogluconato de sodio |                                                                          | 300mg/ml                  | Ampolla 5ml | IM IV       | S    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S                                  | n                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n                                                                                            | n | n | n |   |   |   |
| #888                                                            | P | 01 | C | B  | 01                       |                                                                          | Meglumina antimonioato    | 300 mg/ml   | Ampolla 5ml | IM   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S                                  | S                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n                                                                                            | n | n | n | n |   |   |
| Antihelmínticos:                                                |   |    |   |    |                          |                                                                          |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
| Agentes antihelmínticos:                                        |   |    |   |    |                          |                                                                          |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
| #889                                                            | P | 02 | C |    |                          |                                                                          |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n                                                                                            | S | n | S | S | S |   |
| #890                                                            | P | 02 | C |    |                          |                                                                          |                           | 200mg       | Comprimido  | Oral |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Derivados benzimidazoles.          | Tratamiento de la neurocisticercosis.                                                                                                                                                                                                                                                       | S                                                                                            | n | S | S | n | S |   |
| #891                                                            | P | 02 | C | A  | 03                       | Albendazol                                                               |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
| #892                                                            | P | 02 | C | A  | 01                       | Mebendazol                                                               |                           | 100mg       | Comprimido  | Oral |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Derivados benzimidazoles.          | Tratamiento de la parasitosis intestinal por Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Ascaris lumbricoides, Tenia saginata o solium, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura y Giardia lamblia. Tratamiento de la parasitosis intestinal y extraintestinal por Trichinella spiralis. | S                                                                                            | n | S | S | n | S |   |
|                                                                 |   |    |   |    |                          |                                                                          |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
| #893                                                            | P | 02 | C | A  | 02                       | Triabendazol                                                             |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tratamiento de la estrogilidosis, de la larva migrans cutánea, visceral y de la triquinosis. | n | n | n | S | n | n |
| #894                                                            | P | 02 | C | A  | 03                       | Albendazol                                                               |                           |             |             | Oral |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tableta masticable                 | Tratamiento de primera línea en el manejo de la hidatidiasis por Echinococcus granulosus y Echinococcus multilocularis. Terapia alternativa en la estrogilidosis.                                                                                                                           | S                                                                                            | n | n | S | n | n | n |
|                                                                 |   |    |   |    |                          |                                                                          |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |   |   |   |   |   |   |
| #895                                                            | P | 02 | C | B  | 01                       | Piperazina                                                               |                           |             |             | Oral |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Piperazina y derivados.            | Tratamiento de las parasitosis intestinales por Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis.                                                                                                                                                                                             | S                                                                                            | n | n | S | S | S | S |
| #896                                                            | P | 02 | X | X  | 52                       | Pirantel pamoato/Oxantel                                                 |                           |             |             | Oral |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Derivados de tetrahidropirimidina. | Tratamiento de las parasitosis intestinales por Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis y Trichuris trichiura.                                                                                                                                                                        | S                                                                                            | n | S | S | n | n | n |
| #897                                                            | P | 03 |   |    |                          | Ectoparasitocidas, incluyendo insecticidas escabiolizantes y repelentes: |                           |             |             |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |   |   |   |   |   |   |

- 24/63 -

|      |   |    |   |   |    |                                                                                             |  |                  |  |                                     |         |                                                           |                                                                    |    |    |    |    |    |    |
|------|---|----|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| #898 | P | 03 | A | X | 01 | Bencilo benzato                                                                             |  | 25%              |  | Loción                              | Tópico  | Otros ectoparasitoidas incluyendo escabiasas.             | Tratamiento tóxico de la escabiasas.                               | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #899 | P | 03 | A | B | 02 | Lindano (hexacloruro gammabenceno)                                                          |  | 1%               |  | Loción 60ml                         | Tópico  | Producto con cloro.                                       | Tratamiento de erradicación de la pediculosis y de la pediculosis. | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #900 | R |    |   |   |    |                                                                                             |  |                  |  |                                     |         |                                                           |                                                                    |    |    |    |    |    |    |
| #901 | R |    |   |   |    |                                                                                             |  |                  |  |                                     |         |                                                           |                                                                    |    |    |    |    |    |    |
| #902 | R | 01 |   |   |    |                                                                                             |  |                  |  |                                     |         |                                                           |                                                                    |    |    |    |    |    |    |
| #903 | R | 01 | A |   |    |                                                                                             |  |                  |  |                                     |         |                                                           |                                                                    |    |    |    |    |    |    |
| #904 | R | 01 | A | B | 07 | Descongestionantes y otras preparaciones nasales para uso tópico: Oximetazolina clorhidrato |  | 0.25%            |  | Solución atomizador nasal           | Nasal   | Simpatomiméticos                                          | Tratamiento de la congestión de la mucosa nasal.                   | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #905 | R | 01 | A | C | 01 | Cromoglicato sódico                                                                         |  | 4% peso/vol      |  | Solución atomizador con dispositivo | Nasal   | Agentes anti-alérgicos con exclusión de corticosteroides. | Tratamiento profiláctico de la rinitis alérgica.                   | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #906 | R | 01 | A | D | 01 | Becometasona dipropionato                                                                   |  | 0.8mg/ml         |  | Solución, inhalador 200 dosis       | Oral    | Corticosteroides.                                         | Profilaxis del asma.                                               | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #907 | R | 01 | A | D |    | Esteroides tópicos de uso nasal:                                                            |  |                  |  |                                     |         |                                                           |                                                                    |    |    |    |    |    |    |
| #908 | R | 01 | A | D | 01 | Becometasona o.                                                                             |  | 50mcg/inhalación |  | Suspensión acuosa                   | Nasal   |                                                           |                                                                    | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #909 | R | 01 | A | D | 05 | Budesonida o.                                                                               |  | 50mcg/inhalación |  | Suspensión acuosa                   | Nasal   |                                                           |                                                                    | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #910 | R | 01 | A | D | 08 | Fluticasona o.                                                                              |  | 50mcg/inhalación |  | Suspensión acuosa                   | Nasal   |                                                           |                                                                    | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #911 | R | 01 | A | D | 09 | Mometasona                                                                                  |  | 50mcg/inhalación |  | Suspensión acuosa                   | Nasal   |                                                           |                                                                    | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #912 | R | 01 | B |   |    | Descongestionantes nasales de uso sistémico:                                                |  |                  |  |                                     |         |                                                           |                                                                    |    |    |    |    |    |    |
| #913 | R | 01 |   |   |    | Antihistamínico con descongestionante nasal líquido:                                        |  |                  |  |                                     |         |                                                           |                                                                    |    |    |    |    |    |    |
| #914 | R | 01 | A | B |    | Antihistamínico                                                                             |  |                  |  |                                     |         |                                                           |                                                                    |    |    |    |    |    |    |
| #915 | R | 06 | A | B | 51 | Bromfeniramina o                                                                            |  | 2mg/5ml          |  | Líquido, frasco 90ml                | 60-Oral | Descongestionante nasal                                   | Tratamiento de la Rinitis y de la Rinorrea secundaria a procesos   | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #916 | R | 06 | A | A |    | Carbinoxamina o                                                                             |  | 4mg/5ml          |  | Líquido, frasco 90ml                | 60-Oral |                                                           |                                                                    | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| #917 | R | 06 | A | B | 56 | Clorfeniramina o                                                                            |  | 2mg/5ml          |  | Líquido, frasco 90ml                | 60-Oral | más antagonista de                                        |                                                                    | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |

- 19/112 -

[illegible]

- 24/65 -

| #339 | R | 03 | A | C | 13 | Formoterol fumarato                         | 12mg/inhalación     | Pólvora para inhalación        | Inhalación      | Agonista selectivos de beta 2 adrenérgicos                  | Coadyuvante en el manejo de la obstrucción reversible de las vías aéreas (asma crónica o EPOC), cuando se requiere la administración regular de un beta 2 agonista de acción prolongada. No recomendado en la fase aguda.    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|----|---|---|----|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #340 | R | 03 | B | C | 01 | Cromoglicato sódico                         | 0.8-1mg/inhalación  | Aerosol, dosis                 | Inhalación      | Agonistas antiastmáticos con exclusión de corticosteroides. | Tratamiento profiláctico del asma bronquial, y de la rinitis alérgica.                                                                                                                                                       | S | n | n | n | n | n | n | n |
| #341 | R | 03 | B | B | 01 | Ipratropio                                  | 250mcg/ml           | Solución nebulizar             | para inhalación |                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | S | S | n | n | n | n | n | n |
| #342 | R | 03 | B | B | 01 | Ipratropio bromuro                          | 15-20mcg/inhalación | Aerosol dosis                  | Inhalación      | Anticolinérgicos.                                           | Terapia de mantenimiento en enfermedad pulmonar obstructiva crónica.                                                                                                                                                         | S | n | n | n | n | n | n | n |
| #343 | R | 03 | C | A | 01 | Adrenalina cloruro                          | 1:1000 (1mg/ml)     | Ampolla 1ml                    | SC              |                                                             | Tratamiento de la crisis aguda de asma y de la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tratamiento del choque anafiláctico. Coadyuvante en la resucitación cardiopulmonar.                         | S | S | S | S | S | S | S | S |
| #344 | R | 03 | C | A | 02 | Efedrina sulfato                            | 25-50mg/ml          | Ampolla o vial 1-2ml           | IV              | Agonistas de receptores alfa y beta adrenérgicos            | Profilaxis y coadyuvante en el tratamiento de casos moderados de asma aguda y en pacientes con asma crónica que requieren tratamiento continuo. Tratamiento de la narcolepsia en intoxicación por narcóticos y barbitúricos. | S | S | S | S | S | S | S | n |
| #345 | R | 03 | C | C | 04 | Fenoterol                                   | 5mg                 | Comprimido                     | Oral            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | n | S | n | n | n | n | n | S |
| #346 | R | 03 | C | C | 04 | Fenoterol                                   | 0.5mg/10ml          | Ampollas                       | IV              |                                                             | Tratamiento de las obstrucciones crónicas reversibles de las vías respiratorias, causadas por asma o bronquitis crónica. Tratamiento de las obstrucciones agudas reversibles de las vías respiratorias.                      | n | S | S | n | n | n | n | n |
| #347 | R | 03 | C | C | 02 | Salbutamol Sulfato                          | 4mg                 | Comprimido                     | Oral            | Agonistas selectivos de beta 2 adrenérgicos.                |                                                                                                                                                                                                                              | S | S | S | n | S | n | n | n |
| #348 | R | 03 | C | C | 02 | Salbutamol Sulfato                          | 2mg/5ml             | Jarabe, 120ml 180ml            | Oral            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #349 | R | 03 | C | C | 02 | Salbutamol Sulfato                          | 0.5%                | Solución nebulización, 20-30ml | Inhalación      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| #350 | R | 03 | C | C | 02 | Salbutamol base o sulfato (Libre de C.F.C.) | 100mcg/inh.         | Inhalador, frasco 200 dosis    | Inhalación      |                                                             | Tratamiento broncodilatador, por inhalación en equipos de nebulización, de condiciones asociadas a obstrucción reversible de las vías aéreas (asma, enfisema, bronquitis crónica, etc.).                                     | S | S | S | S | S | S | S | S |
| #351 | R | 03 | D |   |    | Otros antiastmáticos para uso sistémico:    |                     |                                |                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | S | S | n | S | S | n | S | S |

[illegible]

-24/67-

| #    | R | O6 | A | 02 | Antihistamínicos para uso sistémico:               | 25mg          | Capsula              | Oral  | Eteres aminoalquiloicos | Tratamiento sintomático temporal de varias condiciones alérgicas. Tratamiento y prevención del mareo por movimiento y del vértigo; tratamiento de las reacciones extrapiramidales del Parkinsonismo y de fármacos inductores de éstas. Supresor de la tos. Hipnótico y sedante. | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
|------|---|----|---|----|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|
| #574 | R | O6 | A | 02 | Difenhidramina                                     | 10-12.5mg/5ml | Jarabe, frasco 120ml | Oral  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #575 | R | O6 | A | 02 |                                                    |               |                      | Oral  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #576 | R | O6 | A | 02 |                                                    |               |                      | Oral  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #577 | R | O6 | A | 02 |                                                    |               |                      | IM IV |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #578 | R | O6 | A | 02 | Dimetindolato                                      | 50mg          | Comprimido           | Oral  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #579 | R | O6 | A | 02 |                                                    | 10mg/ml       | Ampolla 5ml          | IM IV |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #580 | R | O6 | A | 04 | Antipirético libre de aspirina con antihistamínico |               | Goles, 10-40ml       | Oral  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #581 | R | O6 | A | 04 | Clorfeniramina                                     | 2-2.5mg/5ml   | Jarabe, frasco 120ml | Oral  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #582 | R | O6 | A | 04 | Clorfeniramina (clorfenamina)                      | 4mg           | Comprimido           | Oral  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #583 | R | O6 | A | 04 | Clorfeniramina maleato                             | 10mg/ml       | Ampolla 1ml          | IM IV |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #584 | R | O6 | A | 02 | Prometazina                                        | 25mg/ml       | Ampollas             | IM    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #585 | R | O6 | A | 02 |                                                    |               |                      | Oral  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #586 | R | O6 | A | 01 | Alimemazina Tartrato                               | 25mg          | Ampolla 5ml          | IM IV |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #587 | R | O6 | A | 07 | Antihistamínico de segunda generación:             |               |                      |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #588 | R | O6 | A | 07 | Cetirizina o                                       | 10mg          | Capsula comprimido   | Oral  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |
| #589 | R | O6 | A | 26 | Fexofenadina                                       | 120mg         | Capsula comprimido   | Oral  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ | n | \$ | n | \$ | n | \$ | n |

| #990  | R                        | 06 | A | X | 13 | Loratadina                                                 | 10mg        | Cápsula - comprimido               | Oral         | Otros antihistamínicos de uso sistémico | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
|-------|--------------------------|----|---|---|----|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| #991  | R                        | 06 | A | X | 02 | Ciproheptadina                                             | 4mg         | Comprimido                         | Oral         |                                         | Tratamiento de la espasmo vascular.                                                                                       |   |   |   |   |   |   |
| #992  | R                        | 07 |   |   |    | Otros productos del sistema respiratorio:                  |             |                                    |              |                                         |                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #993  | R                        | 07 | A |   |    | Surfactante pulmonar:                                      |             |                                    |              | Surfactantes pulmonares.                | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #994  | R                        | 07 | A | A | 01 | Surfactante pulmonar: Colfosceril palmitato o fosfolípidos | 100 a 240mg | Vial                               | Endotraqueal |                                         | Prevención y tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria aguda (enfermedad de la membrana hialina) en prematuros. |   |   |   |   |   |   |
| #995  | ORGANOS DE LOS SENTIDOS: |    |   |   |    |                                                            |             |                                    |              |                                         |                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #996  | S                        |    |   |   |    | Oftalmológicos:                                            |             |                                    |              |                                         |                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #997  | S                        | 01 |   |   |    | Antinfeciosos:                                             |             |                                    |              |                                         |                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #998  | S                        | 01 | A |   |    |                                                            | 1%          | Unguento oftálmico tubo 3-5g       | Oftálmico    |                                         | Tratamiento tópico de infecciones de los ojos por gérmenes susceptibles.                                                  |   |   |   |   |   |   |
| #999  | S                        | 01 | A | A | 01 | Cloranfenicol                                              |             | Gotas oftálmicas frasco 5-15ml     | Oftálmico    | Antibióticos.                           | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #1000 |                          |    |   |   |    |                                                            | 0.5%        |                                    |              |                                         | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #1001 | S                        | 01 | A | A | 11 | Gentamicina sulfato                                        | 0.3%        | Unguento oftálmico tubo 3-5g       | Oftálmico    |                                         | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #1002 |                          |    |   |   |    |                                                            | 0.3%        | Gotas oftálmicas 5-15ml            | Oftálmico    |                                         | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #1003 | S                        | 01 | A | B | 04 | Sulfacetamida sódica                                       | 10%         | Solución oftálmica 5-15ml          | Oftálmico    | Sulfonamidas.                           | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #1004 | S                        | 01 | A | D | 03 | Aciclovir                                                  | 3%          | Unguento oftálmico tubo 3-5g       | Oftálmico    | Antiviral.                              | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #1005 | S                        | 01 | B |   |    | Agentes antiinflamatorios:                                 |             |                                    |              |                                         |                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #1006 | S                        | 01 | B | A | 04 | Prednisolona acetato                                       | 1%          | Gotas oftálmicas frasco 5-15ml     | Oftálmico    | Corticosteroides solos.                 | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #1007 | S                        | 01 | B | C |    | Agentes antiinflamatorios oftálmicos, no esteroides:       |             |                                    |              |                                         |                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| #1008 | S                        | 01 | B | C | 03 | Diclofenaco o                                              | 0.10%       | Gotas oftálmicas frasco 2.5 a 10ml | Oftálmico    | Antinflamatorios esteroides.            | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #1009 | S                        | 01 | B | C | 04 | Flurbiprofen o                                             | 0.03%       |                                    |              |                                         | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #1010 | S                        | 01 | B | C | 00 | Suprofen                                                   | 1%          |                                    |              |                                         | S                                                                                                                         | n | n | n | n | n | n |
| #1011 | S                        | 01 | C | A |    | Corticosteroides Oftálmicos y Antibióticos en combinación: |             |                                    |              |                                         |                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |



-24/70-

|       |   |   |    |   |   |    |  |                                                               |      |                                   |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|----|---|---|----|--|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1029 | S | S | 01 | E | D | 01 |  | Timolol maleato o, 0.5%                                       |      | Gotas oftálmicas, frasco 5-15ml   | Oftálmico | Agentes beta bloqueantes.                              | Tratamiento reductor de la presión intraocular en pacientes con glaucoma.                                                                                                                           | S | S | S | n | n | S | n | S |
| #1030 | S | S | 01 | E | D | 02 |  | Betaxolol clorhidrato o, 0.5%                                 |      |                                   |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                     | S | S | S | n | n | S | n | S |
| #1031 | S | S | 01 | E | D | 03 |  | Levobunolol clorhidrato 0.5%                                  |      |                                   |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                     | S | S | S | n | n | S | n | S |
| #1032 | S | S | 01 | E | D | 00 |  | Preparaciones antiglaucoma y mióticos. Parasympatolomiméticos |      |                                   |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                     | S | S | S | n | n | n | n | n |
| #1033 | S | S | 01 | E | B | 09 |  | Acetilcolina cloruro, 1:100                                   |      | Frasco de 1.5-2ml                 | Oftálmico | Parasympatolomimético de acción rápida.                | Coadyuvante en las cirugías del segmento anterior del ojo.                                                                                                                                          | S | S | S | n | n | n | n | n |
| #1034 | S | S | 01 | E | D | 02 |  | Carbachol 0.01%                                               |      |                                   |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                     | S | S | S | n | n | n | n | n |
| #1035 | S | S | 01 | E | X | 03 |  | Latanoprost                                                   |      | Gotas oftálmicas, 50mg/ml, 2.5ml  | Oftálmico |                                                        | Tratamiento de glaucoma de ángulo abierto e hipertensión ocular en pacientes que no responden a otros fármacos. Puede cambiar el color de los ojos                                                  | S | S | S | n | n | n | n | n |
| #1036 | S | S | 01 | F |   |    |  | Mídráticos y cicloplégicos:                                   |      |                                   |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                     | S | S | S | n | n | n | n | S |
| #1037 | S | S | 01 | F | A | 01 |  | Atropina sulfato                                              | 1%   | Solución oftálmica, 5-10ml        | Oftálmico | Anticolinérgico.                                       | Mídrático (dilatación de la pupila) y cicloplégico (bloqueador de la acomodación ocular).                                                                                                           | S | S | S | n | n | n | n | S |
| #1038 | S | S | 01 | F | A | 04 |  | Ciclopirolato                                                 | 1%   | Solución oftálmica, frasco 5-15ml | Oftálmico |                                                        | Productor de dilatación de la pupila y bloqueo de los músculos de la acomodación durante los procedimientos oftalmoscópicos y en el diagnóstico de la refracción. Profilaxis de sinequia posterior. | S | S | S | n | n | n | n | S |
| #1039 | S | S | 01 | F | A | 06 |  | Tropicamida                                                   | 1%   | Solución oftálmica, frasco 15 ml  | Oftálmico | Anticolinérgico.                                       | Productor de dilatación de la pupila y bloqueo de los músculos de la acomodación durante los procedimientos oftalmoscópicos y en el diagnóstico de la refracción. Profilaxis de sinequia posterior. | S | S | S | n | n | n | n | S |
| #1040 | S | S | 01 | F | B | 01 |  | Fenilefrina                                                   | 10%  | Gotas oftálmicas, frasco 5-15ml   | Oftálmico | Sympatolomiméticos.                                    | Tratamiento del glaucoma de ángulo abierto en pacientes seleccionados. Como miádrático para el examen oftalmoscópico y durante cirugía.                                                             | S | S | S | n | n | n | n | S |
| #1041 | S | S | 01 | G |   |    |  | Descongestionantes y anti-alérgicos.                          |      |                                   |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                     | S | S | S | n | n | n | n | n |
| #1042 | S | S | 01 | G | A | 01 |  | Nafazolina clorhidrato                                        | 0.1% | Gotas oftálmicas, frasco 7-15ml   | Oftálmico | Sympatolomiméticos utilizados como descongestionantes. | Tratamiento descongestionante y vasoconstrictor en procesos inflamatorios oculares.                                                                                                                 | S | S | S | n | n | n | n | n |
| #1043 | S | S | 01 | G | X | 01 |  | Cromoglicato sódico                                           | 2%   | Gotas oftálmicas, frasco 5-10ml   | Oftálmico | Otros anti-alérgicos.                                  | Tratamiento profiláctico de los trastornos oculares alérgicos.                                                                                                                                      | S | S | S | n | n | n | n | n |

-2479-

|       |   |    |   |   |                           |                                                                                                      |              |                                                    |                  |                             |                                                                                                                    |    |    |    |   |   |   |   |
|-------|---|----|---|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|---|---|---|
| #1044 | S | 01 | H |   | Anestésicos locales.      |                                                                                                      |              |                                                    |                  |                             |                                                                                                                    |    |    |    |   |   |   |   |
| #1045 | S | 01 | H | A | Anestésico oftálmico      |                                                                                                      |              |                                                    |                  |                             |                                                                                                                    |    |    |    |   |   |   |   |
| #1046 | S | 01 | H | A | 04                        | Proximetacaina<br>(Proparacaina)<br>0.5%, o                                                          | 0.5%         | Solución oftálmica<br>10-15ml                      | Oftálmico        | Anestésicos locales         | Anestésico local superficial de uso oftalmológico.                                                                 |    |    |    |   |   |   |   |
| #1047 | S | 01 | H | A | 03                        | Tetracaina<br>(Amethocaina)                                                                          | 0.5%         |                                                    |                  |                             | \$                                                                                                                 | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #1048 | S | 01 | J |   | Agentes de diagnóstico.   |                                                                                                      |              |                                                    |                  |                             |                                                                                                                    |    |    |    |   |   |   |   |
| #1049 | S | 01 | J | A | 01                        | Fluoresceína sódica                                                                                  | 10%          | Ampolla o vial 5ml                                 | IV               | Agentes colorantes          | Indicado como agente de detección de úlcera corneal, del flujo sanguíneo retiniano y de la permeabilidad vascular. |    |    |    |   |   |   |   |
| #1050 |   |    |   |   |                           |                                                                                                      | 1.23% y PH25 | Gel, litro                                         |                  |                             | \$                                                                                                                 | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #1051 | S | 01 | K |   | Coadyuvantes quirúrgicos: |                                                                                                      |              |                                                    |                  |                             |                                                                                                                    |    |    |    |   |   |   |   |
| #1052 | S | 01 | K | A | 01                        | Coadyuvante Quirúrgicos, Sustancias Viscoselásticas                                                  |              |                                                    |                  |                             |                                                                                                                    |    |    |    |   |   |   |   |
| #1053 | S | 01 | K | A | 01                        | Hialuronato sódico<br>o,                                                                             | 10-30mg/ml   |                                                    |                  |                             | \$                                                                                                                 | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #1054 | S | 01 | K | A | 51                        | Condrolina sulfato 40mg/30mg<br>sódico/hialuronato<br>sódico                                         | 40mg/30mg    | Ampolla, o Jeringuilla<br>estéril, o Vial, 0.4-2ml | Uso intracocular | Substancias viscoelásticas. | Agente coadyuvante en los procedimientos quirúrgicos intraculares.                                                 |    |    |    |   |   |   |   |
| #1055 | S | 01 | X | A | 20                        | Lágrimas artificiales                                                                                | 0.3-1.4%     | Gotas oftálmicas, 15-20ml                          | Oftálmico        | Otros oftalmológicos.       | Déficit en la producción de lágrimas naturales (Ej. Síndrome de Sjögren en artritis reumatoidea.).                 |    |    |    |   |   |   |   |
| #1056 | S | 01 | X | A | 20                        | Lágrimas artificiales que contengan<br>polímeros de esteres de celulosa y<br>o, alcohol polivinílico | 0.3-1.4%     | Gotas oftálmicas, 15-20ml                          | Oftálmico        | Otros oftalmológicos.       | Déficit en la producción de lágrimas naturales (Ej. Síndrome de Sjögren en artritis reumatoidea.).                 |    |    |    |   |   |   |   |
| #1057 | S | 01 | X | A |                           | Solución salina balanceada estéril (uso intracocular)                                                |              |                                                    |                  |                             |                                                                                                                    |    |    |    |   |   |   |   |
| #1058 | S | 01 | X | A |                           | Sodio Cloruro                                                                                        | 0.64%        |                                                    |                  |                             | \$                                                                                                                 | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #1059 | S | 02 | X | A |                           | Potasio cloruro                                                                                      | 0.08%        |                                                    |                  |                             | \$                                                                                                                 | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #1060 | S | 03 | X | A |                           | Calcio dihidratado cloruro                                                                           | 0.05%        |                                                    |                  |                             | \$                                                                                                                 | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #1061 | S | 04 | X | A |                           | Magnesio hexahidrato cloruro                                                                         | 0.030%       |                                                    |                  |                             | \$                                                                                                                 | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |
| #1062 | S | 05 | X | A |                           | Sodio bitartrato acetato                                                                             | 0.39%        |                                                    |                  |                             | \$                                                                                                                 | \$ | \$ | \$ | n | n | n | n |



-24/72-

| #     | V | 03 | A | B | 14 | Proclama clorhidrato o sulfato           |                             | 10mg/ml, o 1,000 U/ml | IV          | Tratamiento neutralizante de los efectos de la heparina. |  |  |  |  |
|-------|---|----|---|---|----|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| #1081 | V | 03 | A | B | 13 | Reactivadores de la Acetilcolinesterasa: |                             |                       |             |                                                          |  |  |  |  |
| #1082 | V | 03 | A | B | 13 |                                          | Obidoxima o,                | 250mg/ml              |             |                                                          |  |  |  |  |
| #1083 | V | 03 | A | B | 13 |                                          | Pralidoxima Metilsulfato o, | 20mg/ml               |             |                                                          |  |  |  |  |
| #1084 | V | 03 | A | B | 04 |                                          | Pralidoxima Cloruro         | 50mg/ml               |             |                                                          |  |  |  |  |
| #1085 | V | 03 | A | B | 04 |                                          |                             |                       |             |                                                          |  |  |  |  |
| #1086 | V | 07 | A | B |    | Agua estéril para inyectables            |                             | 2,000 ml              | Parenteral  |                                                          |  |  |  |  |
| #1087 |   |    |   |   |    |                                          |                             | 50-100ml              | Parenteral  |                                                          |  |  |  |  |
| #1088 | V | 03 | A | C | 01 | Deferoxamina mesitato                    |                             | Vial 10ml             | IM IV       | Agentes quelantes del hierro.                            |  |  |  |  |
| #1089 | V | 03 | A | F | 01 | Mesna                                    |                             | 100mg/ml              | IV          | Agente desintoxicante en tratamiento citostático.        |  |  |  |  |
| #1090 | V | 03 | A | E | 01 | Polistireno sulfonato                    |                             | x                     | Oral Rectal | Fármacos para el tratamiento de la hipercalemia.         |  |  |  |  |
| #1091 | V | 04 | C | X | 00 | Etodrono cloruro                         |                             | 10mg/ml               | IV          | Otros agentes                                            |  |  |  |  |

24/1/74

LISTA CORRESPONDIENTE A LOS RENGLONES DE MEDICAMENTOS EN ORDEN ALFABÉTICO

| PRINCIPIO ACTIVO |      |   |     |   |                                   |                                                                     |  |  |  | CONCENTRACIÓN                         | PRESENTACIÓN                                                                     | VIA        | CSS | MINSAL | H.S.O. Tomás | ION | H. Psiquiátrico | H. Estomatológico | H. de N. |
|------------------|------|---|-----|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--------------|-----|-----------------|-------------------|----------|
|                  |      |   |     |   |                                   |                                                                     |  |  |  |                                       |                                                                                  |            |     |        |              |     |                 |                   |          |
| n°1              | n1s  | S | 01E | C | 01                                | Acetazolamida                                                       |  |  |  | 250mg                                 | Comprimido                                                                       | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°2              | n2s  | S | 01E | C | 01                                | Acetazolamida sódica                                                |  |  |  | Equivalente a 500mg de Ampolla o vial | Ampolla o vial                                                                   | IM IV      | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°3              | n3s  | B | 01A | C | 06                                | Acetil Salicílico ácido                                             |  |  |  | 75-100mg                              | Comprimido                                                                       | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°4              | n4s  | N | 02B | A | 01                                | Acetil Salicílico ácido                                             |  |  |  | 300-325mg                             | Comprimido con capa entérica                                                     | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°6              | n6s  | S | 01A | D | 03                                | Acidobiv                                                            |  |  |  | 3%                                    | Unguento oftálmico, tubo 3.5g                                                    | Oftálmico  | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°7              | n7s  | J | 05A | B | 01                                | Acidobiv                                                            |  |  |  | 200mg                                 | Cápsula o comprimido                                                             | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°8              | n8s  | J | 05A | B | 01                                | Acidobiv                                                            |  |  |  | 400mg                                 | Cápsula o comprimido                                                             | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°9              | n9s  | J | 05A | B | 01                                | Acidobiv                                                            |  |  |  | 25mg/ml                               | Ampolla o vial, 10ml                                                             | IV         | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°10             | n10s | C | 01E | B | 10                                | Adenosina fosfato                                                   |  |  |  | 3mg/ml                                | Ampolla 2ml                                                                      | IV         | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°11             | n11s | R | 03C | A | 01                                | Adrenalina cloruro                                                  |  |  |  | 1:1000 (1mg/ml)                       | Ampolla 1ml                                                                      | SC         | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°12             | n12s | S | 01E | D | 01                                | Agentes anti-glaucoma: agentes betabloqueadores                     |  |  |  | 0.5%                                  | Gotas oftálmicas, frasco 5-15ml                                                  | Oftálmico  | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°13             | n13s | S | 01E | D | 02                                | Timolol maleato o, Betaxolol clorhidrato o, Levobunolol clorhidrato |  |  |  | 0.5%                                  | Gotas oftálmicas, frasco 5-15ml                                                  | Oftálmico  | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°14             | n14s | S | 01E | D | 03                                | Agentes anti-inflamatorios oftálmicos. No-esteroides:               |  |  |  | 0.10%                                 | Gotas oftálmicas, frasco 2.5 a 10ml                                              | Oftálmico  | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°15             | n15s | S | 01B | C | 03                                | Diclofenaco o                                                       |  |  |  | 0.03%                                 | Gotas oftálmicas, frasco 2.5 a 10ml                                              | Oftálmico  | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°16             | n16s | S | 01B | C | 04                                | Flurbiprofen o                                                      |  |  |  | 1%                                    | Gotas oftálmicas, frasco 2.5 a 10ml                                              | Oftálmico  | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°17             | n17s | S | 01B | C | 00                                | Suprofen                                                            |  |  |  |                                       | 2,000 ml                                                                         | Parenteral | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°18             | n18s | V | 07A | B | 00                                | Agua estéril para inyectables                                       |  |  |  |                                       | 50-100ml                                                                         | Parenteral | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°19             | n19s | V | 08A | B | 00                                | Agua estéril para inyectables                                       |  |  |  |                                       | Comprimido                                                                       | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°20             | n20s | P | 02C | A | 03                                | Albendazol                                                          |  |  |  | 200mg                                 | Suspensión                                                                       | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°21             | n21s | P | 03C | A | 04                                | Albendazol                                                          |  |  |  | 40mg/ml                               | Frasco venoclisis, con equipo adaptable IV desechable para infusión intravenosa. | IV         | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°22             | n22s | B | 05A | A | 01                                | Albumina Humana pobre en sodio                                      |  |  |  | 20 - 25%                              |                                                                                  |            | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°23             | n23s | M | 03A | A | 01                                | Alcorno (Alfortoxifema)                                             |  |  |  | 10mg/ml                               | Ampolla 2ml                                                                      | IV         | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°24             | n24s | L | 03A | A | 01                                | Alcorno (Alfortoxifema)                                             |  |  |  | 18 millones UI                        | Vial                                                                             | IM IV SC   | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°25             | n25s | A | 11C | C | 03                                | Alfacalcidol                                                        |  |  |  | 0.25ug                                | Cápsula                                                                          | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°26             | n26s | R | 06A | D | 01                                | Alfemazina Tartrato                                                 |  |  |  | 25mg                                  | Ampolla 5ml                                                                      | IM IV      | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°27             | n27s | M | 04A | A | 01                                | Alprazolam                                                          |  |  |  | 300mg                                 | Comprimido                                                                       | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°28             | n28s | M | 04A | A | 01                                | Alprazolam                                                          |  |  |  | 100mg                                 | Comprimido                                                                       | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°29             | n29s | N | 05B | A | 12                                | Alprazolam                                                          |  |  |  | 0.5mg                                 | Comprimido                                                                       | Oral       | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°30             | n30s | D | 05A | 0 | Alquitran de Hulla con corticoide |                                                                     |  |  |  | 10% 0.25%                             | Crema, tubo 30g                                                                  | Tópico     | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°31             | n31s | D | 11A | A | 00                                | Aluminio acetato                                                    |  |  |  | 5.9%                                  | Loción, frasco 120ml                                                             | Tópico     | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°32             | n32s | D | 11A | A | 00                                | Aluminio acetato                                                    |  |  |  | 5%                                    | Crema, tubo 30g                                                                  | Tópico     | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°33             | n33s | D | 11A | A | 00                                | Aluminio acetato                                                    |  |  |  | X                                     | Pólvora, sobre de 2.2g                                                           | Tópico     | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°34             | n34s | S | 02A | A | 30                                | Aluminio acetato con Ácido ascórbico                                |  |  |  | 10% 2%                                | Solución dilta, frasco gotero 60ml                                               | Oftico     | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |
| n°35             | n35s | S | 02A | A | 30                                | Aluminio acetato con Ácido ascórbico                                |  |  |  |                                       |                                                                                  |            | S   | S      | S            | S   | S               | S                 | S        |

[illegible]



24/77

|       |        |            |                                                                       |  | PRINCIPIO ACTIVO           |  |  |  | CONCENTRACIÓN | PRESENTACIÓN                                                | VIA    | CSS | MINSAL | ION | H. Psiquiátrico | H. del N |
|-------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|-----------------|----------|
| n°108 | n115 s | C 05A X 03 | Antihemorroidal con corticoide y anestésico local                     |  |                            |  |  |  |               | Crema, jalea, pomada o unguento, tubo con aplicador, 10-30g | Topico | s   | s      | s   | s               | n        |
| n°109 | n116 s | C 05A X 03 | Antihemorroidal con corticoide y anestésico local                     |  |                            |  |  |  |               |                                                             |        |     |        |     |                 |          |
| n°110 | n117 s | C 05A X 03 |                                                                       |  | Prednisona caproato        |  |  |  | 1,3mg         | Supositorio                                                 | Topico | n   | n      | n   | s               | n        |
| n°111 | n118 s | C 05A X 03 |                                                                       |  | Cincocaina                 |  |  |  | 1mg           | Supositorio                                                 | Topico | n   | n      | n   | s               | n        |
| n°112 | n119 s | R 01B A 51 | Antihistaminico con descongestionante nasal liquido:                  |  |                            |  |  |  |               |                                                             |        |     |        |     |                 |          |
| n°113 | n120 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Antihistaminico            |  |  |  |               |                                                             |        |     |        |     |                 |          |
| n°114 | n121 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Bromfeniramina o           |  |  |  | 2mg/5ml       | Liquido, frasco 60-90ml                                     | Oral   | s   | s      | n   | n               | s        |
| n°115 | n122 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Carbinoxamita o            |  |  |  | 4mg/5ml       | Liquido, frasco 60-90ml                                     | Oral   | s   | s      | n   | n               | s        |
| n°116 | n123 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Clorfeniramina o           |  |  |  | 2mg/5ml       | Liquido, frasco 60-90ml                                     | Oral   | s   | s      | n   | n               | s        |
| n°117 | n124 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Dexbromfeniramina o        |  |  |  | 1,5mg/5ml     | Liquido, frasco 60-90ml                                     | Oral   | s   | s      | n   | n               | s        |
| n°118 | n125 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Tripolidina                |  |  |  | 1,25mg/5ml    | Liquido, frasco 60-90ml                                     | Oral   | s   | s      | n   | n               | s        |
| n°119 | n126 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Descongestionante:         |  |  |  |               |                                                             |        |     |        |     |                 |          |
| n°120 | n127 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Fenilefrina o              |  |  |  | 5mg/5ml       |                                                             | Oral   | s   | s      | n   | n               | s        |
| n°121 | n128 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Fenilpropanolamina o       |  |  |  | 12,5mg/5ml    |                                                             | Oral   | s   | s      | n   | n               | s        |
| n°122 | n129 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Pseudoefedrina             |  |  |  | 30mg/5ml      |                                                             | Oral   | s   | s      | n   | n               | s        |
| n°123 | n130 s | R 01B A 51 | Antihistaminico con descongestionante nasal A.C.                      |  |                            |  |  |  |               |                                                             |        |     |        |     |                 |          |
| n°124 | n131 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Antihistaminico            |  |  |  |               |                                                             |        |     |        |     |                 |          |
| n°125 | n132 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Bromfeniramina o           |  |  |  | 4mg           | Capsula o comprimido                                        | Oral   | s   | s      | s   | n               | n        |
| n°126 | n133 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Carbinoxamita o            |  |  |  | 4mg           | Capsula o comprimido                                        | Oral   | s   | s      | s   | n               | n        |
| n°127 | n134 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Clorfeniramina o           |  |  |  | 4mg           | Capsula o comprimido                                        | Oral   | s   | s      | s   | n               | n        |
| n°128 | n135 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Tripolidina                |  |  |  | 2,5mg         | Capsula o comprimido                                        | Oral   | s   | s      | s   | n               | n        |
| n°129 | n136 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Descongestionante:         |  |  |  |               |                                                             |        |     |        |     |                 |          |
| n°130 | n137 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Fenilefrina o              |  |  |  | 20mg          | Capsula o comprimido                                        | Oral   | s   | s      | s   | n               | n        |
| n°131 | n138 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Fenilpropanolamina o       |  |  |  | 25mg          | Capsula o comprimido                                        | Oral   | s   | s      | s   | n               | n        |
| n°132 | n139 s | R 01B A 51 |                                                                       |  | Pseudoefedrina             |  |  |  | 60mg          | Capsula o comprimido                                        | Oral   | s   | s      | s   | n               | n        |
| n°133 | n140 s | R 06A 0 00 | Antihistaminico de segunda generacion:                                |  |                            |  |  |  |               |                                                             |        |     |        |     |                 |          |
| n°134 | n141 s | R 06A E 07 |                                                                       |  | Cetirizina o               |  |  |  | 10mg          | Capsula o comprimido                                        | Oral   | s   | n      | s   | n               | n        |
| n°135 | n142 s | R 06A X 26 |                                                                       |  | Fexofenadina               |  |  |  | 10mg          | Capsula o comprimido                                        | Oral   | s   | n      | s   | s               | s        |
| n°136 | n143 s | P 01C B 00 | Antirreumaticos peritavalentes:                                       |  | Loratadina                 |  |  |  | 10mg          | Capsula o comprimido                                        | Oral   | s   | n      | s   | n               | n        |
| n°137 | n144 s | P 01C B 01 |                                                                       |  | Meglumina antimonio o,     |  |  |  | 300mg/ml      | Ampolla 5ml                                                 | IM     | n   | s      | n   | n               | n        |
| n°138 | n145 s | P 01C 0 02 |                                                                       |  | Estiboglucuronato de sodio |  |  |  | 300mg/ml      | Ampolla 5ml                                                 | IM IV  | s   | s      | n   | n               | n        |
| n°139 | n146 s | N 04B A 02 | Antiparkinsonianos dopaminergicos:                                    |  |                            |  |  |  |               |                                                             |        |     |        |     |                 |          |
| n°140 | n147 s | N 04B A 02 |                                                                       |  | Levodopa con carbidopa, o  |  |  |  | 250mg/25mg    | Comprimido                                                  | Oral   | s   | s      | n   | s               | s        |
| n°141 | n148 s | N 04B A 02 |                                                                       |  | Levodopa con benserazide   |  |  |  | 200mg/50mg    | Comprimido                                                  | Oral   | s   | s      | n   | s               | s        |
| n°142 | n149 s | R 06A B 04 | Antipirético libre de aspirina con antihistaminico                    |  |                            |  |  |  |               | Gotas, 10-40ml                                              | Oral   | n   | s      | n   | n               | n        |
| n°143 | n150 s | R 05D A 20 | Antitussivo de acción central, derivados opiáceos con antihistaminico |  |                            |  |  |  |               |                                                             |        |     |        |     |                 |          |
| n°144 | n151 s | R 05D A 04 |                                                                       |  | Codena o,                  |  |  |  | 10-20mg/5ml / | Frasco 90-120ml                                             | Oral   | s   | s      | s   | n               | s        |
| n°145 | n152 s | R 05D A 03 |                                                                       |  | Hidrocodona                |  |  |  | 5-10mg/5ml    | Frasco 90-120ml                                             | Oral   | s   | s      | n   | s               | n        |

|       |   | A/T | C         | PRINCIPIO ACTIVO                                   | CONCENTRACIÓN            | PRESENTACIÓN                   | VIA                      | MINSA | H.S.T.O. Tomis | ION | H.P. Psiquiatrico | H.L. Estancia |
|-------|---|-----|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|----------------|-----|-------------------|---------------|
| n°142 | I | R   | 05 D A 20 |                                                    | Antihistaminico          | Frasco 90-120ml                | Oral                     | \$    | n              | s   | n                 | \$            |
| n°143 |   | A   | 11 G A 01 | Ácido(Vitamina C)                                  | 500mg                    | Comprimido efervescente        | Oral                     | \$    | s              | \$  | \$                | \$            |
| n°144 |   | L   | 01 X X 02 | Asparagina                                         | 10,000 UI                | Ampolla o vial                 | IV                       | \$    | s              | n   | s                 | \$            |
| n°145 |   | C   | 07 A B 03 | Atenolol                                           | 100mg                    | Comprimido ramurado            | Oral                     | \$    | s              | \$  | \$                | \$            |
| n°146 |   | C   | 10 A A 05 | Allopatina                                         | 10mg                     | Comprimido                     | Oral                     | n     | n              | n   | n                 | n             |
| n°147 |   | M   | 03 A C 04 | Atacuro besilato                                   | 10mg/ml                  | Comprimido                     | IV                       | s     | s              | s   | s                 | n             |
| n°148 |   | S   | 01 F A 01 | Atropina sulfato                                   | 1%                       | Solución oftálmica, 5-10ml     | Oftalmico                | s     | s              | s   | n                 | \$            |
| n°149 |   | A   | 03 B A 01 | Atropina sulfato                                   | 1mg/ml                   | Ampolla 1ml                    | IM IV SC                 | \$    | s              | \$  | \$                | n             |
| n°150 |   | M   | 01 C B 01 | Aurotiomolato sodico                               | 50mg/ml                  | Ampolla 1ml                    | IM                       | \$    | n              | n   | n                 | n             |
| n°151 |   | L   | 04 A X 01 | Azatioprina                                        | 50mg                     | Comprimido                     | Oral                     | \$    | n              | n   | n                 | n             |
| n°152 |   | J   | 01 F A 10 | Aztromicina                                        | 10mg                     | Comprimido                     | Oral                     | \$    | n              | n   | n                 | n             |
| n°153 |   | L   | 04 A A 09 | Bacilimab                                          | 20mg                     | Ampolla o vial                 | IV                       | \$    | n              | n   | n                 | n             |
| n°154 |   | R   | 01 A D 01 | Becmetasona dipropionato                           | 0.8mg/ml                 | Solución, inhalador, 200 dosis | Oral                     | \$    | s              | n   | s                 | \$            |
| n°155 |   | P   | 03 A X 01 | Bencilo benzoato                                   | 25%                      | Loción                         | Tópico                   | \$    | s              | s   | s                 | \$            |
| n°156 |   | J   | 01 C E 08 | Bencilpenicilina benzatínica                       | 2,400,000 UI             | Vial                           | IM                       | \$    | s              | s   | s                 | \$            |
| n°157 |   | J   | 01 C E 09 | Bencilpenicilina procainica                        | 4.4 millones U.I.        | Vial                           | IM                       | \$    | s              | s   | n                 | \$            |
| n°158 |   | J   | 01 C E 09 | Bencilpenicilina cristalina sódica o potásica      | 600,000 - 800,000 UI     | Vial                           | IM                       | \$    | s              | n   | s                 | n             |
| n°159 |   | J   | 01 C E 01 | Bencilpenicilina sódica                            | 1,000,000 UI             | Vial                           | IV                       | \$    | s              | n   | s                 | n             |
| n°160 |   | D   | 10 A E 01 | Benzolol peróxido                                  | 10,000,000 UI            | Vial                           | IV                       | \$    | s              | n   | n                 | n             |
| n°161 |   | D   | 10 A E 01 | Benzolol peróxido                                  | 5%                       | Gel, tubo 40-50g               | Tópico                   | \$    | s              | n   | n                 | n             |
| n°162 |   | H   | 02 A B 01 | Belametasona fosfato                               | 4mg/ml                   | Ampolla 1ml                    | IM IV                    | \$    | n              | n   | n                 | n             |
| n°163 |   | D   | 07 A C 01 | Belametasona fosfato                               | 0.1%                     | Loción capilar, Frasco 20ml    | Tópico                   | \$    | n              | n   | n                 | n             |
| n°164 |   | N   | 04 A A 02 | Biperideno clorhidrato                             | 4mg                      | Comprimido CR                  | Oral                     | \$    | n              | n   | s                 | n             |
| n°165 |   | N   | 04 A A 02 | Biperideno clorhidrato                             | 2mg                      | Comprimido                     | Oral                     | \$    | s              | s   | s                 | n             |
| n°166 |   | N   | 04 A A 02 | Biperideno clorhidrato                             | 5mg/ml                   | Ampolla 1ml                    | IM IV                    | \$    | s              | s   | s                 | n             |
| n°167 |   | N   | 04 A A 02 | Biperideno lactado                                 | 2mg/ml                   | Ampollas                       | IM                       | \$    | n              | n   | n                 | n             |
| n°168 |   | L   | 01 D C 01 | Bleomicina sulfato                                 | 15 Unidades              | Ampolla o vial                 | Parenteral intratestinal | e     | n              | s   | s                 | n             |
| n°169 | t | C   | 02 C A 00 | Bloqueadores de los receptores Alfa 1 adrenérgicos |                          |                                | Oral                     | \$    | n              | n   | s                 | n             |
| n°170 | t | C   | 02 C A 05 | Terazosina o,                                      | 2mg                      | Capsula o comprimido           | Oral                     | \$    | n              | s   | n                 | n             |
| n°171 | t | C   | 02 C A 04 | Doxazosina                                         | 2mg                      | Capsula o comprimido           | Oral                     | \$    | n              | n   | s                 | n             |
| n°172 | s | N   | 05 B A 08 | Bromazepam                                         | 3mg                      | Comprimido                     | Oral                     | \$    | n              | n   | n                 | n             |
| n°173 | s | R   | 05 C B 02 | Bromhexina con codeína                             | 4mg/5mg/5ml <sup>1</sup> | Jarabe                         | Oral                     | \$    | n              | n   | s                 | n             |
| n°174 | s | N   | 04 B C 01 | Bumetánida                                         | 2.5mg                    | Comprimido                     | Oral                     | \$    | s              | s   | n                 | n             |
| n°175 | s | C   | 03 C A 02 | Bumetánida                                         | 0.5mg/ml                 | Ampolla 4ml                    | IM IV                    | \$    | n              | s   | n                 | n             |
| n°176 | s | N   | 01 B B 51 | Bupivacaína clorhidrato                            | 0.75%                    | Vial 10-30ml                   | Parenteral               | \$    | s              | n   | n                 | n             |
| n°177 | s | N   | 01 B B 51 | Bupivacaína clorhidrato                            | 0.5%                     | Vial 20-50ml                   | Parenteral               | \$    | s              | s   | n                 | n             |

|          | A.T.C.  | PRINCIPIO ACTIVO                                      | CONCENTRACIÓN                            | PRESENTACIÓN                                      | VIA    | CSS | MINSU | H.S.to Tomas | H.P.squibético | H.de N |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----|-------|--------------|----------------|--------|
| n°176    | n°89 s  | N°07 B A 02 Bupropion (Amfebutamona)                  | 150mg                                    | Comprimido                                        | Oral   |     |       |              |                | n      |
| n°177 EX | n°190 s | L°01 A B 01 Busulfano                                 | 2mg                                      | Comprimido                                        | Oral   |     |       |              |                | n      |
| n°178    | n°191 s | D°02 A B 00 Calamina                                  | 8%                                       | Loción                                            | Tópico |     |       |              |                | n      |
| n°179    | n°192 s | A°12 A A 03 Calcio                                    | 0.5-1g de calcio elemental<br>por unidad | Comprimido                                        | Oral   |     |       |              |                | s      |
| n°180 EX | n°193 s | A°12 A A 03 Calcio                                    | 300-400mg de calcio elemental/15ml       | Líquido 200ml                                     | Oral   |     |       |              |                | s      |
| n°181    | n°194 s | A°12 A A 03 Calcio gluconato                          | 10%                                      | Ampolla 10 ml                                     | IV     |     |       |              |                | s      |
| n°182    | n°195 s | H°05 B A 01 Calcitonina                               | 100 U/ml                                 | Ampolla 1ml                                       | IM SC  |     |       |              |                | s      |
| n°183    | n°196 s | L°01 B C 06 Capacetabine                              | 500mg                                    | Comprimido                                        | Oral   |     |       |              |                | n      |
| n°184    | n°197 s | C°00 A A 01 Clapopril                                 | 25mg                                     | Capsula o comprimido                              | Oral   |     |       |              |                | n      |
| n°185    | n°198 s | N°03 A F 01 Carbamazepina                             | 200mg                                    | Comprimido                                        | Oral   |     |       |              |                | s      |
| n°186    | n°199 s | N°03 A F 01 Carbamazepina                             | 400mg CR                                 | Comprimido                                        | Oral   |     |       |              |                | s      |
| n°187    | n°200 s | N°03 A F 01 Carbamazepina                             | 100mg/5ml                                | Suspensión 100ml                                  | Oral   |     |       |              |                | s      |
| n°188 EX | n°201 s | A°07 B A 01 Carbon activado                           | USP                                      | Pólvora                                           | Oral   |     |       |              |                | n      |
| n°189    | n°202 s | L°01 X A 02 Carbolialino                              | 150mg                                    | Vial                                              | IV     |     |       |              |                | n      |
| n°190    | n°203 s | L°01 A D 01 Carmustina                                | 100mg                                    | Ampolla o vial con diluyente                      | IV     |     |       |              |                | n      |
| n°191    | n°204 s | C°07 A G 02 Carvedilol                                | 6.25mg                                   | Comprimido                                        | Oral   |     |       |              |                | n      |
| n°192    | n°205 s | J°02 A X 04 Caspolungina                              | 50mg                                     | Vial                                              | IV     |     |       |              |                | n      |
| n°193    | n°206 s | J°02 A X 04 Caspolungina                              | 70mg                                     | Vial                                              | IV     |     |       |              |                | n      |
| n°194    | n°207 s | A°06 A B 05 Caslor Aceite (Ricino Aceite)             | 36.40%                                   | Frasco 60ml                                       | Oral   |     |       |              |                | n      |
| n°195    | n°208 s | J°01-D A 01 Cetálexina                                | 500mg                                    | Capsula o comprimido                              | Oral   |     |       |              |                | n      |
| n°196    | n°209 s | J°01-D A 01 Cetálexina                                | 250mg/5ml                                | Gránulo o polvo para suspensión o Jarabe 80/100ml | Oral   |     |       |              |                | s      |
| n°197    | n°210 s | J°01-D A 00 Cefalosporinas de IV generación:          |                                          |                                                   |        |     |       |              |                |        |
| n°198    | n°211 s | J°01-D A 24 Celceprime o,                             | 1g                                       | Vial                                              | IV     |     |       |              |                | s      |
| n°199    | n°212 s | J°01-D A 37 Celpiroma                                 | 1g                                       | Vial                                              | IV     |     |       |              |                | n      |
| n°200    | n°213 s | J°01-D A 00 Cefalosporinas y sustancias relacionadas: |                                          |                                                   |        |     |       |              |                |        |
| n°201    | n°214 s | J°01-D A 03 Cefalotina sódica o,                      | 1g                                       | Ampolla o vial                                    | IV     |     |       |              |                | n      |
| n°202    | n°215 s | J°01-D A 04 Cefazolina                                | 1g                                       | Ampolla o vial                                    | IV     |     |       |              |                | n      |
| n°203    | n°216 s | J°01-D A 03 Cefotaxima                                | 1g                                       | Ampolla o vial                                    | IV     |     |       |              |                | s      |
| n°204    | n°217 s | J°01-D A 03 Cefotaxima                                | 1g                                       | Ampolla o vial                                    | IV     |     |       |              |                | n      |
| n°205    | n°218 s | J°01-D A 05 Cefoxitina sódica                         | 1g                                       | Ampolla o vial                                    | IV     |     |       |              |                | n      |
| n°206    | n°219 s | J°01-D A 11 Ceftriaxona                               | 1g                                       | Ampolla o vial                                    | IM IV  |     |       |              |                | s      |
| n°207    | n°220 s | J°01-D A 39 Cefixima                                  | 400mg                                    | Capsula                                           | Oral   |     |       |              |                | n      |
| n°208    | n°221 s | J°01-D A 63 Ceftriaxona sódica                        | 250mg                                    | Ampolla o vial                                    | IM     |     |       |              |                | n      |
| n°209    | n°222 s | J°01-D A 63 Ceftriaxona sódica                        | 1g                                       | Ampolla o vial                                    | IM IV  |     |       |              |                | s      |
| n°210    | n°223 s | J°01-D A 06 Cefuroxima                                | 750mg                                    | Vial                                              | IM IV  |     |       |              |                | n      |
| n°211    | n°224 s | J°01-D A 06 Cefuroxima                                | 125mg/5ml                                | Frasco 50ml                                       | Oral   |     |       |              |                | s      |
| n°212    | n°225 s | B°03 B A 01 Clonocobalamina                           | 1000mcg/ml                               | Ampolla 1ml                                       | IM     |     |       |              |                | s      |

661/72





-24/82-

|        |   |      |   |      | PRINCIPIO ACTIVO |                                                             |  |  |  | CONCENTRACIÓN      | PRESENTACIÓN                               | VIA                                                   | CSS | MINS | M. S. T. o. M. | NON | M. Psiquiátrico | H. Estancia |
|--------|---|------|---|------|------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------|----------------|-----|-----------------|-------------|
| n° 276 | I | n306 | S | D 07 | A A 02           |                                                             |  |  |  | 0.25-2.5%          | Crema, tubo 15-30g                         | Tópico                                                | S   | S    | n              | S   | S               | S           |
| n° 278 | I | n307 | S | D 07 | A A 02           | Hydrocortisona                                              |  |  |  |                    |                                            |                                                       | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 280 | I | n308 | S | D 07 | A C 11           | Amclonide o                                                 |  |  |  | 0.1%               | Crema, tubo 15g                            | Tópico                                                | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 281 | I | n309 | S | D 07 | A C 01           | Belametasona dipropionato o                                 |  |  |  | 0.05%              | Crema, tubo 15g                            | Tópico                                                | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 282 | I | n310 | S | D 07 | A C 04           | Fluocinolona acetonida o                                    |  |  |  | 0.2%               | Crema, tubo 15g                            | Tópico                                                | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 283 | I | n311 | S | D 07 | A D 02           | Halcinonida o                                               |  |  |  | 0.1%               | Crema, tubo 15g                            | Tópico                                                | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 284 | I | n312 | S | D 07 | A C 13           | Monetasona turoato                                          |  |  |  | 0.1%               | Crema, tubo 15g                            | Tópico                                                | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 285 | I | n313 | S | D 07 | A C 00           | Belametasona valerato                                       |  |  |  | 0.1%               | Loción capilar, 20-30ml                    | Tópico                                                | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 286 | I | n314 | S | D 07 | A C 01           | Clobetazol propionato                                       |  |  |  | 0.05%              | Crema, tubo 25g                            | Tópico                                                | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 287 | I | n315 | S | D 07 | A C 00           | Clotbetazol propionato                                      |  |  |  | 0.05%              | Crema, tubo 25g                            | Tópico                                                | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 288 | I | n316 | S | D 07 | A D 01           | Metilprednisolona acetato                                   |  |  |  | 40mg/ml            | Ampolla o vial 1ml                         | IM, IL, IM-ILs<br>(intra articular y tejidos blandos) | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 289 | I | n317 | S | H 02 | A B 04           | Triamcinolona acetato                                       |  |  |  | 40mg/ml            | Ampolla o vial 1ml                         | IM, IL, IM-ILs<br>(intra articular y tejidos blandos) | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 290 | I | n318 | S | H 02 | A B 08           | Triamcinolona acetato                                       |  |  |  | 40mg/ml            | Ampolla o vial 1ml                         | IM, IL, IM-ILs<br>(intra articular y tejidos blandos) | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 291 | I | n319 | S | H 02 | A B 08           | Triamcinolona acetato                                       |  |  |  | 40mg/ml            | Ampolla o vial 1ml                         | IM, IL, IM-ILs<br>(intra articular y tejidos blandos) | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 292 | I | n320 | S | H 02 | A B 08           | Triamcinolona acetato                                       |  |  |  | 40mg/ml            | Ampolla o vial 1ml                         | IM, IL, IM-ILs<br>(intra articular y tejidos blandos) | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 293 | I | n321 | S | H 02 | A B 00           | Corticoides para uso sistémico: Glucocorticoides            |  |  |  | 1-3mg/ml           | Suspensión 60-120ml                        | Oral                                                  | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 294 | I | n322 | S | H 02 | A B 07           | Prednisona o,                                               |  |  |  | 1-3mg/ml           | Suspensión 60-120ml                        | Oral                                                  | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 295 | I | n323 | S | H 02 | A B 06           | Prednisona                                                  |  |  |  | 2%                 | Gotas oftálmicas, frasco 5-10ml            | Oftálmico                                             | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 296 | I | n324 | S | S 01 | G X 01           | Cromoglicato sódico                                         |  |  |  | 4% pescolol        | Solución nasal, atomizador con dispositivo | Nasal                                                 | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 297 | I | n325 | S | R 01 | A C 01           | Cromoglicato sódico                                         |  |  |  | 0.8-1mg/inhalación | Aerosol, 200-250 dosis                     | Inhalación                                            | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 298 | I | n326 | S | R 03 | B C 01           | Cromoglicato sódico                                         |  |  |  | 200mg              | Vial 20ml                                  | IV                                                    | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 299 | I | n327 | S | L 01 | X X 13           | Decarbacina citrato                                         |  |  |  | 0.5mg              | Ampolla o vial 5-10ml                      | IV                                                    | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 300 | I | n328 | S | L 01 | D A 01           | Dactinomicina (Actinomicina D)                              |  |  |  | 200mg              | Capsula o comprimido                       | Oral                                                  | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 301 | I | n329 | S | G 03 | X A 01           | Danazol                                                     |  |  |  | 100mg              | Comprimido                                 | Oral                                                  | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 302 | I | n330 | S | J 04 | B A 02           | Dapsone                                                     |  |  |  | 50mg               | Comprimido                                 | Oral                                                  | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 303 | I | n331 | S | J 04 | B A 02           | Dapsone                                                     |  |  |  | 20mg               | Póvoro para reconstituir, Vial             | IV                                                    | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 304 | I | n332 | S | L 01 | d b 02           | Dauronitina                                                 |  |  |  | 500mg              | Vial 10ml                                  | IM IV                                                 | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 305 | I | n333 | S | V 03 | A C 01           | Deferoxamina mesilato                                       |  |  |  | 0.1mg/ml           | Solución nasal, 2.5ml                      | Nasal                                                 | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 306 | I | n334 | S | H 01 | B A 02           | Desmopresina                                                |  |  |  | 4mg                | Comprimido                                 | Oral                                                  | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 307 | I | n335 | S | H 02 | A B 02           | Dexametasona                                                |  |  |  | 0.5mg              | Comprimido                                 | Oral                                                  | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 308 | I | n336 | S | H 02 | A B 02           | Dexametasona                                                |  |  |  | 4mg/ml             | Ampolla o vial 2ml                         | IM IV                                                 | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 309 | I | n337 | S | R 05 | D A 09           | Dexametasona (esteroide sódico) libre de alcohol (benclíco) |  |  |  | 10mg/5ml           | Jarabe, frasco 120ml                       | Oral                                                  | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 310 | I | n338 | S | R 05 | D A 09           | Dexametasona (esteroide sódico) libre de alcohol (benclíco) |  |  |  | 50%                | Ampolla o vial, 50-100ml                   | IV                                                    | S   | S    | n              | S   | S               | n           |
| n° 311 | I | n339 | S | B 05 | B A 03           | Dextrose                                                    |  |  |  |                    |                                            |                                                       | S   | S    | n              | S   | S               | n           |

24/83

|       |        | A.T.C.      | PRINCIPIO ACTIVO         | CONCENTRACIÓN                              | PRESENTACIÓN                                                                                            | VIA    | CSS | MINSA | H.S.T. Tomás | H. Psiquiátrico | H.L. Estancia | H. del N. |
|-------|--------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|--------------|-----------------|---------------|-----------|
| n°315 | n340/s | B 05 B A 03 | Dextrosa                 | 5%                                         | 250ml                                                                                                   | IV     |     |       |              |                 |               |           |
| n°316 | n341/s | B 05 B A 03 | Dextrosa en Agua         | 5%                                         | Envase plástico (bolsa o frasco), con equipo IV adaptable desechable para infusión intravenosa, 500 ml  | IV     |     |       |              |                 |               |           |
| n°317 | n342/s | B 05 B A 03 | Dextrosa en Agua         | 5%                                         | Envase plástico (bolsa o frasco), con equipo IV adaptable desechable para infusión intravenosa, 1000 ml | IV     |     |       |              |                 |               |           |
| n°318 | n343/s | B 05 B A 03 | Dextrosa en Agua         | 10%                                        | Envase plástico (bolsa o frasco), con equipo IV adaptable desechable para infusión intravenosa, 500ml   | IV     |     |       |              |                 |               |           |
| n°319 | n344/s | B 05 B A 03 | Dextrosa Hiperfónica     | 70%                                        | 2,000 ml                                                                                                | IV     |     |       |              |                 |               |           |
| n°320 | n345/s | B 05 B B 02 | Dextrosa/Solución Salina | Dextrosa al 5% en solución salina al 0.9%  | Envase plástico (bolsa o frasco), con equipo IV adaptable desechable para infusión intravenosa, 500ml   | IV     |     |       |              |                 |               |           |
| n°321 | n346/s | B 05 B B 02 | Dextrosa/Solución Salina | Dextrosa al 5% en solución salina al 0.9%  | Envase plástico (bolsa o frasco), con equipo IV adaptable desechable para infusión intravenosa, 1000 ml | IV     |     |       |              |                 |               |           |
| n°322 | n347/s | B 05 B B 02 | Dextrosa/Solución Salina | Dextrosa al 5% en solución salina al 0.33% | Envase plástico (bolsa o frasco), con equipo IV adaptable desechable para infusión intravenosa, 500ml   | IV     |     |       |              |                 |               |           |
| n°323 | n348/s | B 05 B B 02 | Dextrosa/Solución Salina | Dextrosa al 5% en solución salina al 0.45% | Envase plástico (bolsa o frasco), con equipo IV adaptable desechable para infusión intravenosa, 500ml   | IV     |     |       |              |                 |               |           |
| n°324 | n349/s | N 05 B A 01 | Diazepam                 | 5mg                                        | Comprimido                                                                                              | Oral   |     |       |              |                 |               |           |
| n°325 | n350/s | N 05 B A 01 | Diazepam                 | 10 mg                                      | Comprimido                                                                                              | Oral   |     |       |              |                 |               |           |
| n°326 | n351/s | N 05 B A 01 | Diazepam                 | 2mg/5ml                                    | Jarabe 100ml                                                                                            | Oral   |     |       |              |                 |               |           |
| n°327 | n352/s | N 05 B A 01 | Diazepam                 | 5mg/ml                                     | Ampolla 2ml                                                                                             | IM IV  |     |       |              |                 |               |           |
| n°328 | n353/s | M 01 A B 05 | Diclofenaco sódico       | 50mg                                       | Cápsula o comprimido                                                                                    | Oral   |     |       |              |                 |               |           |
| n°329 | n354/s | M 01 A B 05 | Diclofenaco sódico       | 50mg                                       | Supositorio                                                                                             | Rectal |     |       |              |                 |               |           |
| n°330 | n355/s | M 01 A B 05 | Diclofenaco sódico       | 75mg/3ml                                   | Ampollas                                                                                                | IM     |     |       |              |                 |               |           |
| n°331 | n356/s | J 01 C F 01 | Dicloxacilina            | 500mg                                      | Cápsula                                                                                                 | Oral   |     |       |              |                 |               |           |
| n°332 | n357/s | J 01 C F 01 | Dicloxacilina            | 250mg/5ml                                  | Póvulo para suspensión o suspensión, 60-90ml                                                            | Oral   |     |       |              |                 |               |           |
| n°333 | n358/s | J 05 A F 02 | Didanosina               | 100mg                                      | Cápsula o comprimido                                                                                    | Oral   |     |       |              |                 |               |           |
| n°334 | n359/s | L 02 A A 01 | Dietilstilbestrol        | 1mg                                        | Comprimido                                                                                              | Oral   |     |       |              |                 |               |           |
| n°335 | n360/s | R 06 A A 02 | Difenhidramina           | 25mg                                       | Cápsula                                                                                                 | Oral   |     |       |              |                 |               |           |
| n°336 | n361/s | R 06 A A 02 | Difenhidramina           | 10-12.5mg/5ml                              | Jarabe, frasco 120ml                                                                                    | Oral   |     |       |              |                 |               |           |
| n°337 | n362/s | R 06 A A 02 | Difenhidramina           | 50mg/ml                                    | Ampolla o vial                                                                                          | IM IV  |     |       |              |                 |               |           |
| n°338 | n363/s | C 01 A A 05 | Digoxina                 | 0.25mg/ml                                  | Ampolla 1-2ml                                                                                           | IM IV  |     |       |              |                 |               |           |
| n°339 | n364/s | C 01 A A 05 | Digoxina                 | 0.25mg                                     | Comprimido                                                                                              | Oral   |     |       |              |                 |               |           |

|          |   |    |   | PRINCIPIO ACTIVO                                          | CONCENTRACIÓN | PRESENTACIÓN                                            | VIA        | CSS | MINSU | H.SIO. Tonils | ION | H.Patológico | H.Estética | N del N |
|----------|---|----|---|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|-----|-------|---------------|-----|--------------|------------|---------|
|          |   |    |   |                                                           |               |                                                         |            |     |       |               |     |              |            |         |
| n°355 \$ | C | 01 | A | 05 Digoxina                                               | 0.05mg/ml     | Elixir pediátrico, frasco con gotero calibrado, 60ml    | Oral       | \$  | \$    | n             | n   | n            | \$         |         |
| n°356 \$ | G | 03 | F | A 02 Dihidroprogesterona/Estradiol                        | 250mg/10mg    | Ampolla 1ml                                             | IM         | n   | \$    | n             | s   | n            | n          |         |
| n°357 \$ | C | 08 | D | B 01 Diltiazem                                            | 180mg         | Capsula o comprimido                                    | Oral       | \$  | n     | n             | n   | n            | n          |         |
| n°358 \$ | C | 08 | D | B 01 Diltiazem                                            | 60mg          | Capsula o comprimido                                    | Oral       | \$  | n     | n             | n   | n            | n          |         |
| n°359 \$ | R | 06 | A | A 02 Dimetildinatio                                       | 50mg          | Comprimido                                              | Oral       | \$  | \$    | \$            | s   | n            | \$         |         |
| n°370 \$ | R | 06 | A | A 02 Dimetildinatio                                       | 10mg/ml       | Ampolla 5ml                                             | IM IV      | \$  | \$    | \$            | s   | n            | \$         |         |
| n°371 \$ | G | 02 | A | D 02 Dinoprostone                                         | 0.5mg/3g      | Gel con aplicador pre cargado                           | Vaginal    | \$  | n     | n             | n   | n            | n          |         |
| n°372 \$ | C | 05 | C | A 53 Dicsonina/Hesperidina                                | 450mg/50mg    | Comprimido                                              | Oral       | n   | n     | s             | n   | n            | n          |         |
| n°373 \$ | N | 02 | B | B 02 Dipirona (Metamizol) con sales magnésicas            | 400mg/ml      | Ampolla 5ml                                             | IM IV      | \$  | \$    | \$            | s   | n            | \$         |         |
| n°374 \$ | N | 02 | B | B 02 Dipirona (Metamizol) sódica                          | 500mg/ml      | Ampolla 2ml                                             | IM IV      | n   | n     | s             | n   | n            | n          |         |
| n°375 \$ | S | 01 | E | A 02 Dipirifrina clorhidrato                              | 0.1%          | Solución oftálmica, frasco 10ml                         | Oftálmico  | \$  | n     | n             | n   | n            | n          |         |
| n°376 \$ | C | 03 | C | A 00 Diurético de Techo Alto                              | 40mg          | Comprimido                                              | Oral       | \$  | \$    | \$            | s   | n            | \$         |         |
| n°377 \$ | C | 03 | C | A 01                                                      | 1mg           | Comprimido                                              | Oral       | \$  | \$    | \$            | s   | n            | \$         |         |
| n°378 \$ | C | 03 | C | A 02                                                      | 12.5mg/ml     | Vial 20ml                                               | IV         | n   | n     | n             | s   | n            | n          |         |
| n°379 \$ | C | 01 | C | A 02 Dobutamina                                           | 20mg          | Vial 0.5ml                                              | IV         | n   | n     | n             | s   | n            | n          |         |
| n°380 \$ | L | 01 | C | D 02 Docitaxel                                            | 80mg          | Vial 2ml                                                | IV         | n   | n     | n             | s   | n            | n          |         |
| n°381 \$ | L | 01 | C | D 02 Docitaxel                                            | 40-50mg/ml    | Ampolla o vial, 5ml                                     | IV         | \$  | \$    | \$            | s   | n            | \$         |         |
| n°382 \$ | C | 01 | C | A 04 Dopamina clorhidrato                                 | 2%            | Gotas oftálmicas, frasco de 5-10ml                      | Oftálmico  | \$  | n     | n             | n   | n            | n          |         |
| n°383 \$ | S | 01 | E | C 03 Dorzolamida clorhidrato                              |               | Capsula o comprimido 100mg                              | Oral       | \$  | n     | n             | s   | n            | \$         |         |
| n°384 \$ | J | #  | C | F 01 Doxiciclina                                          | 10mg          | Vial                                                    | IV         | \$  | \$    | n             | s   | n            | n          |         |
| n°385 \$ | L | 01 | D | B 01 Doxornibicina clorhidrato                            | 50mg          | Vial                                                    | IV         | n   | n     | n             | s   | n            | n          |         |
| n°386 \$ | L | 01 | D | B 01 Doxornibicina clorhidrato                            | 200mg/ml      | Ampolla o vial                                          | Parenteral | \$  | n     | n             | n   | n            | n          |         |
| n°387    | V | 03 | A | B 03 Edetato (versenato, EDTA) calcico disódico           | 10mg/ml       | Vial 10ml                                               | IV         | n   | n     | s             | n   | n            | n          |         |
| n°388 \$ | V | 04 | C | X 00 Edrofinio clonuro                                    | 200mg         | Capsula o comprimido                                    | Oral       | \$  | \$    | \$            | n   | n            | n          |         |
| n°389 \$ | J | 05 | A | G 03 Etawrenz                                             | 25-50mg/ml    | Ampolla o vial 1-2ml                                    | IV         | \$  | \$    | \$            | s   | n            | \$         |         |
| n°390 \$ | R | 03 | C | A 02 Efedrina sulfato                                     | 10%           | Frasco 500ml                                            | IV         | n   | \$    | \$            | n   | n            | n          |         |
| n°391 \$ | B | 05 | B | A 02 Emulsión de grasa                                    | 20%           | Frasco 500ml                                            | IV         | \$  | \$    | \$            | s   | n            | \$         |         |
| n°392 \$ | B | 05 | B | A 02 Emulsión de grasa                                    | 5mg           | Comprimido                                              | Oral       | n   | \$    | \$            | s   | n            | n          |         |
| n°393 \$ | C | 09 | A | A 02 Enalapril                                            | 20 mg         | Comprimido                                              | Oral       | \$  | \$    | \$            | s   | s            | s          |         |
| n°394 \$ | C | 09 | A | A 02 Enalapril                                            |               |                                                         |            |     |       |               |     |              |            |         |
| n°395 \$ | A | 06 | A | G 00 Enemas:                                              | 19g/7g        | Envase plástico descartable con clauda rectal, 60-135ml | Rectal     | \$  | \$    | \$            | s   | n            | \$         |         |
| n°396 \$ | A | 06 | A | G 20                                                      | 0.01g /13.4g  | Tubo descartable con clauda rectal, 90-135ml            | Rectal     | \$  | \$    | \$            | s   | n            | \$         |         |
| n°397 \$ | A | 06 | A | G 20                                                      |               | Frasco 125-250ml                                        | Inhalación | \$  | \$    | n             | n   | n            | n          |         |
| n°398 \$ | N | 01 | A | B 04 Enfurano                                             | 1mgog         | Capsula                                                 | Oral       | \$  | n     | n             | s   | n            | n          |         |
| n°399 \$ | A | 11 | C | 03 Ergocalciferol (derivados hidroxiácidos): Alfacalcidol | 1mg/100mg     | Comprimido                                              | Oral       | \$  | n     | n             | n   | n            | n          |         |
| n°400 \$ | N | 02 | C | A 52 Ergolamina/Cafeína                                   | 500mg         | Comprimido                                              | Oral       | \$  | \$    | n             | n   | n            | n          |         |
| n°401 \$ | J | 01 | F | A 01 Efroniscina (base, estearato o elisuccinato)         |               |                                                         | Oral       | \$  | \$    | n             | s   | n            | \$         |         |

| Código   | A.T.C. | Principio activo                                                    | Concentración          | Presentación                                                | MA        | H. S. de la N. de la N. |       |                         |                         |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
|          |        |                                                                     |                        |                                                             |           | CSS                     | MINSA | H. S. de la N. de la N. | H. S. de la N. de la N. |
| n°371    | n402 s | J 01 F A 01 Entromicina (base, estearato o elisuccinato)            | 100mg/ml               | Gotas pediátricas, con gotero calibrado, 10-20ml            | Oral      | s                       | s     | n                       | n                       |
| n°372    | n403 s | J 01 F A 01 Etilomicina (base, estearato, estiolato o elisuccinato) | 250mg/5ml              | Gránulo para suspensión o suspensión, 60-100ml              | Oral      | s                       | s     | n                       | n                       |
| n°373    | n404 s | B 03 X A 01 Eritropoyetina                                          | 12,000 UI              | Vial                                                        | IV SC     | s                       | s     | s                       | n                       |
| n°374    | n405 s | B 03 X A 01 Eritropoyetina                                          | 50,000 UI              | Vial                                                        | IV SC     | n                       | n     | s                       | n                       |
| n°376    | n406 s | A 03 B B 01 Escopolamina butilbromuro                               | 20mg/ml                | Ampolla 1ml                                                 | IM IV     | s                       | s     | s                       | n                       |
| n°377    | n407 s | A 03 B B 01 Escopolamina butilbromuro                               | 10mg                   | Comprimido                                                  | Oral      | s                       | s     | s                       | n                       |
| n°378    | n408 s | J 01 X X 04 Espiridamicina                                          | 2g                     | vial                                                        | IM        | n                       | n     | n                       | n                       |
| n°379    | n409 s | J 01 F A 02 Espiramicina                                            | 1-1.5 millones UI      | Cápsula o comprimido                                        | Oral      | s                       | s     | n                       | n                       |
| n°380    | n410 s | C 03 D A 01 Espironolactona                                         | 25mg                   | Comprimido                                                  | Oral      | s                       | s     | s                       | n                       |
|          | n411 s | J 05 A F 04 Estiladina                                              | 40mg                   | Cápsula o comprimido                                        | Oral      | s                       | s     | s                       | n                       |
|          | n412 s | R 01 A D 01 Esteroides tópicos de uso nasal                         |                        |                                                             |           |                         |       |                         |                         |
|          | n413 s | R 01 A D 01                                                         |                        |                                                             |           |                         |       |                         |                         |
|          | n414 s | R 01 A D 05                                                         |                        |                                                             |           |                         |       |                         |                         |
|          | n415 s | R 01 A D 08                                                         |                        |                                                             |           |                         |       |                         |                         |
|          | n416 s | R 01 A D 00                                                         |                        |                                                             |           |                         |       |                         |                         |
| n°381    | n417 s | J 01 G A 01 Estreptomina                                            | 50mg/inhalación        | Suspensión acuosa                                           | Nasal     | s                       | n     | n                       | s                       |
| n°382    | n418 s | B 01 A D 01 Estreptocinasas                                         | 50mg/inhalación        | Suspensión acuosa                                           | Nasal     | s                       | n     | n                       | s                       |
| n°383    | n419 s | G 03 C A 57 Estrógenos conjugados                                   | 50mg/inhalación        | Suspensión acuosa                                           | Nasal     | s                       | n     | n                       | s                       |
| n°384    | n420 s | G 03 C A 57 Estrógenos conjugados                                   | 50mg/inhalación        | Suspensión acuosa                                           | Nasal     | s                       | n     | n                       | s                       |
| n°385    | n421 s | J 04 A K 02 Etambutol                                               | 1g                     | Suspensión acuosa                                           | Nasal     | s                       | n     | n                       | n                       |
|          | n422 s | B 02 B X 01 Etamsilato                                              |                        |                                                             |           |                         |       |                         |                         |
|          | n423 s | B 02 B X 01 Etamsilato                                              |                        |                                                             |           |                         |       |                         |                         |
| n°386    | n424 s | L 01 C B 01 Etoposido                                               | 500mg                  | Comprimido                                                  | Oral      | n                       | n     | s                       | n                       |
| n°387    | n425 s | L 01 C B 01 Etoposido                                               | 50mg                   | Cápsula                                                     | Oral      | n                       | n     | s                       | n                       |
| n°388    | n426 s | R 05 C A 00 Expectoante sin azúcar, CSS                             | 100mg                  | Vial                                                        | IV        | s                       | n     | s                       | n                       |
| n°389    | n427 s | B 02 B D 02 Factor VIII                                             | 200-350UI              | Frasco                                                      | Oral      | s                       | n     | s                       | n                       |
| n°390    | n428 s | S 01 F B 01 Fenilfina                                               | 10%                    | Vial                                                        | IM IV     | s                       | n     | n                       | s                       |
| n°392    | n429 s | N 03 A B 02 Fenitona                                                | 125mg/5ml              | Gotas oftálmicas, fresco 5-15ml                             | Oftálmico | s                       | s     | n                       | s                       |
| n°391    | n430 s | N 03 A B 02 Fenitona sódica                                         | 100mg                  | Suspensión, 120ml-250ml                                     | Oral      | s                       | s     | n                       | s                       |
| n°393    | n431 s | N 03 A B 02 Fenitona sódica                                         | 50mg/ml                | Cápsula                                                     | Oral      | s                       | s     | s                       | n                       |
|          |        |                                                                     |                        | Solución o polvo liofilizado con disolvente, Vial/IM IV 5ml |           | s                       | s     | s                       | n                       |
| n°394 EX | n432 s | N 03 A A 02 Fenobarbital                                            | 16mg                   | Comprimido                                                  | Oral      | n                       | s     | n                       | s                       |
| n°395    | n433 s | N 03 A A 02 Fenobarbital                                            | 64mg                   | Comprimido                                                  | Oral      | s                       | s     | s                       | s                       |
| n°396    | n434 s | N 03 A A 02 Fenobarbital                                            | 32mg                   | Comprimido                                                  | Oral      | s                       | s     | n                       | s                       |
| n°397    | n435 s | N 03 A A 02 Fenobarbital                                            | 130mg/ml               | Ampolla o vial 1-2ml                                        | IM IV     | s                       | s     | s                       | n                       |
| n°398    | n436 s | R 03 C C 04 Fenoterol                                               | 5mg                    | Comprimido                                                  | Oral      | n                       | s     | n                       | n                       |
| n°399    | n437 s | R 03 C C 04 Fenoterol                                               | 0.5mg/10ml             | Ampollas                                                    | IV        | n                       | s     | n                       | n                       |
| n°400    | n438 s | J 01 C E 02 Fenoximetilpenicilina                                   | 200,000-300,000 UI/5ml | Suspensión oral, 50-80ml                                    | Oral      | s                       | s     | n                       | n                       |

|       |        | AT C     | PRINCIPIO ACTIVO                                  | CONCENTRACIÓN   | PRESENTACIÓN                  | VIA        | CS | MINSA | H.Sio.Tomas | ON | H.Psiquiátrico | H.Estancia | H.de N. |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|----|-------|-------------|----|----------------|------------|---------|
| n°401 | n439 s | J 01 C E | 02 Fenoximetilpenicilina (sal cálcica o potásica) |                 |                               |            |    |       |             |    |                |            |         |
| n°402 | n440 s | N 01 A H | 01 Fentanilo                                      | 1-1.5 M UI      | Comprimido                    | Oral       | S  | S     | S           | S  | S              | S          | S       |
|       | n441 s | N 01 A H | 01 Fentanilo                                      | 0.05mg/ml       | Ampolla 2ml                   | IM IV      | n  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
| n°403 | n442 s | B 03 A A | 02 Femeso fumarato                                |                 |                               |            |    |       |             |    |                |            |         |
|       | n443 s | C 10 A B | 05 Filtratos micronizados:                        |                 |                               |            |    |       |             |    |                |            |         |
|       | n444 s | C 10 A B | 05 Filtratos:                                     |                 |                               |            |    |       |             |    |                |            |         |
|       | n445 s | C 10 A B | 00 Filtratos:                                     |                 |                               |            |    |       |             |    |                |            |         |
|       | n446 s | C 10 A B | 00 Filtratos:                                     |                 |                               |            |    |       |             |    |                |            |         |
|       | n447 s | C 10 A B | 00 Filtratos:                                     |                 |                               |            |    |       |             |    |                |            |         |
| n°407 | n448 s | L 03 A A | 02 Fligastim                                      | 200 - 250mg     | Cápsula o comprimido          | Oral       | S  | n     | n           | S  | n              | n          | n       |
| n°408 | n449 s | G 04 B X | 04 Finasteride                                    |                 |                               |            |    |       |             |    |                |            |         |
| n°409 | n450 s | B 02 B A | 01 Flomenadina                                    | 200mg           | Cápsula o comprimido          | Oral       | n  | S     | n           | S  | S              | S          | n       |
| n°411 | n451 s | J 02 A C | 01 Fluonazol                                      | 600mg           | Cápsula o comprimido          | Oral       | n  | S     | n           | n  | S              | S          | n       |
| n°412 | n452 s | J 02 A C | 01 Fluonazol                                      | 300mg/ml        | Vial                          | IV SC      | S  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
| n°413 | n453 s | L 01 B B | 05 Fludarabina                                    | 5mg             | Cápsula o comprimido          | Oral       | S  | n     | n           | n  | n              | n          | S       |
| n°414 | n454 s | H 02 A A | 02 Fludocorisona                                  | 5mg             | Ampolla 1ml                   | IM IV      | S  | S     | S           | S  | S              | S          | S       |
| n°415 | n455 s | N 05 A B | 02 Flufenazina decanoato                          | 10mg/ml         | Vial 100ml                    | IV         | S  | S     | S           | S  | S              | S          | n       |
| n°416 | n456 s | V 03 A B | 25 Flumazenil                                     | 2mg/ml          | Cápsula o Comprimido          | Oral       | n  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
| n°417 | n457 s | S 01 J A | 01 Fluoresceína sódica                            | 50mg            | Vial                          | Oral       | S  | n     | n           | n  | n              | n          | S       |
| n°418 | n458 s | L 01 B C | 02 Fluoruracilo                                   | 0.2%, pH neutro | Póvulo, sobre 2g              | Oral       | S  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
| n°419 | n459 s | A 12 C D | 01 Fluoruro de sodio FNA                          | 20mg            | Cápsula                       | Oral       | n  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
| n°420 | n460 s | N 06 A B | 03 Fluoxetina                                     | 5mg             | Comprimido                    | Oral       | S  | S     | S           | S  | S              | S          | S       |
| n°421 | n461 s | N 06 A B | 08 Fluoxetina                                     | 5mg             | Comprimido                    | Oral       | S  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
| n°422 | n462 s | N 06 A B | 01 Folico ácido                                   | 12mg/inhalación | Póvulo seco con aplicador     | Inhalación | n  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
|       | n463 s | B 03 B B | 01 Folico ácido                                   | 24mg/ml         | Vial                          | IV         | S  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
| n°423 | n464 s | R 03 A C | 13 Formoterol fumarato                            | 60mg/ml         | Ampolla 5ml                   | IM IV      | S  | S     | S           | S  | S              | S          | S       |
| n°424 | n465 s | J 05 A D | 01 Fosfarnet                                      | 40mg/ml         | Ampolla 2ml                   | Oral       | n  | n     | n           | n  | n              | n          | S       |
| n°425 | n466 s | L 02 A A | 04 Fosfostrol tetrasódico                         | 10mg            | Comprimido                    | Tópico     | S  | S     | S           | S  | S              | S          | S       |
|       | n467 s | C 03 C A | 01 Furosemida                                     | 40mg            | Gasa impregnada 10x10         | Tópico     | n  | S     | S           | S  | S              | S          | S       |
|       | n468 s | C 03 C A | 01 Furosemida                                     | 2%              | Tubo 15-20 gung               | Oral       | n  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
| n°426 | n469 s | D 06 A X | 01 Furosemida                                     | 2%              | comprimido                    | IV         | S  | n     | n           | n  | n              | n          | S       |
| n°427 | n470 s | D 06 A X | 09 Fusidato sódico                                | 300mg           | Ampolla o vial                | Oral       | S  | n     | n           | S  | S              | S          | n       |
| n°428 | n471 s | N 03 A X | 12 Gabapentina                                    | 500mg           | Comprimido                    | IV         | S  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
| n°429 | n472 s | J 05 A B | 06 Gandiclovir                                    | 500mg           | Vial                          | IV         | S  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
|       | n473 s | J 05 A B | 06 Gandiclovir                                    | 200mg           | Vial                          | IV         | S  | n     | n           | n  | n              | n          | n       |
| n°431 | n474 s | L 01 B C | 05 Gemcitabina                                    | 1g              | Vial                          | Oral       | S  | n     | n           | S  | S              | S          | S       |
| n°432 | n475 s | L 01 B C | 05 Gemcitabina                                    | 0.3%            | Unguento oftálmico, tubo 3-5g | Oral       | S  | n     | n           | S  | S              | S          | S       |
| n°434 | n476 s | S 01 A A | 11 Gentamicina sulfato                            | 0.3%            | Gotas oftálmicas, 5-15ml      | Oral       | S  | n     | n           | S  | S              | S          | S       |
| n°435 | n477 s | S 01 A A | 11 Gentamicina sulfato                            | 0.3%            | Ampolla o vial 2ml            | IM IV      | S  | S     | S           | S  | S              | S          | S       |
| n°436 | n478 s | J 01 G B | 03 Gentamicina sulfato                            | 40mg/ml         | Ampolla o vial 2ml            | IM IV      | S  | S     | S           | S  | S              | S          | S       |

24/87

|           |        |  | AIT | C  | PRINCIPIO ACTIVO |    | CONCENTRACION                          | PRESENTACION                | VIA                     | CSS   | MINSA | H.Sio Tomás | NON | H. psiquiátrico | H. Estancia | H. del N. |
|-----------|--------|--|-----|----|------------------|----|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------|-----|-----------------|-------------|-----------|
| n° 437    | n479 s |  | G   | 03 | X A              | 02 | Gestiróna                              |                             | Cápsula                 | 2.5mg |       |             |     |                 |             |           |
| n° 438    | n480 s |  | A   | 10 | B B              | 01 | Gilbendiamida                          |                             | Comprimido              | 5mg   |       |             |     |                 |             |           |
| n° 439    | n481 s |  | C   | 01 | D A              | 02 | Gliceril trimitrato (nitroglicerina)   | 5 mg/24 horas               | Parches                 |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 440    | n482 s |  | C   | 01 | D A              | 02 | Gliceril trimitrato (nitroglicerina)   | 0.4mg                       | Tableta sublingual      |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 441    | n483 s |  | C   | 01 | D A              | 02 | Gliceril trimitrato (nitroglicerina)   | 5mg/ml                      | Vial 10ml               |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 442    | n484 s |  | A   | 10 | B B              | 09 | Gliclazida                             | 80mg                        | Comprimido              |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 443 EX | n485 s |  | A   | 10 | B B              | 07 | Glipizida                              | 5mg                         | Cápsula o comprimido    |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 444 I  | n486 s |  | H   | 02 | A B              | 00 | Glucocorticoides:                      |                             |                         |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 445 I  | n487 s |  | H   | 02 | A B              | 07 | Prednisona o,                          | 5mg                         | Comprimido              |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 446 I  | n488 s |  | H   | 02 | A B              | 06 | Prednisona                             | 5mg                         | Comprimido              |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 447 EX | n489 s |  | D   | 01 | A A              | 08 | Griseofulvina                          | 125mg/5ml                   | Suspensión 90-120ml     |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 448    | n490 s |  | R   | 05 | C A              | 03 | Guayacolato de glicerilo (Guafenesina) | 100mg/5ml                   | Jarabe 120ml            |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 449    | n491 s |  | N   | 05 | A D              | 01 | Halofupendol                           | 2mg/ml                      | Gotas 15ml              |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 450    | n492 s |  | N   | 05 | A D              | 01 | Halofupendol                           | 5 mg/ml                     | Ampolla 1ml             |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 451    | n493 s |  | N   | 05 | A D              | 01 | Halofupendol                           | 5mg                         | Comprimido              |       |       |             |     |                 |             |           |
|           | n494 s |  | N   | 05 | A D              | 01 | Halofupendol                           | 50mg/ml                     | Ampolla 1ml             |       |       |             |     |                 |             |           |
|           | n495 s |  | N   | 05 | A D              | 01 | Halofupendol decanoato                 | 100mg/ml                    | Ampolla 1ml             |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 452 I  | n496 s |  | B   | 01 | A B              | 00 | Heparina de bajo peso molecular        | Actividad Anti-Xa/Rang      | Solución inyectable     |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 770    | n497 s |  | B   | 01 | A B              | 10 |                                        | 3.500UI                     | Jeringuilla prellenada  |       |       |             |     |                 |             |           |
|           | n498 s |  | B   | 01 | A B              | 00 | Tirzaparina                            | 3000                        |                         |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 453 I  | n499 s |  | B   | 01 | A B              | 06 | Centroparina                           | 3075/                       |                         |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 454 I  | n500 s |  | B   | 01 | A B              | 05 | Nandroparina                           | 2.880-4.000/                | Jeringuilla             |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 455 I  | n501 s |  | B   | 01 | A B              | 04 | Enoxaparina                            | 2500/                       |                         |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 456    | n502 s |  | B   | 01 | A B              | 01 | Heparina sódica                        | 5.000 U.I./ml /             | Ampolla o vial 5ml      |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 457    | n503 s |  | B   | 06 | A A              | 03 | Hialuronidasa liofilizada              | 1500UI                      | 1-10 ml                 |       |       |             |     |                 |             |           |
|           |        |  |     |    |                  |    |                                        |                             | IM SC                   |       |       |             |     |                 |             |           |
|           |        |  |     |    |                  |    |                                        |                             | Peritocular             |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 458    | n504 s |  | C   | 02 | D B              | 02 | Hidralazina                            | 50mg                        | Comprimido              |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 459    | n505 s |  | C   | 02 | D B              | 02 | Hidralazina cloridrato                 | 20mg/ml                     | Ampolla 1ml             |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 460    | n506 s |  | N   | 05 | C C              | 01 | Hidralo de Cloral                      | 500mg/5ml                   | Jarabe                  |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 461    | n507 s |  | C   | 03 | E A              | 01 | Hidroclorotiazida con Triamtereno      | 25mg/50mg                   | Tableta ranurada        |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 463    | n508 s |  | H   | 02 | A B              | 09 | Hidroclorotiazida con Triamtereno      | 50mg/ml                     | Vial 2ml                |       |       |             |     |                 |             |           |
|           | n509 s |  | H   | 02 | A B              | 09 | Hidroclorotiazida con Triamtereno      | 500mg                       | Vial, polvo liofilizado |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 464    | n510 s |  | L   | 01 | X X              | 05 | Hidroclorotiazida (Hidroxiurea)        | 500mg                       | Cápsula                 |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 465    | n511 s |  | N   | 05 | B B              | 01 | Hidroxina                              | 10mg/5ml                    | Jarabe, 180-200ml       |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 466    | n512 s |  | N   | 05 | B B              | 01 | Hidroxina                              | 25mg                        | Cápsula o comprimido    |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 467    | n513 s |  | P   | 01 | B A              | 02 | Hidroxiquina sulfato                   | 400mg                       | Comprimido              |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 468    | n514 s |  | G   | 03 | D A              | 03 | Hidroxiprogesterona caproato           | 250mg/ml                    | Ampolla 1ml             |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 469    | n515 s |  | B   | 03 | A A              | 07 | Hierro (sal ferrosa)                   | 50-100mg (hierro elemental) | Comprimido              |       |       |             |     |                 |             |           |
| n° 470    | n516 s |  | B   | 03 | A A              | 07 | Hierro (sal ferrosa)                   | 125mg/ml                    | Comprimido              |       |       |             |     |                 |             |           |
|           | n517 s |  | B   | 03 | A C              | 00 | Hierro dextran                         | 50mg/ml                     | Ampolla 2ml             |       |       |             |     |                 |             |           |

88/2

|       | A | I  | C | PRINCIPIO ACTIVO | CONCENTRACIÓN | PRESENTACIÓN                                                               | VIA                        | CS                                                           | MINS | H.S.T. | TOMAS | ION | H.P. | E.F. | N. |
|-------|---|----|---|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----|------|------|----|
| n°471 | B | 03 | A | C                | 00            | Hierro no dextran                                                          | 10-20mg/ml                 | Vial                                                         | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°472 | A | 03 | B | B                | 02            | Homatropina metilbromuro                                                   | 5mg/5ml                    | Elisir                                                       | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°473 | M | 01 | A | E                | 01            | Ibuprofeno                                                                 | 400mg                      | comprimido                                                   | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°474 | L | 01 | D | B                | 06            | Idarubicina                                                                | 5mg                        | Ampolla o vial                                               | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°475 | L | 01 | A | A                | 06            | Ifosfamida                                                                 | 1g                         | Vial                                                         | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°476 | L | 01 | X | X                | 28            | linalib                                                                    | 100mg                      | Cápsula                                                      | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°477 | D | 01 | A | C                | 00            | Imidazoles:                                                                | 1-2%                       | Crema, tubo 15-20g                                           | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°478 | D | 01 | A | C                | 01            | Clotrimazol o,                                                             | 1-2%                       | Crema, tubo 15-20g                                           | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°479 | D | 01 | A | C                | 05            | Isoconazol o,                                                              | 1-2%                       | Crema, tubo 15-20g                                           | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°480 | D | 01 | A | C                | 08            | Ketoconazol o,                                                             | 1-2%                       | Crema, tubo 15-20g                                           | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°481 | D | 01 | A | C                | 02            | Miconazol o,                                                               | 1-2%                       | Crema, tubo 15-20g                                           | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°482 | D | 01 | A | C                | 07            | Tioconazol                                                                 | 1-2%                       | Crema, tubo 15-20g                                           | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°483 | D | 01 | A | C                | 00            | Imidazoles:                                                                | 1-2%                       | Solución, 20-30ml                                            | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°484 | D | 01 | A | C                | 01            | Clotrimazol o,                                                             | 1-2%                       | Solución, 20-30ml                                            | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°485 | D | 01 | A | C                | 03            | Econazol o,                                                                | 1-2%                       | Solución, 20-30ml                                            | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°486 | D | 01 | A | C                | 02            | Miconazol                                                                  | 1-2%                       | Solución, 20-30ml                                            | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°487 | G | 01 | A | F                | 01            | Imidazoles:                                                                | 1-2%                       | Crema o jalea vaginal, tubo con aplicador, 35-Vaginal<br>40g | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°488 | G | 01 | A | F                | 02            | Clotrimazol o,                                                             | 1-2%                       | Crema o jalea vaginal, tubo con aplicador, 35-Vaginal<br>40g | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°489 | G | 01 | A | F                | 07            | Isoconazol o,                                                              | 1-2%                       | Crema o jalea vaginal, tubo con aplicador, 35-Vaginal<br>40g | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°490 | G | 01 | A | F                | 04            | Miconazol                                                                  | 1-2%                       | Crema o jalea vaginal, tubo con aplicador, 35-Vaginal<br>40g | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°491 | J | 01 | D | H                | 51            | Imipenem con Cilastatina                                                   | 500mg/500mg                | Vial                                                         | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°492 | N | 06 | A | A                | 02            | Imipramina                                                                 | 10mg                       | Cápsula o comprimido                                         | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°493 | N | 06 | A | A                | 02            | Imipramina                                                                 | 25mg                       | Cápsula o comprimido                                         | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°494 | C | 06 | A | A                | 02            | Indapamida                                                                 | 2.5mg                      | Comprimido                                                   | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°495 | C | 06 | A | A                | 02            | Indapamida                                                                 | 1.5mg                      | Comprimido de acción prolongada                              | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°496 | C | 06 | A | A                | 02            | Indapamida                                                                 | 400mg                      | Cápsula o comprimido                                         | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°497 | J | 05 | A | E                | 02            | Indinavir sulfato                                                          | Equivalentes a 1mg de base | Ampolla o vial                                               | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°498 | C | 01 | E | B                | 03            | Indometacina sódica liclizada                                              |                            |                                                              |      |        |       |     |      |      |    |
| n°499 | C | 10 | A | A                | 00            | Inhibidores de la 3 Hidroxil-3 metilglutaril Coenzima A reductasa(HMG-CoA) |                            |                                                              |      |        |       |     |      |      |    |
| n°500 | C | 10 | A | A                | 00            | Atrovastatina                                                              | 10 mg                      | Cápsula o comprimido                                         | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°501 | C | 10 | A | A                | 00            | Fluvastatina o                                                             | 40mg                       | Cápsula o comprimido                                         | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°502 | C | 10 | A | A                | 00            | Lovastatina o                                                              | 20mg                       | Cápsula o comprimido                                         | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |
| n°503 | C | 10 | A | A                | 00            | Praestatinina o                                                            | 10mg                       | Cápsula o comprimido                                         | S    | S      | S     | S   | S    | S    | S  |

24/89

|        |    |      | A T C | PRINCIPIO ACTIVO | CONCENTRACIÓN                                             | PRESENTACIÓN               | VIA                                      | CSS | MINSA | H.S.O. Tomas | ON | H. Psiquiátrico | H.L. Estándar | H. del N |
|--------|----|------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|-------|--------------|----|-----------------|---------------|----------|
| n° 494 | I  | n550 | S     | C 10/A 00        | Simvastatina                                              | 10mg                       | Capsula o comprimido                     |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 495 | I  | n551 | S     | A 02/B C 00      | Inhibidores de la bomba de protones:                      |                            |                                          |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 496 | I  | n552 | S     | A 02/B C 03      | Lanzoprazol u                                             | 30mg                       | Capsula o comprimido                     |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 497 | I  | n553 | S     | A 02/B C 01      | Omeprazol o                                               | 20mg                       | Capsula o comprimido                     |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 498 | I  | n554 | S     | A 02/B C 02      | Pantoprazol                                               | 40mg                       | Capsula o comprimido                     |     |       |              |    |                 |               |          |
|        | I  | n555 | S     | C 09/A 00        | Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina: |                            |                                          |     |       |              |    |                 |               |          |
|        | I  | n556 | S     | C 09/A 04        | Perindopril                                               | 4mg                        | Comprimido                               |     |       |              |    |                 |               |          |
|        | I  | n557 | S     | C 09/A 05        | Ramipril                                                  | 2.5mg                      | Comprimido                               |     |       |              |    |                 |               |          |
|        | I  | n558 | S     | L 02/B G 04      | Inhibidores selectivos de serotonina:                     |                            |                                          |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 499 | I  | n559 | S     | L 02/B G 03      | Anastrozol o,                                             | 1 mg                       | Comprimido                               |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 500 | I  | n560 | S     | L 02/B G 04      | Letrozol                                                  | 2.5mg                      | Comprimido                               |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 501 | I  | n561 | S     | J 06/B A 02      | Immunoglobulina                                           | 2.5-3g                     | Polverio liofilizado o solubilizado      |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 502 | I  | n562 | S     | J 06/B A 02      | Immunoglobulina                                           | 0.5-1g                     | Polverio liofilizado o solubilizado      |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 503 | I  | n563 | S     | J 06/B A 02      | Immunoglobulina                                           | 5-6g                       | Polverio liofilizado o solubilizado      |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 504 | I  | n564 | S     | J 06/B B 01      | Immunoglobulina Anti-D (Rh) Humana                        | 125-150mg/ml               | Vial 2ml                                 |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 505 | I  | n565 | S     | J 06/B B 02      | Immunoglobulina antitoxica                                | 250U                       | Vial o jeringuilla                       |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 506 | I  | n566 | S     | L 04/A A 04      | Immunoglobulina Anti-timocitica                           | 50mg/ml                    | Vial 5ml                                 |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 507 | I  | n567 | S     | A 10/A A 04      | Insulina Lenta (humana)                                   | 100U/ml                    | Vial 10ml                                |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 508 | I  | n568 | S     | A 10/A A 02      | Insulina N.P.H (humana)                                   | 100U/ml                    | Vial 10ml                                |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 509 | I  | n569 | S     | A 10/A A 01      | Insulina Regular (humana)                                 | 100U/ml                    | Vial 10ml                                |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 510 | I  | n570 | S     | L 03/A A 04      | Interferon alfa 2a o alfa 2b                              | 4.5-5 millones de unidades | Ampolla o vial                           |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 511 | I  | n571 | S     | L 03/A A 04      | Interferon alfa 2a o alfa 2b                              | 9-10 millones de unidades  | Ampolla o vial                           |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 513 | I  | n572 | S     | V 03/A B 01      | Ipecacuana                                                | 7%                         | Jarabe                                   |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 514 | I  | n573 | S     | R 03/B B 01      | Ipratropio                                                | 250mg/ml                   | Solucion para nebulizar                  |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 515 | I  | n574 | S     | R 03/B B 01      | Ipratropio bromuro                                        | 15-20mg/inhalación         | Aerosol 200-250 dosis                    |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 516 | I  | n575 | S     | L 01/X X 19      | Iminecan                                                  | 100mg                      | Vial                                     |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 517 | I  | n576 | S     | N 01/A B 06      | Isoflurano                                                | 100ml                      | Solucion inhalante para anestesia, 100ml |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 518 | I  | n577 | S     | J 04/A C 01      | Isoniazida                                                | 100mg                      | Comprimido                               |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 519 | I  | n578 | S     | C 01/C A 02      | Isopteroleno                                              | 0.2mg/ml                   | Ampolla 5ml                              |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 520 | I  | n579 | S     | C 01/D A 06      | Iscorobida dinitrato                                      | 5mg                        | Comprimido                               |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 521 | I  | n580 | S     | C 01/D A 06      | Iscorobida dinitrato                                      | 10mg                       | Comprimido                               |     |       |              |    |                 |               |          |
|        | I  | n581 | S     | C 08/C A 03      | Isradipino                                                | 5mg                        | Capsula                                  |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 522 | I  | n582 | S     | J 02/A C 02      | Itraconazol                                               | 100mg                      | Capsula o comprimido                     |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 524 | I  | n583 | S     | N 01/A X 03      | Ketamina                                                  | 50mg/ml                    | Ampolla o vial 10ml                      |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 525 | I  | n584 | S     | C 02/K D 01      | Ketanserina                                               | 2%                         | Tubo, 78g                                |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 526 | EX | n585 | S     | J 02/A B 02      | Ketocanazol                                               | 200mg                      | Comprimido                               |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 527 | I  | n586 | S     | C 07/A G 01      | Labelol hidocloruro                                       | 5mg/ml                     | Ampolla o vial 40ml                      |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 528 | I  | n587 | S     | A 06/A D 11      | Lactulosa liquido                                         | 667mg/ml                   | Frasco 450-500ml                         |     |       |              |    |                 |               |          |
| n° 529 | I  | n588 | S     | S 01/X A 20      | Leyrimas artificiales                                     | 0.3-1.4%                   | Gotas oftalmicas, 15-20ml                |     |       |              |    |                 |               |          |

24/90  
24/80

|       |        |  | A I T C  | PRINCIPIO ACTIVO                                                                                 |  | CONCENTRACIÓN   | PRESENTACIÓN                                                               | VIA         | CSS | MINS | H. Sto. Tomas | ON | H. Politécnico | H. Est. N |
|-------|--------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|---------------|----|----------------|-----------|
|       | n586 S |  | S 01 X A | 20 Lágrimas artificiales que contengan polímeros de esteres de celulosa y-o alcohol polivinílico |  | 0.3-1.4%        | Gotas oftálmicas, 15-20ml                                                  |             | n   |      |               |    |                |           |
| n°530 | n590 S |  | J 05 A F | 05 Laminudina                                                                                    |  | 10mg/ml         | Frasco 240ml                                                               | Oral        | n   |      |               |    |                |           |
| n°531 | n591 S |  | J 05 A F | 05 Laminudina                                                                                    |  | 150mg           | Cápsula o comprimido                                                       | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°532 | n592 S |  | N 03 A X | 09 Lamotrigina                                                                                   |  | 25mg            | Comprimido                                                                 | Oral        | n   |      |               |    |                |           |
| n°533 | n593 S |  | N 03 A X | 09 Lamotrigina                                                                                   |  | 100mg           | Comprimido o comprimido dispersable masticable                             | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
|       | n594 S |  | S 01 E X | 03 Lantoprost                                                                                    |  | 50mg/ml, 2.5 ml | Gotas oftálmicas                                                           | Oftálmico   | s   |      |               |    |                |           |
|       | n595 S |  | L 04 A A | 13 Leturonida                                                                                    |  | 20mg            | Comprimido                                                                 | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°534 | n596 S |  | V 03 A B | 28 Leucovorina cálcica (ácido folínico)                                                          |  | 15mg            | Comprimido                                                                 | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°535 | n597 S |  | V 03 A B | 28 Leucovorina cálcica (ácido folínico)                                                          |  | 50mg            | Vial                                                                       | IM IV       | s   |      |               |    |                |           |
|       | n598 S |  | J 01 A M | 12 Levofloxacina                                                                                 |  | 250mg/ml        | Ampolla 20ml                                                               | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
|       | n599 S |  | J 01 A M | 12 Levofloxacina                                                                                 |  | 500mg           | Comprimido                                                                 | Oral        | n   |      |               |    |                |           |
| n°536 | n600 S |  | N 06 A A | 02 Levomepromazina                                                                               |  | 25mg/ml         | Ampollas                                                                   | IM IV, o IM | n   |      |               |    |                |           |
| n°537 | n601 S |  | N 06 A A | 02 Levomepromazina                                                                               |  | 25mg            | Comprimido                                                                 | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°538 | n602 S |  | H 03 A A | 01 Levofloxacina sal sódica                                                                      |  | 0.1mg           | Comprimido                                                                 | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°539 | n603 S |  | D 04 A B | 01 Libicalina                                                                                    |  | 10%             | Aerosol 80g                                                                | Tópico      | s   |      |               |    |                |           |
| n°540 | n604 S |  | N 01 B B | 02 Libicalina                                                                                    |  | 2%              | Jalea, tubo 20-30g                                                         | Tópico      | s   |      |               |    |                |           |
| n°541 | n605 S |  | D 04 A B | 01 Libicalina con preservativo                                                                   |  | 2%              | Vial 20ml                                                                  | IM IV       | s   |      |               |    |                |           |
| n°542 | n606 S |  | N 01 B B | 02 Libicalina pesada en glucosa                                                                  |  | 5%              | Vial 2ml                                                                   | Intratecal  | n   |      |               |    |                |           |
| n°543 | n607 S |  | C 01 B B | 01 Libicalina sin preservativo                                                                   |  | 2%              | Vial 20-50ml                                                               | IM IV       | n   |      |               |    |                |           |
| n°544 | n608 S |  | J 01 F F | 02 Lincomicina                                                                                   |  | 300mg/ml        | Vial 2ml                                                                   | IM IV       | n   |      |               |    |                |           |
| n°545 | n609 S |  | P 03 A B | 02 Lindero (hexacloruro gamma-benzeno)                                                           |  | 1%              | Loción 60ml                                                                | Tópico      | s   |      |               |    |                |           |
| n°546 | n610 S |  | H 03 A A | 02 Lidronina                                                                                     |  | 25mg            | Comprimido                                                                 | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°547 | n611 S |  | N 05 A N | 01 Lito carbonato                                                                                |  | 300mg           | Cápsula o comprimido                                                       | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°548 | n612 S |  | L 01 A D | 02 Lomustina                                                                                     |  | 20mg            | Comprimido                                                                 | Oral        | n   |      |               |    |                |           |
| n°549 | n613 S |  | A 07 D A | 03 Loperamida clorhidrato                                                                        |  | 2mg             | Cápsula o comprimido                                                       | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°550 | n614 S |  | N 05 C D | 11 Loprazolam                                                                                    |  | 2mg             | Comprimido                                                                 | Oral        | n   |      |               |    |                |           |
| n°551 | n615 S |  | N 05 B A | 06 Lovacepam                                                                                     |  | 2mg             | Comprimido                                                                 | Oral        | n   |      |               |    |                |           |
| n°552 | n616 S |  | A 06 C D | 19 Magnesio citrato                                                                              |  | 88.16mg/ml      | 10 onzas                                                                   | Oral        | n   |      |               |    |                |           |
| n°553 | n617 S |  | B 05 X A | 05 Magnesio sulfato                                                                              |  | 10%             | Ampolla 10ml                                                               | IV          | s   |      |               |    |                |           |
| n°554 | n618 S |  | B 05 B C | 01 Manitol                                                                                       |  | 20%             | Frasco con equipo adaptable desectable para IV infusión intravenosa, 250ml | IV          | s   |      |               |    |                |           |
|       | n619 S |  | N 06 A C | 01 Maprotilina clorhidrato                                                                       |  | 25mg            | Cápsula o comprimido                                                       | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°555 | n620 S |  | P 02 C A | 01 Mebendazol                                                                                    |  | 100mg           | Comprimido                                                                 | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°556 | n621 S |  | L 02 A B | 02 Medroprogesterona                                                                             |  | 5mg             | Comprimido                                                                 | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°557 | n622 S |  | L 02 A B | 02 Medroprogesterona L.A.                                                                        |  | 150mg/ml        | Vial 1-2ml                                                                 | IM          | s   |      |               |    |                |           |
| n°558 | n623 S |  | L 02 A B | 02 Medroprogesterona L.A.                                                                        |  | 40mg            | Comprimido                                                                 | Oral        | s   |      |               |    |                |           |
| n°559 | n624 S |  | L 02 A B | 01 Megestrol acetato                                                                             |  | 40mg/ml         | Suspensión                                                                 | Oral        | n   |      |               |    |                |           |
| n°560 | n625 S |  | P 01 C B | 01 Meglutina antimonio                                                                           |  | 300 mg/ml       | Ampolla 5ml                                                                | IM          | s   |      |               |    |                |           |

24/01

|       |        |       | A.T. | IC | PRINCIPIO ACTIVO                             |  | CONCENTRACIÓN | PRESENTACIÓN                                                            | VIA        | CSS | MINSAL | H. S. I. T. Com. | NON | H. Psiquiátrico | H. L. Estancia |
|-------|--------|-------|------|----|----------------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|------------------|-----|-----------------|----------------|
| n°563 | n626 s | L 01A | A    | 03 | Meftalano                                    |  | 2mg           | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°564 | n627 s | L 01A | A    | 03 | Meftalano                                    |  | 50mg          | Vial                                                                    | IV         |     |        |                  |     |                 |                |
| n°565 | n628 s | M 01A | C    | 06 | Meloxicam                                    |  | 7.5 gm        | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°566 | n629 s | D 11A | A    | 00 | Mentol compuesto balsamo                     |  | 10-20%        | Tubo                                                                    | Tópico     |     |        |                  |     |                 |                |
| n°567 | n630 s | N 01B | B    | 03 | Mepivacaina sin vasoconstrictor              |  | 3%            | Tubo de vidrio 1.8ml, prellenado al vacío                               |            |     |        |                  |     |                 |                |
| n°568 | n631 s | L 01B | B    | 02 | Mercaptopurina                               |  | 50mg          | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°569 | n632 s | J 01D | H    | 02 | Meropenem                                    |  | 500mg         | Ampolla o vial                                                          | IV         |     |        |                  |     |                 |                |
| n°570 | n633 s | J 01D | H    | 02 | Meropenem                                    |  | 1g            | Vial                                                                    | IV         |     |        |                  |     |                 |                |
| n°571 | n634 s | V 03A | F    | 01 | Mesna                                        |  | 100mg/ml      | Ampolla 4ml                                                             | IV         |     |        |                  |     |                 |                |
| n°572 | n635 s | G 03B | B    | 01 | Mesterolona                                  |  | 25mg          | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°576 | n636 s | A 10B | A    | 02 | Metformina clorhidrato                       |  | 850mg         | Tableta ranurada                                                        | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°577 | n637 s | C 02A | B    | 02 | Melitilopa                                   |  | 250mg         | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°578 | n638 s | G 02A | B    | 01 | Melitonovina                                 |  | 0.2mg/ml      | Ampolla 1ml                                                             | IM IV      |     |        |                  |     |                 |                |
| n°579 | n639 s | N 06B | A    | 04 | Metilfenidato                                |  | 10mg          | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°581 | n640 s | H 02A | B    | 04 | Metilprednisolona succinato sódico           |  | 500mg         | Ampolla o vial, 5-10ml                                                  | IV         |     |        |                  |     |                 |                |
| n°582 | n641 s | A 03F | A    | 01 | Metoclopramida                               |  | 5mg/5ml       | Jarabe 90-125ml                                                         | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°583 | n642 s | A 03F | A    | 01 | Metoclopramida                               |  | 5mg/ml        | Ampolla 2ml                                                             | IM IV      |     |        |                  |     |                 |                |
| n°584 | n643 s | L 01B | A    | 01 | Metotrexato                                  |  | 1g            | Injectable                                                              | Parenteral |     |        |                  |     |                 |                |
| n°585 | n644 s | L 01B | A    | 01 | Metotrexato                                  |  | 25mg/ml       | Vial 2ml, solución isotónica parenteral libre de IM IT IV preservativos | IM IT IV   |     |        |                  |     |                 |                |
| n°586 | n645 s | L 01B | A    | 01 | Metotrexato                                  |  | 2.5mg         | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°587 | n646 s | G 01A | F    | 01 | Metronidazol                                 |  | 500mg         | Ovulo o Tableta vaginal                                                 | Vaginal    |     |        |                  |     |                 |                |
| n°588 | n647 s | P 01A | B    | 01 | Metronidazol                                 |  | 125mg/5ml     | Suspensión 120ml                                                        | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°589 | n648 s | P 01A | B    | 01 | Metronidazol                                 |  | 500mg         | Tableta ranurada                                                        | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°590 | n649 s | J 01X | D    | 01 | Metronidazol                                 |  | 500mg         | Vial o bolsa plástica (unibosis)                                        | IV         |     |        |                  |     |                 |                |
| n°591 | n650 s | L 04A | A    | 06 | Mifendolato mofetil                          |  | 250mg         | Cápsula                                                                 | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°592 | n651 s | N 05C | D    | 08 | Midazolam                                    |  | 5mg/ml        | Ampolla 3ml                                                             | IM IV      |     |        |                  |     |                 |                |
| n°593 | n652 s | N 05C | D    | 08 | Midazolam                                    |  | 7.5mg         | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°594 | n653 s | N 05C | D    | 08 | Midazolam                                    |  | 15mg          | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°595 | n654 s | A 02B | B    | 01 | Misoprostol                                  |  | 200mcg        | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°596 | n655 s | L 01D | C    | 03 | Mitomicina                                   |  | 5mg           | Ampolla o vial (polvo para reconstitución)                              | IV         |     |        |                  |     |                 |                |
| n°597 | n656 s | L 01D | B    | 07 | Mitoxantona                                  |  | 2mg/ml        | Vial 10ml                                                               | IV         |     |        |                  |     |                 |                |
| n°598 | n657 s | N 06A | G    | 02 | Moclobemide                                  |  | 150mg         | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°599 | n658 s | C 04A | D    | 03 | Modulador hemorreológico, tipo pentoxifilina |  | 400mg         | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°600 | n659 s | L 03A | A    | 03 | Mogranostin                                  |  | 150mcg/ml     | Vial                                                                    | IV SC      |     |        |                  |     |                 |                |
| n°601 | n660 s | L 03A | A    | 03 | Mogranostin                                  |  | 300mcg/ml     | Vial                                                                    | IV SC      |     |        |                  |     |                 |                |
| n°602 | n661 s | R 03D | C    | 03 | Montelukast                                  |  | 10mg          | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°603 | n662 s | R 03D | C    | 03 | Montelukast                                  |  | 5mg           | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |
| n°604 | n663 s | N 02A | A    | 01 | Morfina clorhidrato o sulfato                |  | 10mg/ml       | Ampolla, jeringuilla calibrada o vial, 1ml                              | IM IV SC   |     |        |                  |     |                 |                |
| n°605 | n664 s | N 02A | A    | 01 | Morfina sulfato                              |  | 15mg          | Comprimido                                                              | Oral       |     |        |                  |     |                 |                |

24/

|          |        |  | A | T  | C | PRINCIPIO ACTIVO | CONCENTRACIÓN | PRESENTACIÓN                                                                                 | MA | CSS | MINSA | H.S.T. Toms | ION | H. Psiquiátrico | H.L. Estancia | H. del N. |
|----------|--------|--|---|----|---|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------------|-----|-----------------|---------------|-----------|
| n°602    | n665 s |  | A | 11 | B | A                | 00            | Multivitaminas                                                                               |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°603    | n666 s |  | A | 11 | B | A                | 00            | Multivitaminas adultos                                                                       |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°604    | n667 s |  | A | 11 | B | A                | 00            | Multivitaminas con Minerales                                                                 |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°605    | n668 s |  | A | 11 | B | A                | 00            | Multivitaminas pediátricas                                                                   |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°606    | n669 s |  | S | 01 | G | A                | 01            | Malaxolona clorhidrato                                                                       |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°607    | n670 s |  | V | 03 | A | B                | 15            | Naloxona                                                                                     |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°608 EX | n671 s |  | M | 01 | A | E                | 02            | Naproxeno                                                                                    |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°609    | n672 s |  | J | 05 | A | E                | 04            | Nelfinavir                                                                                   |    |     |       |             |     |                 |               |           |
|          | n673 s |  | J | 05 | A | E                | 04            | Nelfinavir                                                                                   |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°610    | n674 s |  | N | 07 | A | A                | 01            | Neostigmina metilsulfato                                                                     |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°611    | n675 s |  | C | 08 | C | A                | 05            | Nifedipina                                                                                   |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| EX       | n676 s |  | C | 08 | C | A                | 05            | Nifedipina                                                                                   |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°612    | n677 s |  | C | 08 | C | A                | 06            | Nimetopina                                                                                   |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°613    | n678 s |  | C | 08 | C | A                | 06            | Nimetopina                                                                                   |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°614    | n679 s |  | A | 07 | A | A                | 02            | Nistatina                                                                                    |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°615    | n680 s |  | G | 04 | A | C                | 01            | Nitrofurantoina                                                                              |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°616    | n681 s |  | G | 04 | A | C                | 01            | Nitrofurantoina (macrocrisiales)                                                             |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°617    | n682 s |  | C | 02 | D | D                | 01            | Nitroglicerato sódico                                                                        |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°618    | n683 s |  | C | 01 | C | A                | 03            | Norepinefrina bitartrato                                                                     |    |     |       |             |     |                 |               |           |
|          | n684 s |  | J | 01 | M | A                | 01            | Oloxacina                                                                                    |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°619    | n685 s |  | N | 05 | A | H                | 03            | Olanzapina                                                                                   |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°620    | n686 s |  | B | 05 | X | A                | 30            | Oligoelementos o elementos trazas para adultos con zinc, cobre, manganeso, cromo y molibdeno |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°621    | n687 s |  | B | 05 | X | A                | 30            | Oligoelementos o elementos trazas para pediatría con zinc, cobre, manganeso                  |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°622    | n688 s |  | A | 02 | B | C                | 01            | Omeprazol                                                                                    |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°623    | n689 s |  | A | 02 | B | C                | 01            | Omeprazol                                                                                    |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°624    | n690 s |  | A | 02 | B | C                | 01            | Omeprazol                                                                                    |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°625 I  | n691 s |  | D | 06 | A | X                | 00            | Otros Antibióticos de uso tópico:                                                            |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°626 I  | n692 s |  | D | 06 | A | X                | 01            |                                                                                              |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°627 I  | n693 s |  | D | 06 | A | X                | 09            | Mupirocin                                                                                    |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°628    | n694 s |  | L | 01 | X | A                | 00            | Oxaliplatino                                                                                 |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°629    | n695 s |  | L | 01 | X | A                | 00            | Oxaliplatino                                                                                 |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°630    | n696 s |  | N | 03 | A | F                | 02            | Oxcarbazepina                                                                                |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°631    | n697 s |  | N | 03 | A | F                | 02            | Oxcarbazepina                                                                                |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°632    | n698 s |  | G | 04 | B | D                | 04            | Oxibutirina clorhidrato                                                                      |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°633    | n699 s |  | R | 01 | A | B                | 07            | Oximetazolina clorhidrato                                                                    |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°634    | n700 s |  | H | 01 | B | B                | 02            | Oxitocina sintética                                                                          |    |     |       |             |     |                 |               |           |
| n°635    | n701 s |  | L | 01 | C | D                | 01            | Paclitaxel                                                                                   |    |     |       |             |     |                 |               |           |

24/02

|       |           |             | A.T.C. | PRINCIPIO ACTIVO                                            |  | CONCENTRACIÓN   | PRESENTACIÓN                        | VIA           | CSS | MINS | ION | H. Psiquiátrico | H. del N |
|-------|-----------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----|------|-----|-----------------|----------|
| n°637 | n°02/s    | M 05 B A 03 |        | Pamidronato sódico                                          |  | 90mg            | Vial                                | IV            | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°638 | EX n°03/s | M 03 A C 01 |        | Pancuronio bromuro                                          |  | 2mg/ml          | Ampolla 2ml                         | IV            | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°639 | n°04/s    | A 03 A D 01 |        | Papaverina                                                  |  | 30-32.5mg/ml    | Vial 10ml                           | IM IV         | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°641 | n°05/s    | N 02 B E 01 |        | Paracetamol (Acetaminofén)                                  |  | 500mg           | Comprimido                          | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°642 | n°06/s    | N 02 B E 01 |        | Paracetamol (Acetaminofén)                                  |  | 250-300mg       | Supositorios pediatricos            | Rectal        | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°643 | n°07/s    | N 02 B E 01 |        | Paracetamol (Acetaminofén)                                  |  | 90-100mg/ml     | Gotas con gotero calibrado, 15-20ml | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°644 | n°08/s    | N 02 B E 01 |        | Paracetamol (Acetaminofén)                                  |  | 120-168mg/5ml   | Jarabe o solución                   | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°640 | n°09/s    | N 02 B E 51 |        | Paracetamol (Acetaminofén) con Codeína fosfato              |  | 300-325mg/30mg  | Comprimido                          | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°645 | n°10/s    | N 05 C X 00 |        | Passiflora                                                  |  | 500mg/5ml       | Solución                            | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°647 | n°11/s    | D 02 A X 00 |        | Pasta al agua                                               |  | 25%             | Suspensión                          | Tópico        | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°648 | n°12/s    | J 01 M A 03 |        | Pefloxacin                                                  |  | 400mg           | Comprimido                          | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°649 | n°13/s    | J 01 M A 03 |        | Pefloxacin                                                  |  | 80mg/ml         | Ampolla 5ml                         | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°650 | n°14/s    | L 01 X X 24 |        | Pegaspargase                                                |  | 750 IU/ml       | Vial 5ml                            | IM IV         | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°651 | n°15/s    | M 01 C C 01 |        | Penicilina                                                  |  | 250-300mg       | Cápsula o comprimido                | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°652 | n°16/s    | J 01 C F 00 |        | Penicilinas resistentes a beta-lactamasa                    |  |                 |                                     |               | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°653 | n°17/s    | J 01 C F 04 |        | Oxalilina sódica o, Cloxacilina sódica                      |  | 1g              | Vial                                | IV            | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°654 | n°18/s    | J 01 C F 02 |        |                                                             |  | 1g              | Vial                                | IV            | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°655 | n°19/s    | C 04 A D 03 |        | Pentoxifilina                                               |  | 20mg/ml         | Ampolla 15ml                        | IV            | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°656 | n°20/s    | N 05 A C 01 |        | Pericacina (Propicacina)                                    |  | 4%              | Gotas, frasco 10-30ml               | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°657 | n°21/s    | N 02 A B 02 |        | Pelidina (Nepidina)                                         |  | 50mg/ml         | Ampolla 2ml                         | IM IV         | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°658 | n°22/s    | S 01 E B 01 |        | Pilocarpina clorhidrato o nitrato                           |  | 2%              | Gotas oftálmicas, frasco 10-15ml    | Oftálmico     | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°659 | n°23/s    | S 01 E B 01 |        | Pilocarpina clorhidrato o nitrato                           |  | 4%              | Gotas oftálmicas, frasco 10-15ml    | Oftálmico     | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°660 | n°24/s    | R 05 D B 11 |        | Pipacetato                                                  |  | 40mg/ml         | Gotas 15ml                          | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°661 | n°25/s    | J 01 C R 05 |        | Piperacilina más Tazobactam                                 |  | 4g / 500mg      | Vial                                | IV            | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°662 | n°26/s    | P 02 C B 01 |        | Piparazina                                                  |  | 500mg/5ml       | Jarabe 120ml                        | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°663 | n°27/s    | P 02 X X 52 |        | Pirantei pantoato/Oxantei                                   |  | 250mg/250mg/5ml | Suspensión 15ml                     | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°664 | n°28/s    | J 04 A K 01 |        | Pirazinamida                                                |  | 500mg           | Comprimido                          | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°665 | n°29/s    | N 07 A A 02 |        | Pindostigmina bromuro                                       |  | 60mg            | Cápsula o comprimido                | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°666 | n°30/s    | A 11 H A 02 |        | Pindoxina (vit B6)                                          |  | 25mg            | Comprimido                          | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°667 | n°31/s    | P 01 B D 01 |        | Prinmetilina                                                |  | 35-41%          | Líquido, 10-25ml                    | Tópico        | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°574 | n°32/s    | G 01 A X 03 |        | Policresuleno (Metacresul sulfónico ácido con formaldehído) |  | 18mg/g          | Jalea, tubo con aplicador, 50g      | Vaginal       | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°575 | n°33/s    | G 01 A X 03 |        | Policresuleno (Metacresul sulfónico ácido con formaldehído) |  |                 |                                     |               | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°668 | n°34/s    | V 03 A E 01 |        | Polistireno sulfonato                                       |  | 2mEq/ml         | Pólv. 453.6g                        | Oral, Rectal  | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°669 | n°35/s    | B 05 X A 01 |        | Polistireno sulfonato                                       |  | 3Mru/ml         | Ampolla 10-20ml                     | IV (infusión) | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°670 | n°36/s    | B 05 X A 09 |        | Polisio fosfato                                             |  |                 | Vial                                | IV (infusión) | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°671 | n°37/s    | A 12 B A 05 |        | Polisio gluconato                                           |  | 20mEq/15ml      | Solución oral, 150-180ml            | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°672 | n°38/s    | G 03 E A 03 |        | Prasteron/estradiol                                         |  | 200mg/4mg       | Ampolla 1ml                         | IM            | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°673 | n°39/s    | C 02 C A 01 |        | Prazosina                                                   |  | 2mg             | Tableta ranurada                    | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°674 | n°40/s    | S 01 B A 04 |        | Prednisolona acetato                                        |  | 1%              | Gotas oftálmicas, frasco 5-15ml     | Oftálmico     | \$  | n    | n   | n               | n        |
| n°675 | n°41/s    | H 02 A B 06 |        | Prednisona                                                  |  | 50mg            | Comprimido                          | Oral          | \$  | n    | n   | n               | n        |

24/93-

|        |   |      | PRINCIPIO ACTIVO |    | CONCENTRACIÓN                                                 | PRESENTACIÓN         | VIA                                                                                                 | H. del N. |       |                 |     |
|--------|---|------|------------------|----|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|-----|
|        |   |      | A                | T  |                                                               |                      |                                                                                                     | CSS       | MINSA | H. S. To. Tomas | ION |
|        |   |      |                  |    |                                                               |                      |                                                                                                     |           |       |                 |     |
| n° 672 | S | 01 E | D                | 00 | Preparaciones antiglaucoma y mióticos. Parasympaticomiméticos |                      |                                                                                                     |           |       |                 |     |
| n° 673 | S | 01 E | B                | 09 | Acetilcolina cloruro, o                                       | 1:100                | Frasco de 1.5-2ml                                                                                   |           |       |                 |     |
| n° 674 | S | 01 E | D                | 02 | Calcitriol                                                    | 0.01%                | Frasco de 1.5-2ml                                                                                   |           |       |                 |     |
| n° 675 | S | 01 E | D                | 02 |                                                               | 100mg/ml             | Ampolla 2ml                                                                                         |           |       |                 |     |
| n° 676 | N | 01 B | A                | 02 | Procaina clorhidrato                                          |                      |                                                                                                     |           |       |                 |     |
| n° 677 | N | 01 B | A                | 02 | Procainamida clorhidrato                                      | 100mg/ml             | Ampolla 10ml                                                                                        |           |       |                 |     |
| n° 678 | N | 01 B | A                | 02 | Procainamida clorhidrato                                      | 250mg                | Cápsula o comprimido                                                                                |           |       |                 |     |
| n° 679 | N | 01 X | B                | 01 | Procainazina clorhidrato                                      | 50mg                 | Cápsula                                                                                             |           |       |                 |     |
| n° 680 | N | 06 A | D                | 02 | Pronelazina                                                   | 25mg/ml              | Ampollas                                                                                            |           |       |                 |     |
| n° 681 | N | 06 A | D                | 02 | Pronelazina                                                   | 25mg/ml              | Jarabe                                                                                              |           |       |                 |     |
| n° 682 | N | 06 A | D                | 02 | Pronelazina                                                   | 25mg/ml              | Ampolla 20ml                                                                                        |           |       |                 |     |
| n° 683 | N | 01 A | X                | 10 | Propofol                                                      | 10mg/ml              | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |
| n° 684 | N | 07 A | A                | 05 | Propranolol clorhidrato                                       | 40mg                 | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |
| n° 685 | N | 07 A | A                | 05 | Propranolol clorhidrato                                       | 1mg/ml               | Ampolla 1ml                                                                                         |           |       |                 |     |
| n° 686 | N | 07 A | A                | 05 | Propranolol clorhidrato                                       | 10mg                 | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |
| n° 687 | N | 03 A | B                | 14 | Proclonazina (Proclonazina) 0.5% o                            | 10mg/ml o 1.000 U/ml | Ampolla 5ml                                                                                         |           |       |                 |     |
| n° 688 | N | 01 H | A                | 04 | Proclonazina (Proclonazina) 0.5% o                            | 0.5%                 | Solución oftálmica, 10-15ml                                                                         |           |       |                 |     |
| n° 689 | N | 01 B | A                | 02 | Pseudoefedrina clorhidrato                                    | 60mg                 | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |
| n° 690 | N | 06 A | C                | 01 | Psyllium Plantago                                             | 49% (Mínimo)         | 200-250g (pote)                                                                                     |           |       |                 |     |
| n° 691 | N | 05 A | H                | 04 | Quetiapina fumarato                                           | 25mg                 | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |
| n° 692 | N | 05 A | H                | 04 | Quetiapina fumarato                                           | 100mg                | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |
| n° 693 | N | 01 B | A                | 02 | Ranitidina clorhidrato                                        | 300mg                | Cápsula o comprimido L.A.                                                                           |           |       |                 |     |
| n° 694 | N | 02 B | A                | 02 | Ranitidina clorhidrato                                        | 150mg/ml             | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |
| n° 695 | N | 02 B | A                | 02 | Ranitidina clorhidrato                                        | 150mg/ml             | Jarabe                                                                                              |           |       |                 |     |
| n° 696 | N | 02 B | A                | 02 | Ranitidina clorhidrato                                        | 50mg                 | Ampolla 1.5ml                                                                                       |           |       |                 |     |
| n° 697 | N | 02 B | A                | 02 | Ranitidina clorhidrato                                        | 50mg                 | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |
| n° 698 | N | 02 B | A                | 02 | Ranitidina clorhidrato                                        | 50mg                 | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |
| n° 699 | N | 03 A | B                | 13 | Reactivadores de la Acetilcolinesterasa:                      | 250mg/ml             | Ampolla o Vial                                                                                      |           |       |                 |     |
| n° 700 | N | 03 A | B                | 13 | Reactivadores de la Acetilcolinesterasa:                      | 20mg/ml              | Ampolla o Vial                                                                                      |           |       |                 |     |
| n° 701 | N | 03 A | B                | 13 | Reactivadores de la Acetilcolinesterasa:                      | 50mg/ml              | Ampolla o Vial                                                                                      |           |       |                 |     |
| n° 702 | N | 03 A | B                | 13 | Reactivadores de la Acetilcolinesterasa:                      | 300mg                | Cápsula o comprimido                                                                                |           |       |                 |     |
| n° 703 | N | 04 A | B                | 02 | Rifampicina                                                   | 100mg/5ml            | Jarabe o suspensión, 90-120ml                                                                       |           |       |                 |     |
| n° 704 | N | 04 A | B                | 02 | Rifampicina                                                   | 150mg/100mg          | Cápsula o comprimido                                                                                |           |       |                 |     |
| n° 705 | N | 04 A | B                | 20 | Rifampicina con Isoniazida                                    | 120mg/50mg/300mg     | Envase plástico (bolsa o Frasco), con equipo adaptable desechable para infusión intravenosa, 500ml  |           |       |                 |     |
| n° 706 | N | 04 A | B                | 20 | Rifampicina con Isoniazida y con Pirazinamida                 | 120mg/50mg/300mg     | Envase plástico (bolsa o Frasco), con equipo adaptable desechable para infusión intravenosa, 500ml  |           |       |                 |     |
| n° 707 | N | 05 B | B                | 00 | Ringer lactato                                                |                      | Envase plástico (bolsa o Frasco), con equipo adaptable desechable para infusión intravenosa, 1000ml |           |       |                 |     |
| n° 708 | N | 05 B | B                | 00 | Ringer lactato                                                |                      | Envase plástico (bolsa o Frasco), con equipo adaptable desechable para infusión intravenosa, 1000ml |           |       |                 |     |
| n° 709 | N | 05 A | X                | 08 | Risperidona                                                   | 1mg                  | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |
| n° 710 | N | 05 A | X                | 08 | Risperidona                                                   | 3mg                  | Comprimido                                                                                          |           |       |                 |     |







24/97

|       |    |        | A | T  | C   | PRINCIPIO ACTIVO | CONCENTRACIÓN            | PRESENTACIÓN | VIA                              | CSS    | MINSA | H.S.to.Tomás | ION | H.Psiquiátrico | H.L.Estancia | H.del N |
|-------|----|--------|---|----|-----|------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|--------|-------|--------------|-----|----------------|--------------|---------|
|       |    |        |   |    |     |                  |                          |              |                                  |        |       |              |     |                |              |         |
| n°806 |    | n806 s | C | 02 | D E | 01               | Verapamilo clorhidrato   | 40mg         | Comprimido                       | Oral   |       |              |     |                |              |         |
| n°807 | EX | n807 s | C | 02 | D E | 01               | Verapamilo clorhidrato   | 80mg         | Comprimido                       | Oral   |       |              |     |                |              |         |
| n°808 |    | n808 s | C | 02 | D E | 01               | Verapamilo clorhidrato   | 120mg        | Capsula o comprimido AP          | Oral   |       |              |     |                |              |         |
| n°809 |    | n809 s | C | 02 | D E | 01               | Verapamilo clorhidrato   | 2.5mg/ml     | Ampolla 2ml                      | IV     |       |              |     |                |              |         |
| n°810 |    | n810 s | N | 06 | A B | 01               | Vloxazina                | 50mg         | Capsula o comprimido             | Oral   |       |              |     |                |              |         |
| n°811 |    | n811 s | L | 01 | C A | 01               | Vinblastina sulfato      | 10mg         | Vial 10mg                        | IV     |       |              |     |                |              |         |
| n°812 |    | n812 s | L | 01 | C A | 02               | Vincristina sulfato      | 1mg          | Vial                             | IV     |       |              |     |                |              |         |
| n°813 |    | n813 s | L | 01 | C A | 04               | Vincelbine               | 60mg         | Vial                             | IV     |       |              |     |                |              |         |
| n°814 |    | n814 s | A | 11 | D B | 00               | Violeta genciana         | 2%           | Solución                         | Tópico |       |              |     |                |              |         |
| n°815 |    | n815 s | D | 08 | A X | 00               | Vitamina B1, B6 y B12    | 1000mg/ml    | Ampolla 1ml                      | IM IV  |       |              |     |                |              |         |
| n°816 |    | n816 s | A | 11 | D B | 00               | Warfena sódica           | 5mg          | Comprimido                       | Oral   |       |              |     |                |              |         |
| n°817 |    | n817 s | D | 08 | A G | 03               | Yodo                     | 2%           | Tintura                          | Tópico |       |              |     |                |              |         |
| n°818 |    | n818 s | J | 05 | A F | 01               | Zidovudina               | 10mg/ml      | Frasco 240ml                     | Oral   |       |              |     |                |              |         |
| n°819 |    | n819 s | J | 05 | A F | 01               | Zidovudina               | 10mg/ml      | Vial 20ml                        | IV     |       |              |     |                |              |         |
| n°820 |    | n820 s | D | 02 | A B | 00               | Zinc óxido               | 100mg        | Capsula                          | Oral   |       |              |     |                |              |         |
| n°821 |    | n821 s | D | 02 | A B | 00               | Zinc óxido y urea loción | 25%          | Pasta                            | Tópico |       |              |     |                |              |         |
| n°822 |    | n822 s | M | 05 | B A | 08               | Zoledrónico ácido        | 1%/1%        | Loción                           | Tópico |       |              |     |                |              |         |
|       |    |        |   |    |     |                  |                          | 4mg          | Vial                             | IV     |       |              |     |                |              |         |
|       |    |        |   |    |     |                  |                          | 10mg         | Comprimido o comprimido ramurado | Oral   |       |              |     |                |              |         |

## ANEXO I

## DE LOS COMPRIMIDOS

Los comprimidos son formas farmacéuticas sólidas que contienen uno o más ingredientes activos. Se obtienen por compresión simple o múltiple (en ciertos casos están moldeados) y pueden estar recubiertos o no. Están destinados habitualmente a la administración oral, pero también existen en esta presentación preparaciones para otras aplicaciones, como son implantes, comprimidos para inyecciones, irrigaciones o uso externo, comprimidos vaginales, etc. Estas preparaciones pueden exigir una formulación, un método de fabricación o una forma de presentación especiales, que correspondan a su uso particular. Por ese motivo tal vez no satisfagan ciertas secciones de la presente monografía.

Entre las distintas categorías de comprimidos existentes figuran los comprimidos solubles, los comprimidos efervescentes, los comprimidos para uso oral y los comprimidos de liberación modificada. A menos que se indique de otro modo en la monografía correspondiente, los comprimidos pueden tener líneas o marcas para romperlos, símbolos u otras señales. Deben ser suficiente duros para resistir la manipulación, incluidos el envasado, el almacenamiento y el transporte, sin aplastarse ni romperse.

Los comprimidos pueden contener excipientes tales como diluyentes, aglutinantes, agentes desintegrantes, deslizantes, lubricantes, sustancias capaces de modificar el comportamiento de las formas farmacéuticas y el ingrediente activo en el aparato gastrointestinal, productos colorantes y sustancias aromatizantes. Cuando se utilizan esos excipientes es necesario tener la seguridad de que no influyen desfavorablemente en la estabilidad, la tasa de disolución, la biodisponibilidad, la inocuidad o la eficacia del ingrediente o los ingredientes activos. No tiene que haber incompatibilidad entre cualquiera de los componentes de la forma farmacéutica.

**Tipos especiales de comprimidos:**

La mayoría de los comprimidos sin recubrir están fabricados de modo que no se modifique la liberación de los ingredientes activos. Al examinar con una lupa el corte aparece una estructura relativamente uniforme (comprimidos de una sola capa) o una estructura estratificada relativamente uniforme (comprimidos de capas múltiples), pero ningún signo de recubrimiento.

**Comprimidos solubles (comprimidos para soluciones):**

Los comprimidos solubles son comprimidos sin recubrir que se disuelven en agua para obtener una solución límpida.

**Comprimidos efervescentes:**

Los comprimidos efervescentes son comprimidos sin recubrir que contienen en general sustancias ácidas y carbonatos o bicarbonatos que reaccionan con rapidez en presencia de agua para liberar dióxido de carbono. Están destinados a la disolución o dispersión en agua antes de la administración.

**Comprimidos para uso en la boca (sublingual y bucal) y comprimidos masticables:**

Los comprimidos para uso de la boca y los comprimidos masticables no suelen estar recubiertos. Están formulados de modo que se produzcan la liberación lenta y la acción local del ingrediente o los ingredientes activos (por ejemplo comprimidos romboidales) o la liberación y absorción del ingrediente o los ingredientes activos debajo de la lengua (comprimidos sublinguales) o en otras partes de la boca (bucles) para obtener una acción general.

**Comprimidos recubiertos:**

Los comprimidos recubiertos son comprimidos revestidos de una o más capas de mezclas de sustancias tales como resinas naturales o sintéticas, polímeros, gomas, productos de relleno, azúcares, plastificantes, polioles, ceras, sustancias colorantes o aromatizantes y a veces también ingredientes activos. Examinado con una lupa, el corte muestra un núcleo rodeado por una capa continua de distinta estructura.

Los comprimidos pueden estar recubiertos por distintos motivos, como la protección de los ingredientes activos contra el aire, la humedad o la luz, el enmascaramiento de sabores y olores desagradables o la mejora del aspecto. La sustancia utilizada para el recubrimiento suele aplicarse como solución o suspensión.

Pueden diferenciarse tres categorías principales de comprimidos recubiertos de azúcar, recubiertos de una lámina y ciertos comprimidos de liberación modificada.

#### **Comprimidos recubiertos de azúcar.**

#### **Comprimidos recubiertos de una lámina:**

Un comprimido recubierto de una lámina está revestido de una capa fina de resina, polímeros y/o sustancias plastificantes capaces de formar una lámina.

#### **Comprimidos de liberación modificada:**

Los comprimidos de liberación modificada son comprimidos recubiertos, sin recubrir o de matriz que contienen excipientes o están preparados por procedimientos que, separados o en conjunto, se hallan destinados a modificar la tasa de liberación del ingrediente o los ingredientes activos en el tracto gastrointestinal.

#### **Comprimidos de liberación prolongada:**

Los comprimidos de liberación prolongada están ideados para que la liberación del ingrediente o los ingredientes activos en el tracto gastrointestinal sea más lenta.

En las monografías correspondientes se indican todos los requisitos para estas formas farmacéuticas especializadas.

#### **Comprimidos de liberación retardada (comprimidos de cubierta entérica):**

Los comprimidos de liberación retardada están destinados a resistir el jugo gástrico y a desintegrarse en el líquido intestinal. Ello se consigue utilizando sustancias de recubrimiento tales como el celcafato (acetato de almidón de celulosa) y copolímeros aniónicos del ácido metacrílico y de sus ésteres. En algunos casos es necesario aplicar más de una capa.

## **ANEXO II DE LAS RECETAS**

### **ASPECTOS GENERALES DE LAS RECETAS:**

La Ley 1 de 10 de enero de 2001, publicada en Gaceta Oficial No. 24,344 de 13 de julio de 2001, que trata sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, establece en términos generales todo lo concerniente a la receta médica. Entre algunos aspectos importantes señala que la Autoridad de Salud clasificará los productos farmacéuticos para los efectos de su expendio en varias categorías, como lo son:

- De venta con presentación de receta especial numerada, que sólo pueden ser dispensados en farmacias.
- De venta bajo receta médica, que sólo pueden ser dispensados en farmacias.
- De venta sin receta médica, que sólo pueden ser dispensados en farmacias y botiquines de pueblo.

- Medicamentos de venta popular o sin receta médica, que pueden ser comercializados en establecimientos farmacéuticos (artículo 90).

De igual forma, en la ley antes citada se dispone que el profesional médico debe prescribir en letra legible, a fin que el farmacéutico pueda comprender claramente cuál es el medicamento recetado. En el caso que la letra no sea legible el farmacéutico debe abstenerse de dispensar el medicamento y consultar con el médico suscriptor de la receta (artículo 148).

Entre otros aspectos importantes que recoge la ley de medicamentos se encuentra la prohibición de venta ambulatoria de medicamentos y obligación de las farmacias privadas de colocar en un sitio visible un letrero que indique que el usuario que adquiera un medicamento de los regulados que se venda sin receta médica lo hace bajo su responsabilidad (artículos 85 y 151).

Por otro lado el Decreto Ejecutivo 178 de 12 de julio de 2001 que reglamenta la Ley 1 de 10 de enero de 2001 regula, de manera específica en un capítulo, lo relativo a la receta y, dispone en uno de sus artículos (304), los aspectos generales de la receta, indicando que toda receta debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a. Nombre de la institución de salud pública o privada o del médico que prescribe
- b. Nombre completo del paciente, edad, y fecha de prescripción.
- c. Número de seguro social (opcional si lo tiene).
- d. Nombre genérico y comercial del producto (este último es opcional).
- e. Concentración o potencia, forma farmacéutica, vía de administración, cantidad, dosis del producto y días de tratamiento. La cantidad de dosis recetada debe coincidir con los días de tratamiento.
- f. Nombre completo, número de registro profesional, especialidad y teléfono del médico prescriptor. Estos datos deben estar escritos en letra imprenta legible o a través de un sello litografiado.
- g. Instrucciones de uso.
- h. Firma por puño y letra y con tinta del médico prescriptor.
- i. La receta institucional deberá llevar el sello de la unidad ejecutora donde se expide.

Está prohibido colocar en la receta la frase "Uso indicado" o similar.

Es importante destacar que las farmacias y los farmacéuticos deben rechazar las recetas que no cumplan con los requisitos generales que establece la reglamentación del ya citado Decreto Ejecutivo 178 de 12 de julio de 2001 (artículo 311).

Igualmente, el decreto antes señalado dispone que las recetas tienen una vigencia de treinta días calendarios, contados a partir de la fecha de prescripción para ser presentadas en la farmacia, excepto los productos farmacéuticos con contenido de psicotrópicos, estupefacientes y antibióticos no tópicos. Los dos primeros sólo pueden ser prescritos, uno por receta y no deben ser dispensados después de pasadas las cuarenta y ocho (48) horas desde su prescripción, esto aplica tanto a las farmacias privadas como a las estatales, mientras que las recetas de los antibióticos no tópicos tendrán una vigencia de tres días (artículos 305, 306, 307 y 321). Las prescripciones de sustancias estupefacientes que deban ser aplicados por vía parenteral sólo se despacharán para cuarenta y ocho (48) horas. Se exceptúan de esta disposición las recetas de los médicos oncólogos y anestesiólogos que prescriben para pacientes con cáncer, para los cuales se permitirá que la prescripción sea por diez (10) días (artículo 324).

Las recetas dispensadas deben ser firmadas al reverso por el farmacéutico que las dispuso o, en su defecto por el dispensador (esto sólo hasta tanto la farmacia cuente con farmacéutico en el horario declarado de atención al público). Cuando el farmacéutico

dispense una alternativa terapéutica de la lista de medicamentos intercambiables de la Autoridad de Salud, está en la obligación de colocar en el reverso de la receta el nombre del medicamento, su firma y número de registro (artículos 308 y 309). En el caso de las recetas extendidas por médicos internos sólo serán aceptadas y atendidas en las farmacias de la institución donde están recibiendo entrenamiento. Estas recetas deben cumplir con los requisitos establecidos en la reglamentación, excepto el número de registro profesional (artículo 310).

Otro aspecto relevante es que las recetas dispensadas en las farmacias deben ser archivadas cronológicamente, estar enumeradas y reposar en el establecimiento, por el término de un (1) año como mínimo. En los casos que la receta no sea dispensada en su totalidad en la farmacia, el farmacéutico debe seguir el siguiente procedimiento:

- a. Dispensará la cantidad solicitada.
- b. Retendrá la receta original en la farmacia y emitirá para uso del paciente una copia o, emitirá una transcripción textual de la prescripción. En los documentos (original, copia o transcripción textual de la receta) se colocará un sello que identifique a la farmacia, el cual debe contener lo siguiente:
  1. Fecha.
  2. Nombre y número de licencia de la farmacia.
  3. Nombre y cantidad de el o los productos dispensados.
- c. Debajo del sello de la farmacia a cada documento se le colocará el sello que identifique al farmacéutico, indicando su nombre y número de registro. Todos los documentos deben ser firmados por el farmacéutico que brinda el servicio, en original y con tinta.
- d. De ser necesarios para completar el tratamiento, los farmacéuticos sólo podrán emitir una copia o una transcripción textual de la copia del original de la receta, si el despacho de la misma ha sido parcial.
- e. Todo farmacéutico está en la obligación de enumerar las copia o las transcripciones textuales de la receta, es decir, después de la original sigue la primera copia, al dispensar ésta sigue la segunda. En el extremo superior derecho de las copias o de las transcripciones textuales debe aparecer la leyenda primera o segunda copia según sea el caso.
- f. En todas las copias o transcripciones textuales debe aparecer lo indicado en el punto b, c y e precitados.
- g. Todo farmacéutico es responsable de la explicación al usuario y de los pasos secuenciales antes descritos.
- h. Las copias o las transcripciones textuales de las recetas refrendadas por los farmacéuticos deben ser aceptadas en todas las farmacias privadas y estatales del país. Estas copias o las transcripciones textuales tendrán la misma validez que una receta original.
- i. La emisión de copias o transcripciones textuales de la receta no aplica para productos con contenido de psicotrópicos y estupefacientes (artículos 311 y 312).

#### DE LAS RECETAS DE USO PROLONGADO

En el caso de padecimientos crónicos el médico prescriptor utilizará la receta de uso prolongado, la cual es válida para tres (3) prescripciones de un mismo medicamento correspondiente a tres (3) meses de tratamiento (artículo 313).

Las recetas que emitan las instituciones de salud estatal para uso prolongado se les dará curso por medio un formato especial, el cual debe cumplir con los requisitos generales indicados en esta reglamentación. Estas deben incluir la leyenda "Receta de uso prolongado". El formato debe contener tres recetas idénticas enumeradas, 1 para la primera, 2 para la segunda y 3 para la tercera. En el caso de las instituciones de salud privadas, éstas podrán usar para las recetas de uso prolongado los formatos usuales,

siempre que cumpla con los requisitos generales de la receta de uso prolongado y tendrá que emitir tres recetas idénticas enumeradas, uno (1) para la primera, dos (2) para la segunda y tres (3) para la tercera, en la cual se debe escribir con letra legible la frase "Uso Prolongado." En todos los casos, en las recetas se deberá colocar la fecha aproximada en que se harán efectivas las mismas. Estas recetas de uso prolongado no aplican para medicamentos con contenido de psicotrópicos, estupefacientes, antibióticos, ni para los productos sujetos a control nacional (artículos 313, 314, 315, 316 y 317).

#### **DE LA RECETA DE SUSTANCIAS CONTROLADAS:**

Sustancias controladas son aquellas que están incluidas en los listados de los convenios internacionales de psicotrópicos, estupefacientes y sustancias utilizadas frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y cualquiera otra sustancia que por su naturaleza el Ministerio de Salud decida someter a controles especiales (artículo 318).

En las prescripciones de productos con contenido de psicotrópicos y estupefacientes deberán cumplir con los requisitos generales exigidos en la reglamentación (D.E. 178 de julio de 2001). El farmacéutico que dispense estos productos está en la obligación de indicar en la parte de atrás de la receta el nombre comercial del producto que dispensó, además debe estampar su firma y colocar el número de su registro. De igual forma debe aparecer el nombre y número de cédula de quien retire el producto (artículos 319 y 320). En el caso que el paciente no puede comprar la totalidad del medicamento con contenido de psicotrópicos y estupefacientes indicado en la receta, se permitirá que la farmacia despache parcialmente, según la dosificación prescrita. La persona que recibe el producto, deberá firmar en el revés de la receta las veces que retire el producto, indicando el número de la cédula, fecha y cantidad retirada. En cada retiro el farmacéutico debe firmar (artículo 322).

Los productos con contenido de estupefacientes deben ser prescritos en los recetarios oficiales del Ministerio de Salud. Se exceptúa de esta disposición las instituciones de salud estatales sin embargo, tendrán la obligación de incluir en las que utilicen, tanto el color como la información de las reconocidas como oficiales (artículo 323).

En el caso de las prescripciones de sustancias estupefacientes que deban ser aplicadas por vía parenteral sólo se despacharán para cuarenta y ocho (48) horas. Se exceptúa de esta disposición las recetas de los médicos oncólogos y anesthesiólogos que prescriben para pacientes con cáncer, para los cuales se permitirá que la prescripción sea por diez (10) días (artículo 324). Pero cuando se trate de prescripciones de sustancias estupefacientes que deban ser aplicadas por cualquiera vía que no sea la parenteral, podrán prescribirse por un total de diez (10) días, a excepción de los médicos oncólogos y anesthesiólogos que receten para pacientes con cáncer, que podrán prescribir para un máximo de veinte (20) días (artículo 324 y 325).

Todos los productos con contenido de psicotrópicos se prescribirán en recetarios color blanco por un máximo de treinta (30) días y los barbitúricos pueden ser prescritos para un máximo de noventa (90) días. Sin embargo, los médicos veterinarios y odontólogos solamente podrán prescribir tratamientos con sustancias psicotrópicas para un máximo de cinco días, las recetas emitidas por médicos veterinarios debe indicar el nombre de la especie y el propietario del animal, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos generales establecidos en las normas respectivas. Adicionalmente el propietario del animal debe firmar en el revés de la receta e indicar su número de cédula (artículos 326, 327 y 328).

**DE LA VENTA DE PRODUCTOS CON Y SIN RECETA MÉDICA:**

Los productos farmacéuticos que requieran de receta médica para su dispensación o venta y que sean dispensados en un envase diferente al original, así como los dispensados en envases originales, deben ser identificado con un marbete o etiqueta que señale lo siguiente:

- Nombre y dirección de la farmacia
- Nombre del paciente
- Nombre y concentración en el caso de monofármacos; no aplica para los dispensados en envases originales.
- Instrucciones del médico para su uso.
- Fecha de vencimiento del producto, no aplica para los dispensados en envases originales.
- Nombre del médico prescriptor.
- Firma o iniciales del farmacéutico que dispensa.

Lo indicado en el punto g antes señalado será de estricto cumplimiento a los cinco (5) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1 de 10 de enero de 2001 (artículo 329 del Decreto Ejecutivo No. 178 de 12 de julio de 2001).

En el caso de los productos que se venden sin receta médica, que sean dispensados en las farmacias en un envase diferente al original deben ser identificados con un marbete o etiqueta que señale lo siguiente:

- a. Nombre y dirección de la farmacia.
- b. Nombre y concentración del producto (la concentración solo aplica para monofármacos).
- c. Fecha de vencimiento del producto.
- d. Será responsabilidad del farmacéutico informar al paciente sobre el uso correcto del medicamento (artículo 330).

Los botiquines y establecimientos no farmacéuticos autorizados por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas solo pueden vender y dispensar productos farmacéuticos de venta popular de acuerdo al listado establecido para cada tipo de establecimiento, siempre y cuando el producto esté presentado en envases de unidosis o en forma integral y tenga escrita toda la información exigida para estos productos, de modo que el consumidor tenga acceso a la información (artículo 331).

**ANEXO III****DE LA FARMACOVIGILANCIA**

Al promulgarse la Ley No.1 de 10 de enero de 2001 se estableció la competencia de la Autoridad de Salud, a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, de fiscalizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos amparados por esa Ley.

El artículo 60 de la Ley 1 de 2001 establece la obligación por parte de los laboratorios fabricantes, los proveedores de medicamentos y todo el personal médico, científico y técnico de notificar\* de inmediato a la Autoridad de Salud, sus sospechas de reacciones adversas y fallas farmacéuticas y terapéuticas que pueden haberse derivado por o durante el uso de los medicamentos y productos farmacéuticos, que se fabriquen o comercialicen en Panamá. Con ésta finalidad se creó el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, adscrito a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, el cual tendrá bajo su consideración los siguientes puntos:

1. La competencia en el ámbito internacional, nacional, regional y local que involucre principalmente a la Caja de Seguro Social, al Ministerio de Salud, a la Universidad de Panamá y a la empresa privada.

2. El desarrollo y actualización del manual de procedimiento.
3. La participación de profesionales de la salud, pacientes, consumidores e industria farmacéutica.
4. La existencia de compromiso institucional de participación activa y coordinación intersectorial.
5. La creación de un sistema de información.
6. La confidencialidad.
7. El personal capacitado y con dedicación exclusiva.
8. El financiamiento.

El Decreto Ejecutivo No.178 de 12 de julio de 2001, mediante el cual se reglamenta la Ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, hace referencia al Sistema Nacional de Farmacovigilancia estableciendo sus objetivos, componentes, fuentes de información y recepción de datos; crea a su vez el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) y señala sus objetivos y funciones, así como las bases para la formación de los Centros Regionales o Institucionales de Farmacovigilancia para el funcionamiento del sistema (artículos 205 al 216).

El Decreto Ejecutivo No.178 de 2001 obliga a su vez a las agencias distribuidoras y a los fabricantes nacionales y extranjeros a enviar al CNFV las notificaciones de las sospechas de reacciones adversas serias, dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de su conocimiento. Concede también a los profesionales de la salud siete (7) días hábiles, a partir de su conocimiento, para enviar a los Centros Regionales o Centros Institucionales de Farmacovigilancia las notificaciones de las sospechas de reacciones adversas.

De igual forma establece el Decreto Ejecutivo No. 178 la responsabilidad de los fabricantes nacionales y extranjeros después de vigilar, recopilar e investigar la información acerca de las reacciones adversas; actualizar la información evaluada y verificada al registro sanitario del producto y a la información para prescribir de los profesionales de la salud. Exige a su vez a las agencias distribuidoras y a los fabricantes nacionales y extranjeros que tienen el deber de enviar la información que sobre seguridad, calidad y eficacia le solicite la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que esté relacionada con farmacovigilancia, a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Es importante señalar que las notificaciones de reacciones adversas, falla farmacéuticas y terapéuticas, deben hacerse en los formularios correspondientes que se dispongan para tal fin, los cuales estarán destinados a:

1. Los profesionales de la salud y pacientes quienes lo remitirán en primera instancia a los Centros Regionales e Instituciones de Farmacovigilancia y en segunda instancia directamente al CNFV.
2. Las empresas distribuidoras y fabricantes lo enviarán directamente al CNFV.

El centro nacional y los centros regionales o institucionales de Farmacovigilancia contarán con un manual de procedimientos elaborado por los funcionarios del Centro, los cuales deber ser previamente aprobados por el Centro Nacional de Farmacovigilancia.

**\*Nota:** Se hace la aclaración que la notificación por sospecha no es una acusación contra un determinado producto o empresa, por lo que la persona que efectúa la notificación no está obligada a probar nada, ni es parte del proceso. Consideramos entonces, que debe establecerse el mecanismo interno para asignarle códigos al personal que permitan el grado de confidencialidad necesario para su eficiente desempeño, sin injerencias de tipo comercial. La parte interesada únicamente debe conocer los hechos que han motivado las sospechas y presentar las pruebas que consideren pertinentes a su favor.

## ANEXO IV

**DE LA INFORMACIÓN, PUBLICIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE  
PRESENTAR EQUIVALENTES TERAPÉUTICOS**

La Ley 1 de 10 de enero de 2001 establece una serie de normas en relación a la información y publicidad de los productos que regula, los cuales trataremos de resumir de la siguiente forma:

Existe la obligación de informar al consumidor por parte del fabricante, por parte del profesional farmacéutico y por parte del médico. En cuanto a los profesionales farmacéuticos, tanto los que laboran en establecimientos públicos como privados, deben acogerse a las buenas prácticas de farmacia adoptadas por la Autoridad de Salud, siendo la información y orientación al usuario de fundamental importancia, por lo que se hace necesaria la presencia de un profesional farmacéutico idóneo durante todo el tiempo que el establecimiento permanezca abierto al público, sin perjuicio del período de gracia establecido en el artículo 86 de la Ley.

Otra de las obligaciones dispuestas en la Ley 1 de 2001, en cuanto a los médicos y farmacéuticos, es la de ofrecer al consumidor alternativas de medicamentos que sean equivalentes terapéuticos del prescrito de acuerdo a la lista de la Autoridad de Salud de medicamentos intercambiables, para lo cual, en el caso del médico, deberá señalar el nombre genérico y opcionalmente el comercial entre paréntesis y, en el caso del farmacéutico deberá dejar su firma y código al reverso de la receta. Para estos efectos la Autoridad de Salud implementará la sustitución de genéricos a través de equivalencias terapéuticas a la vez que brinda capacitación a médicos, farmacéuticos y consumidores.

La lista nacional de equivalentes terapéuticos será elaborada por la Autoridad de Salud a fin que, los fabricantes de medicamentos y productos farmacéuticos divulguen ésta al consumidor (inclusive por medios masivos de difusión), así como los equivalentes terapéuticos de un producto con otro y si quisieran además, su precio. Esto debe hacerse de manera estrictamente objetiva. En estos casos la información deberá indicar, de manera obligatoria, que estos productos se venden bajo receta médica.

Sólo los productos farmacéuticos, de venta popular, que tengan registro en el país, pueden ser objeto de publicidad, previa autorización de la Comisión de Publicidad y Propaganda del Ministerio de Salud.

Ningún producto de venta bajo receta médica podrá portar publicidad en el envase, rótulos, insertos, empaques o prospectos. Excepcionalmente se puede presentar la difusión de la información en recordatorios dirigidos a los profesionales que lo prescriben (médicos) y los que lo dispensan (farmacéuticos), a través de los profesionales médicos de las casas farmacéuticas. Si se trata de publicidad gráfica, debe hacerse únicamente por medio de revistas especializadas o proyectos que contengan información técnica y científica.

Asimismo, está prohibido influir al consumidor, por medio de promocionar o incentivos, a la adquisición o uso de medicamentos de forma no racional, así como la venta de muestras médicas. Sólo se podrá promocionar productos farmacéuticos por parte de profesionales de la salud.

Finalmente, la Ley 1 de 10 de enero de 2001 establece sanciones para quienes:

- a. Incumplan la obligación de informar al consumidor sobre la existencia de equivalentes terapéuticos que aparezcan en la lista elaborada por la Autoridad de Salud.
- b. Infrinjan las normas de publicidad de dicha Ley.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**Clasificación y nomenclatura:**

1. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. *Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification index*. 1996.
2. Programa Regional de Medicamentos Esenciales. *Clasificación Internacional de Medicamentos*, propuesta por el Programa de Medicamentos Esenciales. PNSP/87-05. Washington D.C. OPS. 1987.
3. USP. *Dictionary of USAN and International Drug Names*. 2001.
4. International nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances. World Health Organization, Geneva. 1996.
5. PHYSICIAN ICD 9 CM. Volumes 1&2. MEDICODE. 1997.

**Formularios terapéuticos:**

1. U.S. PHARMACOPOEIA. NATIONAL FORMULARY. USP 23. NF 18. 1995.
2. British Pharmacopoeia. 1993.
3. Joint Formulary Committee. *British National Formulary (BNF)*. London. British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain.
4. Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares. Instituto Catalán de Farmacología. *Guía farmacológica para la Asistencia Primaria*. 1987. Ministerio de Sanidad y Consumo. 1987.

**Textos de consulta en información sobre medicamentos:**

1. Drug Information Division. *USP-DI volumes I- II- III. Drug information for the health care professional*, 16<sup>th</sup> ed. Rockville. MD. United States Pharmacopeial Convention. 1996.
2. AMA. Division of Drugs. *AMA drug evaluations annual 1995*. Milwaukee, WI: American Medical Association. 1995.
3. Dukes MNG (ed.). *Meyler's side effects of drugs*. 12<sup>ve</sup> edition. Amsterdam: Elsevier Science Publishers. 1992.
4. Goodman Gilman A, Rall T.W., Nies A.A., Taylor P. (eds). *Goodman and Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 8<sup>th</sup> edition. Pergamon Press. New York. 1998.
5. Grahame-Smith and Aronson. *Oxford Textbook of Clinical Pharmacology and Drug Therapy*. 2<sup>nd</sup> edition. Oxford University Press. 1992.
6. Reynolds J.E.F. (ed.). *Martindale the extra pharmacopeia*. 30<sup>th</sup> edition. London. The Pharmaceutical Press. 1993.
7. DiPiro, Talbert, Hayes, Yee, Matzke and Posey. *PHARMACOTHERAPY. A Pathophysiologic Approach*. 2<sup>nd</sup> edition. Appleton and Lange. Norwalk, Connecticut, USA. 1993.
8. Boards of Directors of the American Society of Health-System Pharmacists. *AMERICAN HOSPITAL FORMULARY SERVICE (AHFS)*. 1995.
9. M<sup>c</sup>Cormack, Brown, Levine, Rangno and Ruedy. *Drug Therapy Decision Making Guide*. W.B.Saunders Company. Philadelphia, Pennsylvania. 1996.

10. Management Sciences For Health in collaboration with the WHO Action Programme on Essentials Drugs. *Managing Drug Supply. The Selection, Procurement, Distribution and the Use of Pharmaceuticals*. 2<sup>nd</sup> edition, revised and expanded. 1997.
11. Farmacología básica y clínica. Bertram G. Katzung. Manual Moderno. 1999.
12. Examination & Board Review Pharmacology. Bertram G. Katzung and Anthony J. Trevor. 5 Edition. Appleton & Lange. 1998.
13. Oncology Drug Information. 3<sup>rd</sup> Edition. 1999 and 2000. USP DI.
14. Farmacología integrada. Page, Curtis, Sutter, Walker and Hoffman. Harcourt Brace. 1998.
15. Clinical Anaesthesia. Carl L. Gwinnutt. Blackwell Science. 1996.
16. Therapeutic Drugs. Colin Dollery. Churchill Livingstone. 1999.
17. Remington Farmacia. Alfonso R. Gennaro. 19 Edición. Editorial Médica Panamericana.
18. Appleton & Lange's Drug Guide. MT Shannon, BA Wilson, CL Stang. Appleton & Lange. Stamford, Connecticut. 1998.
19. American Drug Index. NFBillups, SMBillups. 43<sup>o</sup> Edition. Facts and Comparisons. Wolter Kluwer. 1999.
20. Naranjo C: Métodos en Farmacología Clínica, OMS/OPS, 1992
21. Page, Curtis y col.: Farmacología Integrada, 1<sup>a</sup> Ed., Hartcort Brace, 1998

#### Boletines farmacoterapéuticos:

1. Medicamentos y Terapéutica: *Drug and Therapeutics Bulletin, The Medical Letter and Adverse Drug Reaction Bulletin*, en español. OPS y Fundación Panamericana de la Salud y Educación.
2. UNICEF in cooperation with USP. Guidelines on the Rational Use of Drugs in Basic Health Services. *The Prescriber*.
3. ISDB. *Newsletter*.
4. FDA *Medical Bulletin*.
5. Association Mieux Prescrire: *La revue Prescrire*. Paris. France. Association Mieux Prescrire.
6. Istituto Mario Negri e Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale. *Ricerca & Pratica (R & P)*. Il Pensiero Scientifico Editore s.r.l. Roma. Italia.
7. Centro Andaluz de Información de Medicamentos (CADIME). *Boletín Terapéutico Andaluz*. Granada. España.
8. Conselleria De Sanitat i Consum. Direcció General del Servei Valencià de Salut. *Boletín Terapéutico Valenciano*. Valencia. España.
9. Danish Medical Association and Danish Medical Society. *Danish Medical Bulletin*. Journal of the Health Sciences.
10. Australian *Adverse Drug Reaction Bulletin*.

11. INRUD News. Newsletter of the International Network for Rational Use of Drugs. Management Sciences for Health. USA.
12. Health Research Group. Public Citizen. *Worst Pills Best Pills News*.

**Otros:**

1. OPS. *Elaboración y Utilización de Formulario de Medicamentos*. Publicación Científica N° 474. Washington D.C. OPS/OMS. 1984.
2. US Department of Health and Human Services. Public Health Service. FDA. Center for Drug Evaluation and Research. Office of Management. *Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations*. Division of Drug Information Resources. 1996.
3. J. Isselbacher, E. Braunwald, J.D. Wilson, J.B. Martin, A.S. Fauci and D.L. Kasper (editors). *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 13<sup>th</sup> edition. McGraw-Hill. 1994.
4. C.R. W. Edwards, I.A.D. Bouchier, C. Haslett and E.R. Chilvers. *Davidson's Principles and Practice of Medicine*. Churchill Livingstone. Edinburg, U.K. 17<sup>th</sup> edition.
5. Mark R. Dambro. *GRIFFITH. Los 5 minutos clave en la consulta de atención primaria*. Waverly Hispánica S.A. Editorial Médica. Barcelona, España. 1996.
6. Swedish Medical Products Agency (MPA) and Norwegian Medicines Control Authority (NMCA). *Workshops*.
7. Uso de los Medicamentos en la Clínica. Consejo de Salubridad General. Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. McGraw-Hill Interamericana. 1999.
8. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Quinta Edición. 1988.
9. Internet:
  - a. US Food and Drug Administration (FDA) Center for Food Safety and Nutrition: <http://nm.cfsa.fda.gov/list.html>
  - b. UK Institute of Food Science and Technology: <http://www.easynet.co.uk/ifst/world>
  - c. Health Organization: <http://www.who.ch/>
  - d. Martindale's Virtual medical center: <http://www.-sci.lib.uciedu/Martindete/Medici.html>
  - e. The Virtual Hospital <http://cm.m.info.nih.gov/Modeling/drugbank.html>
  - f. 3.D Drug structure databank: <http://cm.m.info.nih.gov/Modeling/drugbank.html>
  - g. Australian Prescriber: <http://www.australianprescriber.com>
  - h. U.S. National Library of Medicine: <http://igm.nlm.nih.gov>
  - i. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente: <http://www.cepis.org.pe>

**BIBLIOGRAFÍA DEL HOSPITAL LARGA ESTANCIA.**

1. Quimioterapia de la Lepra OMS 1994.

2. Comité de Expertos de la OMS en la Lepra Séptimo Informe 1998
3. Atención de los Ancianos un desafío para los años noventa 1994
4. Guía para la atención de las Enfermedades Prevalentes a Nivel Hospitalario 1999. Ministerio de Salud.
5. Normas de vigilancia epidemiológica 2001.
6. Diccionario médico enciclopédico Taber's
7. British Pharmacopoeia
8. The Pharmaceutical Codees, page 380.

**SEGUNDO:** Remitir copia de la presente resolución al Comité Técnico Nacional Interinstitucional y a la Comisión Nacional de Registro Nacional de Oferentes para su posterior evaluación y adecuación, según los criterios de selección homologados que se acuerden implementar.


**TERCERO:** Recomendar al Comité Técnico Nacional Interinstitucional la evaluación del informe final presentado por la Comisión Nacional de Homologación para una eficaz agilización de su labor.

**CUARTO:** Está resolución empezará a regir a partir de su aprobación.

Fundamento de Derecho: Resolución No.106 de 29 de marzo de 2000.

Dado en la ciudad de Panamá a los 12 días del mes de marzo de 2002.

**COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

  
**FERNANDO GRACIA GARCÍA**  
Ministro de Salud



**CONSEJO DE GABINETE  
DECRETO DE GABINETE N° 16  
(De 23 de abril de 2003)**

**"Por el cual se modifican fracciones al Arancel Nacional de Importación"**

**EL CONSEJO DE GABINETE**  
En uso de sus facultades constitucionales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Gobierno Nacional, es consciente de su obligación de fortalecer e incentivar la producción nacional en términos de competitividad, eficiencia, sostenibilidad y equidad al sector agropecuario y agroindustrial.

Que de conformidad con la Ley 23 de 15 de julio de 1997 "Por la cual se aprueba el Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio; el Protocolo de Adhesión de Panamá a dicho Acuerdo junto con sus anexos y lista de compromisos; se adecua la legislación interna a la normativa internacional y se dictan otras disposiciones" se deben respetar los compromisos en ella adquiridos.

Que de conformidad con el Ordinal 7 del Artículo 195 de la Constitución Política, en concordancia de la Ley N° 41, de 1 de julio de 1996, es competencia del Consejo de Gabinete fijar y modificar los aranceles, tasas, y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, con sujeción a las leyes a que se refiere el Ordinal 11 del Artículo 153 de la Constitución Política.

## D E C R E T A

## ARTÍCULO 1:

Modifíquese las siguientes fracciones arancelarias:

| FRACCION   |      | DESCRIPCION                         | DERECHO<br>ADUANERO | ITBM |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|------|
|            | -    | De gallo o gallina:                 |                     |      |
| 1601.00.11 | --   | Envasados herméticamente o al vacío | 30%                 | -    |
| 1601.00.19 | --   | Los demás                           | 30%                 | -    |
|            | -    | De pavo (gallipavo):                |                     |      |
| 1601.00.21 | --   | Envasados herméticamente o al vacío | 30%                 | -    |
| 1601.00.29 | --   | Los demás                           | 30%                 | -    |
|            | -    | De porcino:                         |                     |      |
| 1601.00.31 | --   | Envasados herméticamente o al vacío | 30%                 | -    |
| 1601.00.39 | --   | Los demás                           | 30%                 | -    |
|            | -    | De bovino:                          |                     |      |
| 1601.00.41 | --   | Envasados herméticamente o al vacío | 30%                 | -    |
| 1601.00.49 | --   | Los demás                           | 30%                 | -    |
|            | -    | Los demás                           |                     |      |
| 1601.00.91 | --   | Envasados herméticamente o al vacío | 30%                 | -    |
| 1601.00.99 | --   | Los demás                           | 30%                 | -    |
| 1602.49.14 | ---  | Tocino, incluso con partes magras   | 30%                 |      |
| 1602.49.90 | ---- | Los demás                           | 30%                 |      |
|            |      |                                     |                     |      |
|            |      |                                     |                     |      |

## ARTÍCULO 2:

De conformidad con el Ordinal 7º del Artículo 195 de la Constitución Política de la República, remitir copia autenticada del presente Decreto de Gabinete a la Asamblea Legislativa.

## ARTÍCULO 3:

Este Decreto de Gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Ordinal 7º del Artículo 195 de la Constitución Política de la República y Ley 23 de 15 de julio de 1997 "Por la cual se aprueba el Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio; el Protocolo de Adhesión de Panamá a dicho Acuerdo junto con sus anexos y lista de compromisos; se adecua la legislación interna a la normativa internacional y se dictan otras disposiciones".

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 23 días de abril de dos mil tres (2003).

**MIREYA MOSCOSO**  
Presidenta de la República  
**ARNULFO ESCALONA AVILA**  
Ministro de Gobierno y Justicia  
**HARMODIO ARIAS CERJACK**  
Ministro de Relaciones Exteriores  
**NORBERTO R. DELGADO DURAN**  
Ministro de Economía y Finanzas  
**DORIS ROSAS DE MATA**  
Ministra de Educación  
**EDUARDO ANTONIO QUIROS**  
Ministro de Obras Públicas  
**FERNANDO GRACIA GARCIA**  
Ministro de Salud

**JAIME MORENO MORENO**  
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral  
**JOAQUIN E. JACOME DIEZ**  
Ministro de Comercio e Industrias  
**MIGUEL A. CARDENAS**  
Ministro de Vivienda  
**LYNETTE M. STANZIOLA APOLAYO**  
Ministra de Desarrollo Agropecuario  
**JERRY SALAZAR**  
Ministro para Asuntos del Canal  
**ROSABEL VERGARA**  
Ministra de la Juventud, la Mujer,  
la Niñez y la Familia

**IVONNE YOUNG**  
Ministra de la Presidencia y  
Secretaria General del Consejo de Gabinete

## EDICTOS AGRARIOS

REPUBLICA DE  
PANAMA  
MINISTERIO DE  
DESARROLLO  
AGROPECUARIO  
DIRECCION  
NACIONAL DE  
REFORMA  
AGRARIA  
REGION Nº 5,  
PANAMA OESTE  
EDICTO  
Nº 260-DRA-2002  
El suscrito  
funcionario  
sustanciador de la  
Dirección Nacional  
de Reforma Agraria

del Ministerio de  
Desarrollo  
Agropecuario, en la  
provincia de  
Panamá.

HACE SABER:  
Que el señor (a)  
**MAXIMILIANO  
MARTINEZ  
MARTINEZ**, vecino  
(a) del corregimiento  
de San José, distrito  
de San Carlos,  
portador de la cédula  
de identidad personal  
Nº 8-104-940, ha  
solicitado a la  
Dirección de

Reforma Agraria,  
mediante solicitud Nº  
8-5-634-2001, según  
plano aprobado Nº  
809-05-16075, la  
adjudicación a título  
oneroso de una  
parcela de tierra  
Baldía Nacional  
adjudicable, con una  
superficie de 2 Has.  
+ 7259.09 M2,  
ubicada en la  
localidad de Las  
Cajas, corregimiento  
de La Ermita, distrito  
de San Carlos,  
provincia de

Panamá,  
comprendida dentro  
de los siguientes  
linderos:  
NORTE: Jerónimo  
Martínez Valdez,  
calle de tierra de  
15.00 m. a La Ermita  
y hacia La Pita.  
SUR: Alberto  
Ramírez.  
ESTE: Eneida Baule  
Martínez y calle de  
tierra de 15.00 hacia  
La Pita y a La  
Hermita.  
OESTE: Domingo  
Sánchez Sánchez.

Para efectos legales  
se fija el presente  
Edicto en lugar visible  
de este  
Departamento, en la  
Alcaldía de San  
Carlos o en la  
corregiduría de La  
Hermita y copias del  
mismo se entregarán  
al interesado para  
que las haga publicar  
en los órganos de  
publicación  
correspondientes, tal  
como lo ordena el Art.  
108 del Código  
Agrario. Este Edicto

tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los 11 días del mes de octubre de 2002.

GLORIA E.  
SANCHEZ  
Secretaria Ad-Hoc  
ING. AGUSTIN  
ZAMBRANO  
Funcionario  
Sustanciador  
L- 487-864-62  
Unica  
publicación R

REPUBLICA DE  
PANAMA  
MINISTERIO DE  
DESARROLLO  
AGROPECUARIO  
DIRECCION  
NACIONAL DE  
REFORMA  
AGRARIA  
REGION Nº 5,  
PANAMA OESTE  
EDICTO

Nº 261-DRA-2002

El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en la provincia de Panamá.

HACE SABER:  
Que el señor (a) **BENIGNO JIMENEZ (L), BENIGNO BATISTA (U)**, vecino (a) del corregimiento de Bejuco, distrito de Chame, portador de la cédula de identidad personal Nº 7-65-294, ha solicitado a la Dirección de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 8-5-523-2001, según plano aprobado Nº 804-02-15884, la

adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 0 Has. + 1,838.62 M2, ubicada en la localidad de Pajonal, corregimiento de Bejuco, distrito de Chame, provincia de Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Terreno de Antonio Donado.

SUR: Terreno de Osvaldo Newbold.

ESTE: Carretera de tosca hacia Puerto de la Zona y hacia carretera de Punta Chame.

OESTE: Terreno de Osvaldo Newbold.

Para efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Departamento, en la Alcaldía de Chame o en la corregiduría de Bejuco y copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Art. 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los 16 días del mes de octubre de 2002.

GLORIA E.  
SANCHEZ  
Secretaria Ad-Hoc  
ING. AGUSTIN  
ZAMBRANO  
Funcionario  
Sustanciador  
L- 487-866-40

Unica  
publicación R

REPUBLICA DE  
PANAMA  
MINISTERIO DE  
DESARROLLO  
AGROPECUARIO  
DIRECCION  
NACIONAL DE  
REFORMA  
AGRARIA  
REGION Nº 5,  
PANAMA OESTE  
EDICTO

Nº 262-DRA-2002

El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en la provincia de Panamá.

HACE SABER:

Que el señor (a) **VICTORIA EUGENIA URIBE GUZMAN**, vecino (a) del corregimiento de Bejuco, distrito de Chame, portador de la cédula de identidad personal Nº 9-106-874, ha solicitado a la Dirección de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 8-5-683-98, según plano aprobado Nº 804-06-15834, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 18 Has. + 6,391.41 M2, ubicada en la localidad de Cerro Chame, corregimiento de El Líbano, distrito de Chame, provincia de Panamá, comprendida dentro

de los siguientes linderos:

NORTE: José Abad Torres.

SUR: Terrenos inadjudicables.

ESTE: Emilio Francisco Shansour.

OESTE: Victoria Eugenia Uribe

Guzmán y camino.

Para efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Departamento, en la Alcaldía de Chame o en la corregiduría de El Líbano y copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Art. 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los 16 días del mes de octubre de 2002.

GLORIA E.  
SANCHEZ  
Secretaria Ad-Hoc  
ING. AGUSTIN  
ZAMBRANO  
Funcionario  
Sustanciador  
L- 487-864-38  
Unica  
publicación R

REPUBLICA DE  
PANAMA  
MINISTERIO DE  
DESARROLLO  
AGROPECUARIO  
DIRECCION  
NACIONAL DE  
REFORMA  
AGRARIA  
REGION Nº 5,  
PANAMA OESTE  
EDICTO

Nº 264-DRA-2002

El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al público.

HACE SABER:

Que el señor (a) **BRIGIDA DEL ROSARIO DE RAMEA Y OTRO**, vecino (a) de La Cantera del Coco corregimiento de El Coco, distrito de La Chorrera, portador de la cédula de identidad personal Nº 2-31-145, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud Nº 8-5-255-2000, según plano aprobado Nº 804-01-15883, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 0 Has. + 3014.97 M2, ubicada en La Paz, corregimiento de Chame, distrito de Chame, provincia de Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Camino de 10 mts. hacia Cerro Chame y a la C.I.A.

SUR: Calle de 10 mts. hacia camino de Cerro Chame y a la C.I.A.

ESTE: Terreno de Brígida Del Rosario de Ramea.

OESTE: Terreno de Doris Soriano y Eneida Abrego de Guzmán.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible

de este Despacho, en la Alcaldía del distrito de Chame o en la corregiduría de Cabecera y copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Art. 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los 29 días del mes de octubre de 2002.

GLORIA E. SANCHEZ

Secretaria Ad-Hoc

ING. AGUSTIN

ZAMBRANO

Funcionario

Sustanciador

L- 487-863-57

Unica

publicación R

REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA  
REGION N° 5, PANAMA OESTE  
EDICTO

N° 265-DRA-2002

El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al público.

HACE SABER:

Que el señor (a) **OSCAR NAVARRO QUIROZ**, vecino (a) de El Higo

corregimiento de Sorá, distrito de Chame, portador de la cédula de identidad personal N° 8-526-1566, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud N° 8-5-665-2001, según plano aprobado N° 804-11-15873, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 1 Has. + 9136.32 M2, ubicada en Filipina, corregimiento de Sorá, distrito de Chame, provincia de Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Aníbal González.

SUR: Aníbal Navarro Rodríguez y calle de tosca hacia Sorá.

ESTE: Aníbal Navarro Rodríguez y Aníbal González.

OESTE: Wenceslao Navarro.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del distrito de Capira o en la corregiduría de Sorá y copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Art. 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los

29 días del mes de octubre de 2002.

GLORIA E.

SANCHEZ

Secretaria Ad-Hoc

ING. AGUSTIN

ZAMBRANO

Funcionario

Sustanciador

L- 487-863-07

Unica

publicación R

REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA  
REGION N° 5, PANAMA OESTE  
EDICTO

N° 266-DRA-2002

El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al público.

HACE SABER:

Que el señor (a) **SABINO DE LA FLOR TORRES**, vecino (a) de El Rodeo corregimiento de Cabecera, distrito de Capira, portador de la cédula de identidad personal N° 8-214-540, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud N° 8-5-355-2002, según plano aprobado N° 803-04-16270, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 34 Has. + 6207.90 M2,

Dado en Capira, a los

ubicada en El Rodeo, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira, provincia de Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Diógenes Becerra, Esteban Leones y Cerro Peñón, Qda. Juan Lorenzo.

SUR: Sabino De la Flor Torres, Juan Abrego, Saturnino Abrego.

ESTE: Esteban Leones, Ogner Pérez.

OESTE: Camino a Polanco y Qda. Grande, Luis Orlando Becerra, Sabino De la Flor Torres.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del distrito de Capira o en la corregiduría de Cermeño y copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Art. 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los 29 días del mes de octubre de 2002.

GLORIA E.

SANCHEZ

Secretaria Ad-Hoc

ING. AGUSTIN

ZAMBRANO

Funcionario

Sustanciador

L- 487-863-31

Unica

publicación R

REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA  
REGION N° 5, PANAMA OESTE  
EDICTO

N° 268-DRA-2002

El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al público.

HACE SABER:

Que el señor (a) **EDISON ANTUNES CASTILLO**, vecino (a) de La Paz,

corregimiento de Cabecera, distrito de Chame, portador de la cédula de identidad personal N° 7-50-311, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud N° 8-5-440, según plano aprobado N° 804-06-16313, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 108 Has. + 8023.00 M2, ubicada en Cerro Chame,

corregimiento de El Libano, distrito de Chame, provincia de Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Iván Barría Mock, Modesto González, Quebrada Corral.

SUR: Catalina Samaniego, Miguel

**Montenegro,**  
Demetrio Martínez,  
Serv. de 10.00 mts.  
ESTE: Modesto  
González, Miguel  
Montenegro, Qda.  
Corral, Serv. de 10  
mts.

OESTE: Terrenos  
nacionales  
inaccesibles, Iván  
Barria Mock.

Para los efectos  
legales se fija este  
Edicto en lugar visible  
de este Despacho,  
en la Alcaldía del  
distrito de Chame o  
en la corregiduría de  
El Libano y copias del  
mismo se entregarán  
al interesado para  
que las haga publicar  
en los órganos de  
publicación  
correspondientes, tal  
como lo ordena el Art.  
108 del Código  
Agrario. Este Edicto  
tendrá una vigencia  
de quince (15) días a  
partir de la última  
publicación.

Dado en Capira, a los  
05 días del mes de  
noviembre de 2002.

GLORIA E.  
SANCHEZ  
Secretaria Ad-Hoc  
ING. AGUSTIN  
ZAMBRANO  
Funcionario  
Sustanciador  
L- 487-871-17  
Unica  
publicación R

REPUBLICA DE  
PANAMA  
MINISTERIO DE  
DESARROLLO  
AGROPECUARIO  
DIRECCION  
NACIONAL DE  
REFORMA  
AGRARIA  
REGION Nº 5,  
PANAMA OESTE

**EDICTO**  
Nº 270-DRA-2002  
El suscrito  
funcionario  
sustanciador de la  
Dirección Nacional  
de Reforma Agraria  
del Ministerio de  
Desarrollo  
Agropecuario, en la  
provincia de  
Panamá.

**HACE SABER:**  
Que el señor (a)  
**DIONICIA GIL**  
**ARIAS**, vecino (a) del  
corregimiento de  
Caimito, distrito de  
Capira, portador de la  
cédula de identidad  
personal Nº 8-531-  
1777, ha solicitado a  
la Dirección de  
Reforma Agraria,  
mediante solicitud Nº  
8-5-1026-2000,  
según plano  
aprobado Nº 803-02-  
15703, la  
adjudicación a título  
oneroso de una  
parcela de tierra  
Baldía Nacional  
adjudicable, con una  
superficie de 0 Has.  
+ 2015.04 M2,  
ubicada en la  
localidad de La  
Valdez, corregimiento de  
Caimito, distrito de  
Capira, provincia de  
Panamá, comprendida dentro  
de los siguientes  
linderos:

NORTE: Gabino  
Jiménez.

SUR: Camino de 15  
mts. a Trinidad de  
Las Minas y a  
Caimito.

ESTE: Leopoldo  
Tejada Campos,  
Isidro Hidalgo.

OESTE: Javier  
González.

Para efectos legales  
se fija el presente

Edicto en lugar visible  
de este  
Departamento, en la  
Alcaldía de Capira o  
en la corregiduría de  
Caimito y copias del  
mismo se entregarán  
al interesado para  
que las haga publicar  
en los órganos de  
publicación  
correspondientes, tal  
como lo ordena el Art.  
108 del Código  
Agrario. Este Edicto  
tendrá una vigencia  
de quince (15) días a  
partir de la última  
publicación.

Dado en Capira, a los  
07 días del mes de  
noviembre de 2002.

GLORIA E.  
SANCHEZ  
Secretaria Ad-Hoc  
ING. AGUSTIN  
ZAMBRANO  
Funcionario  
Sustanciador  
L- 487-871-17  
Unica  
publicación R

REPUBLICA DE  
PANAMA  
MINISTERIO DE  
DESARROLLO  
AGROPECUARIO  
DIRECCION  
NACIONAL DE  
REFORMA  
AGRARIA  
REGION Nº 5,  
PANAMA OESTE  
EDICTO

Nº 271-DRA-2002  
El suscrito  
funcionario  
sustanciador de la  
Dirección Nacional  
de Reforma Agraria,  
en la provincia de  
Panamá al público.

**HACE SABER:**  
Que el señor (a)  
**PELAGIO**  
**MENCHACA**  
**MORAN**, vecino (a)

de La Mitra,  
corregimiento de  
Playa Leona, distrito  
de La Chorrera,  
portador de la cédula  
de identidad personal  
Nº 8-135-893, ha  
solicitado a la  
Dirección Nacional  
de Reforma Agraria,  
mediante solicitud Nº  
8-5-794-2001, según  
plano aprobado Nº  
803-04-16129, la  
adjudicación a título  
oneroso de dos  
parcelas de tierra  
Baldía Nacional  
adjudicable, con una  
superficie de 32 Has.  
+ 8263.29 M2,  
ubicada en  
Cormeño, corregimiento de  
Cormeño, distrito de  
Capira, provincia de  
Panamá, comprendida dentro  
de los siguientes  
linderos:  
Parcela Nº "A" 21  
Has. + 7618.10 m2.  
NORTE: Anel  
Teodoro Sáenz,  
Bienvenido  
Menchaca.

SUR: Carlos Díaz,  
Teodoro Menchaca.  
ESTE: Teodoro  
Menchaca.

OESTE: Carretera de  
15 mts., Rogelio  
Menchaca,  
Bienvenido  
Menchaca.

Parcela Nº "B" 11  
Has. + 0645 m2.

NORTE: Carretera  
de 15.00 mts., María  
Menchaca, Dionicio  
Núñez, Nicandro  
Menchaca.

SUR: Cerro San  
Francisco, Rogelio  
Menchaca.

ESTE: Rogelio  
Menchaca.

OESTE: Santiago  
Beleno Torres.

Para los efectos  
legales se fija este  
Edicto en lugar visible  
de este Despacho,  
en la Alcaldía del  
distrito de Capira o en  
la corregiduría de  
Cormeño y copias del  
mismo se entregarán  
al interesado para  
que las haga publicar  
en los órganos de  
publicación  
correspondientes, tal  
como lo ordena el Art.  
108 del Código  
Agrario. Este Edicto  
tendrá una vigencia  
de quince (15) días a  
partir de la última  
publicación.

Dado en Capira, a los  
08 días del mes de  
noviembre de 2002.

GLORIA E.  
SANCHEZ  
Secretaria Ad-Hoc  
ING. AGUSTIN  
ZAMBRANO  
Funcionario  
Sustanciador  
L- 487-869-17  
Unica  
publicación R

REPUBLICA DE  
PANAMA  
MINISTERIO DE  
DESARROLLO  
AGROPECUARIO  
DIRECCION  
NACIONAL DE  
REFORMA  
AGRARIA  
REGION Nº 5,  
PANAMA OESTE  
EDICTO

Nº 272-DRA-2002  
El suscrito  
funcionario  
sustanciador de la  
Dirección Nacional  
de Reforma Agraria,  
en la provincia de  
Panamá al público.

**HACE SABER:**  
Que el señor (a)  
**ROCCO GIUSEPPE**

**M E L I L L O**

**MAGLIONE**, vecino (a) de La Loma corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal N° 9-158-792, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud N° 8-5-223-2002, según plano aprobado N° 809-06-16153, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 0 Has. + 4,363.73 M2, ubicada en Alto del Jobo, corregimiento de La Laguna, distrito de San Carlos, provincia de Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Camino de tierra de 10.00 m. a otros lotes y hacia carretera principal La Laguna - C.I.A.

SUR: Rocco Giuseppe Melillo Maglione.

ESTE: Rocco Giuseppe Melillo Maglione.

OESTE: Rocco Giuseppe Melillo Maglione.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del distrito de San Carlos o en la corregiduría de La Laguna y copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en

los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Art. 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los 08 días del mes de noviembre de 2002.

GLORIA E. SANCHEZ

Secretaria Ad-Hoc  
ING. AGUSTIN ZAMBRANO  
Funcionario Sustanciador  
L- 487-869-83  
Unica publicación R

REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA  
REGION N° 5, PANAMA OESTE  
EDICTO

N° 273-DRA-2002

El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al público.

HACE SABER:

Que el señor (a) **ROCCO GIUSEPPE M E L I L L O MAGLIONE**, vecino (a) de La Loma corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal N° 9-158-792, ha solicitado a la

Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud N° 8-5-141-2002, según plano aprobado N° 809-06-16307, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 1 Has. + 7,712.41 M2, ubicada en El Alto del Jobo, corregimiento de La Laguna, distrito de San Carlos, provincia de Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Camino de 10.00 m. a otros lotes.

SUR: Rocco Giuseppe Melillo Maglione.

ESTE: Carretera de 30 mts. a La Laguna y a Las Lajas y Rocco Giuseppe Melillo.

OESTE: Rocco Giuseppe Melillo Maglione y Jesús Antonio Hidalgo.

Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del distrito de San Carlos o en la corregiduría de La Laguna y copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Art. 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los 08 días del mes de noviembre de 2002.

GLORIA E. SANCHEZ

Secretaria Ad-Hoc  
ING. AGUSTIN ZAMBRANO  
Funcionario Sustanciador  
L- 487-869-41  
Unica publicación R

REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA  
REGION N° 5, PANAMA OESTE  
EDICTO

N° 289-DRA-2002

El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en la provincia de Panamá.

HACE SABER:

Que el señor (a) **DESARROLLO AMAYA, S.A., REP. LEGAL DOMINGO ANTONIO BATISTA VILLARREAL**,

vecino (a) del corregimiento de Bethania, distrito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal N° 7-75-941, ha solicitado a la Dirección de Reforma Agraria, mediante solicitud N° 8-5-006-2002, según plano aprobado N° 804-11-16273, la adjudicación a título oneroso de una

parcela de tierra Baldía Nacional adjudicable, con una superficie de 890.70 M2, ubicada en la localidad de Loma Alta, corregimiento de Sorá, distrito de Chame, provincia de Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Carretera de asfalto 15 mts. a Sorá y a otras fincas.

SUR: Estebania Quiroz de Navarro.

ESTE: Estebania Quiroz de Navarro.

OESTE: Desarrollo Ana Luz, S.A. y carretera de asfalto a Sorá y a otras fincas.

Para efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este

Departamento, en la Alcaldía de Chame o en la corregiduría de Sorá y copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el Art. 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los 21 días del mes de noviembre de 2002.

GLORIA E. SANCHEZ

Secretaria Ad-Hoc  
ING. AGUSTIN ZAMBRANO  
Funcionario Sustanciador  
L- 487-881-21  
Unica publicación R